

## Drei neue *Elathous*\*)-Arten.

(Coleoptera, Elateridae.)

Beschrieben von **Otto Schwarz** in Friedrichsfelde-Berlin.

### 1. *Elathous* **Oberndorfferi**.

(♀) *Rufo-brunneus, dense flavo-pilosus; fronte antice impressa, porrecta, medio late truncata, crebre sat fortiter umbilicato-punctata; prothorace latitudine distincte longiore, a medio rotundatim paulo angustato, convexo, dense punctato, punctis antrorsum lateribusque umbilicatis, basi medio breviter subcanaliculato, angulis posticis leviter divaricatis, obtusis, carinatis; elytris prothoracis latitudine, ultra medium sensim dilatatis, postice rotundatim angustatis, punctato-striatis, interstitiis convexiusculis, confertim punctulatis; corpore subtus pedibusque paulo dilutionibus. Long. 10 mill., lat. 3 mill. N.-Amer. bor., N. Y. Buffalo.*

Bräunlich roth, dicht dunkelgelb behaart. Die Stirn ist dicht, mäßig stark und nabelig punktirt, vorn dreieckig eingedrückt, die Mitte des Eindruckes schwach erhaben, der Vorderrand ist scharf abgesetzt und etwas vorragend, abgestutzt. Der Halsschild ist länger als breit, von der Mitte an nach vorn schwach gerundet verengt und vor den leicht divergirenden, stumpfen und deutlich gekielten Hinterecken leicht ausgeschweift, mäßig dicht, an den Seiten und vorne schwach nabelig und ein wenig dichter punktirt. Die Flügeldecken sind an der Basis nicht breiter als der Halsschild, nach hinten allmählich etwas verbreitert, fein punktirt-gestreift, mit schwach gewölbten, fein und dicht punktulirten Zwischenräumen. Unterseite und Beine sind etwas heller als die Oberseite, der Seitenrand des Halsschildes bis zu den Vorderecken deutlich.

Durch Herrn Oberndorffer erhalten und ihm gewidmet.

### 2. *Elathous* **smyrnensis**.

(♀) *Ferrugineus, dense flavo-pilosus; fronte antice transversim leviter impressa, crebre fortiterque umbilicato-punctata, margine antico medio paulo emarginata; prothorace latitudine longiore, apice rotundatim angustato, dense punctato, angulis posticis subdivaricatis, basi medio haud canaliculato; elytris prothorace haud*

\*) Genus *Elathous* Reitt. = *Leptoschema* Horn.

*lterioribus, a basi ultra medium paulo dilatatis, punctato-striatis, interstitiis dense subtiliter punctulatis; corpore subtus pedibusque fere concoloribus.* Long. 11 mill., lat.  $3\frac{1}{5}$  mill. Asia minor, Smyrna.

Rostrum, dicht gelb behaart. Die Stirn ist vorn breit und etwas dreieckig flach eingedrückt, dicht, stark und nabelig punktirt, der Vorderrand in der Mitte flach ausgerandet. Der Halsschild ist länger als breit, im vorderen Drittel gerundet verengt und vor den schwach divergirenden Hinterecken leicht ausgeschweift, nicht besonders dicht, etwas weniger stark, an den Seiten und vorn etwas dichter und schwach nabelig punktirt, ohne Mittelfurche an der Basis. Die Flügeldecken sind von der Basis an nach hinten schwach und allmählich verbreitert, im letzten Drittel gerundet verengt, punktirt-gestreift, die Streifen nächst der Naht fein, nach außen stark punktirt, die Zwischenräume sind dicht und fein punktulirt, namentlich nach der Spitze zu sehr fein, etwas gerunzelt. Unterseite und Beine sind nicht merklich heller als die Oberseite gefärbt.

### 3. *Elathous syriacus.*

*Brunescenti-rufus, nitidus, dense flavo-pilosus, elytris paulo obscurioribus; fronte antice utrinque leviter impressa dense sat fortiter umbilicato-punctata; prothorace latitudine sublongiore, lateribus late subarcuato, antrorsum subangustato, sat dense punctato, haud canaliculato, angulis posticis subdivaricatis; elytris ultra medium sensim parum dilatatis, apice rotundatis, fere aequaliter fortiterque punctato-striatis, interstitiis angustioribus, parce punctulatis.* Long. 9 mill., lat.  $2\frac{1}{5}$  mill. — Syria, Beirut.

Bräunlichroth, ziemlich glänzend, dicht gelb behaart, Flügeldecken ein wenig dunkler als der Halsschild. Die Stirn ist vorn beiderseits leicht eingedrückt, dicht und ziemlich stark nabelig punktulirt. Der Halsschild ist kaum länger als breit, an den Seiten nur sehr wenig gerundet und nach vorn nur kaum merklich verengt, weniger dicht, weniger stark und undeutlicher nabelig punktirt als die Stirn, ohne Mittelfurche an der Basis, die Hinterecken nur sehr wenig divergirend. Die Flügeldecken sind nach hinten schwach und allmählich verbreitert, im letzten Drittel gerundet verengt, stark punktirt-gestreift, die Punkte der Streifen nächst der Naht kaum merklich schwächer als nach außen, die Zwischenräume sind wegen der stark punktirten Streifen nur schmal, fein und zerstreut, nur wenig bemerkbar punktulirt.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: [22](#)

Autor(en)/Author(s): Schwarz Otto Carl Ernst

Artikel/Article: [Drei neue Elathous-Arten. 207-208](#)