

Uebersicht der Coleopteren-Arten aus der nächsten Verwandtschaft des *Enicmus Mannerheimi* Kolen.

Von Edm. Reitter in Paskau (Mähren).

Diese sind durch gewölbte, exact eiförmige Flügeldecken ausgezeichnet, welche hinter der Basis einen Quereindruck nicht besitzen.

1" Flügeldecken kurz und breit eiförmig, mit breit abgesetztem und mehr weniger aufgebogenem Seitenrande, an der Basis mit starken Punktreihen. Hinterrand des Scheitels nur mit undeutlicher Längsfurche.

2" Flügeldecken mit groben Punktstreifen, letztere erst an der Spitze verschwindend, die Zwischenräume schmäler als die Punktstreifen, der Seitenrand mäßig breit verflacht. Rostroth. Hinterbrust mit einer Mittelfurche, diese vorn grübchenförmig, an der Basis, hinter den Hinterhüften, je ein Grübchen, erster sichtbarer Bauchhalbring einfach. Long. 1·3—1·5 mm. — Kaukasus. **Mannerheimi** Kolen.

2' Flügeldecken mit feineren Punktstreifen, diese schon hinter der Mitte allmählig verschwindend, die Zwischenräume beträchtlich breiter als die Streifen; der Seitenrand breit und hoch aufgebogen; Halschild schmal und weniger quer, Körper ein wenig größer, glänzender, rostroth. Hinterbrust an den Seiten der Länge nach fein gestrichelt, in der Mitte mit einer vorn mehr vertieften Längsfurche, hinter den Hinterhüften ohne Grube, erster sichtbarer Bauchhalbring einfach. Long. 1·75 mm. — Griechenland: Parnass.

Varendorffi n. sp.

1' Flügeldecken länglich, exact eiförmig mit schmal abgesetztem, aufgebogenem Seitenrande, Scheibe mit feinen Punktstreifen, diese hinter der Mitte allmählig erlöschend, die Zwischenräume der Streifen sind breiter als die Streifen. Halsschild schmal, schwach quer, gedrängt punktirt, mit einer starken Querfurche vor der Basis und feiner Mittelrinne, die Basalgruben in der Furche wenig prononcirt, Kopf schmäler als der Thorax, mit deutlicher Mittelrinne, die Schläfen parallel, kürzer als die Augen, hinten ein Zähnchen bildend, Fühler dünn und kurz; (die Keule fehlt). Rostgelb, die Flügeldecken etwas glänzend. Hinterbrust und erster Bauchhalbring einfach, fast glatt. Long. 1·3 mm. — Kleinasien, bei Konia.

anatolicus n. sp.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: [22](#)

Autor(en)/Author(s): Reitter Edmund

Artikel/Article: [Uebersicht der Coleopteren-Arten aus der nächsten
Verwandtschaft des Enicmus Mannerheimi KOLEN. 234](#)