

Diagnosen neuer Urodon-Arten.

Von J. Schilsky in Berlin.

1. *Urodon ciliatus*: Oblongo-ovatus, niger, undique densissime cinereo-squamulatus, antennarum basi tibiisque quatuor anterioribus rufo-testaceis, capite ante antennis brevi, carinulis lateralibus fere parallelis, thorace latitudine longioribus, postice parallelo, antice rotundatim angustato, lobo basali postice acuminato, elytris parallelis, latitudine longioribus, pygidio toto sulcato. — Long. 1,8—2,0 mm. — Masc.: abdomine apice curvato, segmento 5^o excavato, lobo laterali acute producto, tibiis posticis brevibus, intus dense ciliatis, apice spina brevi munitis. — Fem.: abdomine haud curvato, tibiis posticis simplicibus. — Buchara.

2. *Urodon granulatus*: Oblongus, niger, cretaceo-squamosus, elytris pilis brevibus albis subseriatim dispositis, antennis pedibusque testaceis, femoribus medio obscurioribus, thorace latitudine aequilongo, postice parallelo, antice parum angustato, lobo basali postice acuminato pygidioque apicem versus tuberculis nigris dispositis, elytris parallelis, linea suturali et marginali nulla. — Long.: 2,0—2,2 mm. — Masc.: femoribus dilatatis, tibiis posticis simplicibus, abdomine curvato, segmentis 2^o—5^o medio excavatis, segmento 5^o utrinque lobo magno producto, in margine externo semicirculariter sinuato. — Fem.: ventrali segmento 5^o medio rotundatim impresso, pilis longis vestito, pygidio valde curvato. — Algier.

3. *Urodon Korbi*: Oblongus, niger, dense griseo-vel cinereo-pubescentis, antennarum basi rufo-testacea, pedibus nigris tibiis quatuor anterioribus ferrugineis, capite brevi, fronte subconvexa, oculis modice convexis, carinulis lateralibus convergentibus, antennis brevibus, articulo 3^o latitudine longiore, obconico, articulis 4^o et 5^o latitudine aequilongis, 6^o—8^o inaequalibus transversis, clava abrupta, articulis 1^o et 2^o subtransversis, thorace lateribus perparum rotundato, antice angustato, elytris oblongis, lateribus vix rotundatis. — Long. 2,0—2,3 mm. — Masc.: thorace parum longiore, lobo basali apice acuminato, abdomine subcurvato, ventrali segmento 5^o impresso, nitido, utrinque lobo postice acuto producto, segmento ultimo simplice. — Fem.: thorace longitudine fere latiore, lobo basali apice rotundato, abdomine parum curvato, segmento 5^o medio impressione minuta instructo, segmento 6^o modice impresso. — Anatolia.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1904

Band/Volume: [23](#)

Autor(en)/Author(s): Schilsky Friedrich Julius

Artikel/Article: [Diagnosen neuer Urodon-Arten. 78](#)