download unter www.biologiezentrum.at

Notes diptérologiques

par le Dr. **J. Villeneuve** de Rambouillet.

Asilus pilipes Meig. — 2 ♂ dans la collection Meigen du Muséum de Paris, en excellent état, qui sont *Asilus armatus* Jaenn. = *Asilus hispanus* Löw. — Ils ont une bande rougeâtre très nette aux fémurs et aux tibias, caractère omis par Meigen dans sa description.

» *caliginosus* Meig. — Une ♀, bien conservée, qui est identique à *Asilus apicatus* Löw, Hendel.

» *obscurus* Meig. — Un ♂ et une ♀ qui ne sont pas autre chose que *Asilus rusticus* Meig. Löw.

» *fimbriatus* Meig. ♀ = *Asilus colubrinus* Meig. Löw.

» *calceatus* Meig. ♀. Cet exemplaire me semble être tout bonnement une ♀ d'*Asilus atricapillus* Fall.

» *fuscipennis* Meig. ♂ = *Asilus spiniger* Zell.

» *picipes* Meig. 4 ♂, une ♀ = *Asilus forcipula* Zell.

» *rufinervis* Meig. — Cette espèce est représentée par 2 types:
un ♂ = *Asilus varipes* Meig. et
une ♀ = *Asilus germanicus* F.

Tamiclea cinerea Macq. (1837) = *Cistogaster globula* Meig. type (1838) = *Androphana grandis* S., B. B. = *Etheria pedicellata* R. D., Bigot (teste Brauer) = *Etheria grisea* Pand. type.

Ceromasia interrupta (Macq.) Rond. = *Tachina lepida* Meig. type et non *tepida* comme l'écrit Rob. Desvoidy.

Phorocera media Rond. — Je considère comme telle l'espèce que j'ai reçue jusques à présent, de France et de l'étranger, avec l'étiquette: *segregata* Rond. — Par contre, la vraie *Phor. segregata* est confondue avec *Tricholyga major* Rond.

Chez *Phorocera media* Rond., les soies frontales ne descendent guère au delà du chète antennaire. Au contraire, chez *Phorocera segregata* Rond., elles descendent bien au-dessous, aussi bas que chez *Tachina larvarum* ou *Tricholyga major*. *Phorocera segregata* et

download unter www.biologiezentrum.at

Tricholyga major se ressemblent au point qu'elles ne diffèrent à première vue que par des détails. Ainsi, chez *Ph. segregata,* les vibrisses remontent assez fortes jusqu'aux soies frontales ou même au dessus; c'est un caractère des *Phorocera.* Chez *Tricholyga major,* les vibrisses n'atteignent pas les soies frontales et sont faibles et couchées, etc. — Mais, il y a un caractère constant qui les sépare nettement et que feu Pandellé a bien mis en lumière. C'est la présence d'une brosse de poils d'un beau jaune d'or, à la face inférieure du l'hypopyge, sur le lobe périnéal médian de *Tricholyga major.*

Pour finir je dirai: *Phorocera media* Rond. est une veritable *Phoroceratide. Phorocera segregata* Rond. et *Tricholyga major* Rond. sont des espèces plus robustes, appartenant au groupe de *Tachina larvarum.*

Metopia cinerea Perris types dans coll. Perris et dans coll. Gobert = *Hyperecteina metopina* Schiner. Perris a la priorité.

LITERATUR.

Allgemeines.

Wasmann, Erich S. J. Instinkt und Intelligenz im Tierreich. Ein kritischer Beitrag zur modernen Tierpsychologie. III. stark vermehrte Auflage, 276 und XIV, pp. Verlag von Herder, Freiburg i. B. 1905.

Die vorliegende III. Auflage dieses sehr interessanten Werkes hat 4 neue Kapitel erhalten und zwar:

— Das VIII. (p. 136—169). Die mechanische Reflextheorie und das Instinktleben der Tiere.

— Das X. (p. 186—228). Verstandesproben einiger höherer Tiere.

— Das XI. (p. 228—249). Ist eine vergleichende Psychologie möglich?

— Das XII. (p. 250—274). Die monistische Identitätstheorie und die vergleichende Psychologie.

Im 8. Kapitel soll die Unhaltbarkeit der neueren Versuche von Verworn, Loeb und anderer, das Seelenleben der Tiere rein mechanisch zu erklären, gezeigt werden. Wie weit der Verfasser unserem heutigen Wissen gerecht wird, muß dem subjektiven Empfinden des einzelnen Lesers anheimgestellt werden. Jedenfalls ist die Literaturkenntnis und die interessante Art der Verarbeitung derselben auch dem Gegner ein Genuß.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Wiener Entomologische Zeitung

Jahr/Year: 1906

Band/Volume: 25

Autor(en)/Author(s): Villeneuve Janti Joseph de

Artikel/Article: Notes diptérologiques. 43-44