

Notes synonymiques sur quelques Muscides.

Par le Dr. J. Villeneuve de Rambouillet.

- Metopia nasuta* Meig. type = *Phrosina argyrina* R. Desv.
Miltogramma tricuspis Meig. type = *M. strenua* Perris type = *Sphinx*
lineolata Rond.
Myobia pruinosa Meig. type = *Conogaster nubilis* Rond. BB =
Myobia dubia Pand. type.
Hypostena procera Meig. = *H. incisuralis* Macq. = *Myobia pisci-*
ventris Pand. type = *Melanophora planigena* Pand. type.
Degeeria strigata Meig. type = *Brachychaeta spinigera* Rond.
Morinia velox Rond. = *Rhinomorinia sarcophagina* Schiner.
Morinia funebris Meig. type = *Hypostena medorina* Schiner.
Paramacronychia flavipalpis Girsch. = *Macronychia Meyer-Dürri*
 Schin. i. litt. type (étiquette écrite de la main de Schiner,
 in Coll. Laboulbène au Muséum de Paris).
Hystrichoneura frontata Schin. = *Myobia spreta* Meig. type = *Tach.*
argyrea Meig. type (1^e, 3^e et 5^e nerv. ciliées).
Tachina bella Meig. type = *Argyrophylax pupiphaga* Rond. = *Tach.*
discrepanda Pand. type.
Tachina aurifrons Meig. type = *Labidogaster agilis* BB. = *Dionaea*
aurulans (R. D.) Pand. typ.
Psalida meridiana Rond. = *Clelia pubens* Pand. type.
Exorista properans Rond. = *Masicera fatua* ♂ Meig. type + *Masi-*
cera festinans ♀ Meig. type.
Masicera ferruginea Meig. type vérifié très exactement la description
 de *Exorista rutila* ap. Rond.
Masicera rutila Meig. type = *Ceromasia rufipes* BB. = *Tach.*
vicinalis Pand. type.

Cette espèce est représentée dans la coll. Meigen par 2 ♀ qui ne diffèrent de *C. rufipes* BB. que par le 2 premiers articles de antennes qui sont d'un jaune vif et par les cuisses noirâtres à leur base seulement (et non entièrement noires comme dans la description).

- Phorocera inepta* Meig. type — *Zenillia alnicola* Pand. type.
Exorista rapida Meig. type = *Ex. immunita* Pand. type.

Chez cette espèce, les soies ocellaires manquent comme chez *Hemim. gyroraga* Rond.

248 Dr. J. Villeneuve: Notes synonymiques sur quelques Muscides.

Erigone viridescens R. Desv. = *Nemoruca nemorum* Meig. type.

Dexia irrorata Meig. type = *Atropidomyia parvula* BB. type.

Dexia pectinuta Meig. type = *Dexia lata* Egg.

Microtricha punctulata v. d. W. = *Rondania cucullata* + *Rond.*

notata R. Desv. = *Dystrixa notiventris* Pand. type.

Clista foeda Meig. type = *Silbermannia (Loewia) petiolata* (R. Desv.)

Pand. type. Le type de Meigen a les yeux pubescents

et les gènes pourvues de soies; ce n'est donc pas *F. foeda*

apud BB. Elle doit être très voisine de *Loewia seti-*

barba Egg.

Mais Pandellé a mal interprété Robineau-

Desvoidy car les genres *Silbermannia*, *Dufouria* etc.

se rapportent au genre *Ptilops* ap. Rondani dont les

gènes sont nues: la véritable *Silberm. petiolata* de

R. Desvoidy paraît être bien identique à *Ptilops*

infans Rond.

Fortisia foeda BB. et auct. = *Leucostoma phaeoptera* Meig. type.

Clista lentis Meig. type = *Scopolia tricolorata* Rond.

Leucostoma limbata Meig. type = *Ples. nigrisquama* Zett. Schin.

= *Lithophasia pygmaea* (Fall.) Pand. type.

Macquartia praefica Meig. type = *M. echinalis* + *M. fascicularis*

Pand. types. Cette espèce n'est pas rare dans le sud de

la France.

Exorista libatrix Meig. type = *Myxexorista grisella* BB. = *Zenillia*

fulva Pand. type.

Medoria funesta Meig. type = *Cercomyia curvicauda* Fall.

Notiz über *Asida convexicollis*.

Asida convexicollis Alld. muß wegen *Asida convexicollis* Leconte einen anderen Namen erhalten. Ich schlage vor diese Art

Asida Reitteri (nom. nov.) zu benennen. H. Gebien, Hamburg.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1906

Band/Volume: [25](#)

Autor(en)/Author(s): Villeneuve Janti Joseph de

Artikel/Article: [Notes synonymiques sur quelques Muscides. 247-248](#)