

Bemerkungen und Berichtigungen zum Catal. Coleopt. Europ. Cauc. et Arm. ross. 1906.

Von Prof. Dr. L. von Heyden in Bockenheim.

Zu Teilen des Katalogs, die nicht von mir bearbeitet sind, habe ich folgendes zu bemerken:

p. 16. *Carabus Zwickii* non *Zwicki*, nach Lebrecht Zwicki benannt.

» 17. *Carabus Fuminii* non *Faminii*, nach M. Famin benannt.

» 21. *Carabus nigropomeranus* streichen = Mischart.

» 29. *Nebria Vanvolxemi* in einem Wort.

Alpaeus Marschallii non *Marshalli* nach von Marschall zu Bieberstein, geboren am 11. August 1766 zu Aarberg-Bern, gestorben 5. Oktober 1826 zu Merosa bei Charkow.

» 32. *Elaphrus latipennis* Sem. Kolgajev non Kolgajev.

» 40. *Peryphus megaspilum* Walker non Walber.

» 72. *Anisodactylus Crouzeti* Puel = *nemorivagus* var. *atricornis* Steph.

Zabrus nereensis non *nevensis* vom Pic de Nère, Pyren.

» 73. *Zabrus humeralis* Uhagon = *flavangulus* Chevr.

» 83. ad *Poecilus v. lossinianus* adde *luctuosus* Desbr. Frel. 1906, 91 (Orig. in Coll. Heyden).

Poecilus lepidus a. *viridis* non *viridanus* Preller = *cupreus* a. *beryllinus* Preller.

Poecilus lepidus a. *silvaticus* Prell. = *cyanens* Letzner Z. Breslau 1852, 192.

» 85. *Parapedius gratus* Chd. = *coaretatus* Luc. A. Sc. Nat. 1842, 64.

» 86. *Omaseus Baeri* ist zusammengeleimtes Artefakt, vide Horae 1893, 468.

» 89. *Styracoderus*. — Patria ist von *atramentarius* — Alpujarras, *Azrai* — Sierra Gredos, *Martinezii* — Sierra Morena.

» 101. *Masoreus Wetterhali* non *Wetterhalli*.

» 103. ad *Lionychus quadrillum* a. *unicolor* Heyd. Kf. Nass. II, 1904, 49.

» 104. *Metabletus myrmidon* A' non A.

» 105. *Dromiulus rectensis* Rye = *insignis* Luc. vide Fauvel R. 1905, 191.

» 121. *Rhantus Grapi* non *Grapi* nach dem Schweden Grapé benannt.

- p. 155. *Medon Pythonissa* streichen. Jerusalem.
 » 160. *Leptacinus batychrus* non *bathycrus*.
 » 168. *Physetops tataricus* Pall. It. App. 1773, 30, non App. 74.
 » 208. vor *Lomechusa*: *Apteranillus* (Fairm.) *Dohrni* Fairm. A. 1860, 150. Gibraltar.
 » 215. *Piochardia* zufügen zu *Oxysoma*: non Gervais 1849. *Arachnidae*.
 » 273. *Ochthebius torrentium* non *torrentum*.
 » 316. *Nemosoma*. Die Untergattung muß heißen: *Monesoma* Leveillé A'. 1894, 144.
- Sturmia* Ragusa Sic. 1892, 194, non Robineau-Desvoidy Diptera 1830.
- Sturmiosoma* Ragusa Sic. 1895.
- » 346. *Melanophthalma* v. *ovalipennis* Reitt. Engadin, unic. von mir gefunden (coll. Reitter).
 » 354. *Anommatus Rosellae* Rag. = *Aglenus brunneus*!
 » 359. Bei *Hippodamia 7-maculata* sind nachzutragen die Aberrationen, die beschrieben sind in »Entom. Nachr.« von Meier 1897, 317; 1899, 100; Wimmel 1897, 163; Schulz 1899, 223.
 » 361. Bei *Adalia bipunctata* beifügen:
 a. *concolor* Wim. Verh. Hamb. 1894, 11.
 a. *perplexa* Meier, Ent. Nachr. 1899, 100.
 a. *lineata* Meier, Ent. Nachr. 1899, 100.
 a. *interrupta* Meier, Ent. Nachr. 1899, 101.
 a. *polyguttata* Meier, Ent. Nachr. 1899, 101.
 a. *Dömmlingi* Meier, Ent. Nachr. 1899, 101.
- » 366. *Propylaea 14-punctata* beifügen:
 die von Sajo beschriebenen ab. Ent. Nachr. 1881, 273.
 die von Walter beschriebenen ab. ebenda 1882, 20.
- » 369. Zu *Nephus Kiesenwetteri*:
 a. *Reyi* Sicard, Misc. ent. 1893, Nr. 20.
 a. *undulatus* Sicard, Misc. ent. 1893, Nr. 20.
 a. *tigrinus* Sicard, Misc. ent. 1893, Nr. 20.
- » 387. *Dima Assoi* Perez = *dima* Schf.
 » 389. Zu *Campylomorphus homalisinus*:
 v. *sutura nigra* Chevr. Rev. zool. 1840, 50.
- » 391. Bei *Silesis* streichen:
 dimidiatipennis Rche. Algier.
 juvencus Buys. Syria.

concolor Desbr. Syr. non T.

omissus (Oertzeni) ist Art.

p. 391. *Agriotes v. scutellatus* Schf. i. l. = *v. parallelus* Schwz.

» 410. *Buprestis Ledereri* non *Lederi*.

Buprestis Salomonis (Nicolskyi) adde 682.

» 422. *Synoxylon sexdentatum* Oliv. 1790.

Synoxylon chalcographum Panz. 1794.

» 444. *Anthicus maltae et malvae* Rey non Pic.

p. 451. *Hapalus Caruanoi* non *Caruanae*.

» 453. Vor *Rhipiphorus*:

Rhizostylops Silvestri.

inquirendus Sily. Redia 1905, 315, R. Col. If. 1907, 24, Umbria.

Macrosiagonini loco *Rhipiphorini*.

Rhipiphorus subdipterus v. *pallescens* Sols. Trudy 1881, 57.

subdipterus v. *Antoniae* Pic (non Reitt).

subdipterus v. *Clermonti* Chob. A'. 1906, 224.

subdipterus v. *caucasicus* Reitt. emend.

Macrosiagon ist neutrum, also *meridionale*, *bipunctatum* etc.

» 465. *Podonta convexicollis* Küst. = *morio* Kiesw. ex orig. coll. Heyden. — *morio* 1873, *convexicollis* 1850.

» 474. *Asida Reitteri* adde 248.

convexicollis All. non Leconte.

» 480. *Trigonoscelis contraria* Desbr. (*corallifera* Reitt.) streichen, Turemn. non Russ. m.

» 487. Gattung *Hadrus* ist den Atlantiden eigentümlich, nicht Creta.

» 488. *Opatrum Grenicri* ad *sculpturatum*.

» 491. *Eledona agaricola* loco *agricola*.

» 491. Die Art hat den Namen *Alphitophagus quadripustulatus* Steph. zu führen. Says Art *bifasciatus* America zweifelhaft.

» 494. *Cossyphus* adde post *Dejeani*: *rugulosus* Peyron, Rev. zool. 1854, 224, Cri.

» 497. *Pelorinus* non *Pelorimus*.

» 498. Post *Odoenemis congener* adde: *tenebrioides* Germ. Mag. 1813, 123, Lu.

» 500. *Adelphinus* v. *fulvipennis* adde 242.

» 502. *Vesperus hispalensis* Fuente = *conicollis* Fairm.

» 504. *Erodinus reticulatus* F. Das richtige Citat ist Sys. Eleuth. II, 1801, 365. — *clathratus* von 1792.

- p. 512. *Penichroa* 1839 non 1831. — *Exilia* Muls. 1863.
Axinopalpis 1842, *Axinopalpus* 1845.
- » 524. *Dorcadion streparius* loco *stepparius*.
- » 535. *Plateumaris abdominalis* Bedel = *affinis* Kunze; *pallipes* Kunze var. est.
- » 536. *Crioceris 12-punctata* adde: a. *6-punctata* Fröhlich Käf. Aschaff. 1887, 137. Bavar.
- » 539. *Gynandrophthalma tibialis* Brullé adde: a. *Kraatzi* Clavar. Gen. Ins. Wytsm. 1906, 44, Gr.; *graeeca* Wse. non Kraatz.
- » 542. *Cryptocephalus* var. *posticeinstitutus* Pic ad *imperialis* referendus.
- » 550. *Gastroidea viridula* Dej. muß den Namen führen *hypochaeridis* L. (*Cryptocephalus*). *Or. hypochaer.* auct. non L. = *cristula* Dufour.
- » 551. *Timarcha scabripennis* Fairm. Hi. m. ist Art; *scabra* Oliv. ist eine andere nordafrikanische Art.
- » 553. *Chrysomela Kutzenzowi* non *Kutzetzowi*.
- » 561. Bei *Phytodecta nivosa* Süffr. fehlen die in Ent. Nachr. 1882 aus Tirol von Gradl beschriebenen a. *8-punctata* und a. *nana* p. 330. a. *nigricollis*, a. *tirolensis*, a. *clythroides* und a. *marginata* p. 331.

Die *Phytodecta*-Namen müssen weibliche Endungen haben, ebenso *Phyllodecta*.

- » 584. *Cassida inundata*, *aurora* und *Panzeri* ist D. 1906 zu streichen und W. 1907, 14 zu setzen.
- » 594. *Otiorrhynchus salicis* Stierl. kollidiert mit *salicis* Ström (p. 603). Ich benenne die Stierlinsche Art *salicicola* Heyd.
- » 600. *Ot. (Dorymerus) niceensis* Strl. = *Meira niceensis* Strl.
- » 609. *Peritelus Reitteri* Vitale ad subgen. *Pseudomeira*.
- » 615. *Nadherus macrops* Reitt. soll nicht von den Seealpen, sondern aus Madagascar, nach Mitteilung von Holdhaus an Flach, stammen und von Sikora gesammelt sein. Verwechslung der Fanggläser.
- » 616. *Eudipnus asturiensis* Chevr., (*brevipennis* Kirsch, orig. coll. Heyden) hier zu streichen. Steht p. 624 richtig bei *Homapterus*.
- » 625. *Sitona* ist weiblich, also *gressoria* etc. Fehler übernommen aus früheren Catalogen, als man die Gattung *Sitones* nannte.
- » 631. *Liophloeus v. hungaricus* Tourn. (orig. unic. coll. Heyden) = *Barynotus obscurus* var.

- p. 631. *Barynotus elevatus* Marsh. (*moerens* auct. non F.) Die Fabricius-Art = *Sitona*.
- » 636. *Chromonotus hirsutulus* non *hirsutus*.
- » 642. *Lixus Lauferi* Petri (*lateralis* Bris. non Panz.) p. 641.
- » 647. *Gronops adde luctuosus* Chevr. Rev. zool. 1861, 120. (Algier Hi.: Calatrava. — Heyd. Span. 206.
Dichotrachelus. Die angegebenen Synonyme von *sulcipennis* sind Arten.
- » 659. *Erirrhinus globicollis* Fairm. 1863 = *Echinocnemus pugnax* Faust (1881) = *confusus* Faust (1883).
- » 661. *Smicronyx Lallemanti* Faust = var. *opacus* Bris.
- » 665. *Mesites cunipes* non *curvipes*.
- » 671. *Rhinoneus* fehlt *gramineus* F. Ent. Sys. I, 1792, 465. Rtrr. 211, E., *inconspicetus* auct. non Hbst.
- p. 671. *Eubrychius*. — Beck benannte seine Art *velutinus* (non *velatus*) von velum, Segel, weil er auf dem Wasser mit Luftblase schwimmt.
- » 673. *Ceutorhynchus effrons* streichen, siehe p. 676.
- » 678. *Ceutorhynchus fossarum* Reich = *Miarus campanulae* L. *C. albofasciatus* Goeze = *Amalus haemorrhous* Hbst.
- » 682. *Balanobius troglodytes* Jekel streichen. Anatolia.
- » 689. *Isochnus Sequensi* 1894 non 1893.
- » 692. *Eutemnoscelis* non *Evtelmnoscelis*.
- » 714. *Lucanus cervus* L. v. *Pontbrianti* Muls. Lyon.
- » 715. *Trox nudicola* Bonnaire Ga. = *Perrisi* Frm. Algier.
Haroldi Flach ist Art.
- » 716 etc. Bei den *Coprophagi* fehlen die vielen Abberationen Mulsants in Col. France Lamellicornes ed. I, 1842. Es würde zu weit führen, sie alle zu nennen. In seiner edit. II, 1871 hat er sie meist weggelassen.
- » 725. *Ceratophyus Olivieri* 1865 non 1864.
- » 726. *Trypocopris Amedei* aus Anatolien streichen.
- » 727. *Lethrus Heydeni* Frm. 1866 ganz ungenügend beschrieben = *Raymondi* Reitt., der, obgleich später (1890) beschrieben, zu gelten hat.
- » 730. *Glaphyrus serratulae* F. et var. sind zu streichen, da sie nicht auf spanischem Gebiet, sondern nur in Algier und Marocco vorkommen.
- » 731. *Anthypna Laportei* non *Lapontei*.
- » 734. *Rhizotrogus foreolatus* non *foreatus*.

- p. 736. *Rhiz. trisinuatus* Rtr. Lu: Sr. Estrella non Hi. m. orig. unic. in coll. Heyden.
- » 737. *Melolontha papposa* a. *rufotestacea* non *testacea*.
- » 745. Bei den *Trichius*-Aberrationen ist als Autor zu setzen: de Rossi in Neviges in Westfalen und nicht der bekannte Italiener Rossi des 18. Jahrhunderts.
- » 748. *Potosia affinis* zufügen: v. *albonotata* Comte A'. 1906, 249, Ga. Roman.
- » 749. *Potosia angustata* zufügen: a. *azurea* König W. 1901, 10. Ca.
- » 752. *Arpedium Schatzmayri* non *Schatzmayeri*.
-

Bemerkungen über die Bestimmungs-Tabelle 60 Curculionidae: Larinus, bearbeitet von Dr. K. Petri 1907.

Von Professor Dr. L. von Heyden in Bockenheim.

In Ann. Soc. Ent. France 1874 veröffentlichte Leprieur das nachgelassene Manuskript von Capiomont (gest. 15. Nov. 1871) über *Larinus* und verwandte Gattungen. Wenn auch Capiomonts Arbeit unvollendet ist, so gibt sein Tableau synoptique und seine Beschreibung der Arten doch eine genügende Übersicht über den damaligen Stand unserer Kenntnis dieser schwierigen Gattungen und waren bis heute das Gerippe, an das sich alle Neubeschreibungen anschlossen.

Capiomont hat auch mein ganzes Material vorgelegen, war aber nach dessen Tod fast zwanzig Jahre verschwunden, bis es Freund Bedel durch Zufall im Pariser Museum unter den Vorräten wieder auffand und so sind eine ganze Reihe Typen, zum Teil unica, gerettet.

Dr. Petri hat es nun in dankenswerter Weise unternommen, die Gattung *Larinus* in Reitters Tabelle Nr. 60 neu zu bearbeiten; auch ihm lag mein ganzes Sammlungsmaterial vor.

Nachstehend gebe ich, ohne mich kritisch über die mühevolle Arbeit zu äußern, eine Reihe von Bemerkungen wie sie mir beim Neueinordnen in die Sammlung an der Hand dieser Tabelle auffielen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1908

Band/Volume: [27](#)

Autor(en)/Author(s): Heyden Lucas [Lukas] Friedrich Julius
Dominicus von

Artikel/Article: [Bemerkungen und Berichtigungen zum Catal. Coleopt.](#)
[Europ. Cauc. et Arm. ross. 1906. 43-48](#)