

**Hemisphaerodella mirabilis n. gen. et sp.,
eine merkwürdige Capsiden-Gattung aus den Antillen.**

Beschrieben von O. M. Reuter in Helsingfors.

Aus dem U. S. National-Museum habe ich durch Herrn Prof. Howard ein sehr merkwürdiges Hemipteron, das aus Kuba und San Domingo stammt, zur Bestimmung erhalten. So fremdartig das Tierchen auch erscheint, ist es jedoch mit Sicherheit zu den Capsiden zu zählen, indem die Struktur sowohl des Ocellen entbehrenden Kopfes, des Rostrums, der Fühler und der Beine, besonders der Hinterhüften, mit den Charakteren dieser Familie übereinstimmen. In derselben kann es nur in die Div. *Bryocoraria* gestellt werden, mit welcher es stachelfreie Schienen, gegen die Spitze deutlich erweitertes letztes Fußglied, weit von einander abstehende Klauen und sehr deutliche, den Klauen anliegende Arolien gemeinsam hat.

Hemisphaerodella n. gen.

Corpus aequaliter semiglobosum, nitidum, impresso-punctatum. Caput basi pronoti paullulum angustius, verticale, a supero visum breve, fortiter transversum, margine anteriore leviter arcuato, vertice linea impressa margini basali parallela instructo ibique punctato; caput ab antico visum distincte transversum, fronte declivi, basi utrinque ad oculum impressione punctata instructa, clypeo basi a fronte leviter discreto, caput a latere visum loris haud discretis, genis mediocribus. Rostrum lineare, apicem coxarum posticarum attingens, articulo primo capiti vix aequelongo. Antennae corpore brevi fere longiores, ad apicem oculorum interne insertae, articulo primo apicem clypei attingente, articulo tertio secundo paullo breviore, quarto tertio paullo breviore, subpenicillato-piloso. Pronotum fortiter transversum, breve, convexum, versus apicem decline, lateribus rectis, apicem versus modice convergentibus, margine apicali capite angustiore, strictura apicali destituta, callis magnis, margines laterales et medium longitudinis subattingentibus, marginibus callorum antico et postico impressis, margine basali recto, versus angulos posticos leviter rotundato. Scutellum pronoto longitudine subaequale, leviter convexum, basi longitudine paullo latius; ipsa basi obtecta. Hemelytra fortiter convexa, coriacea, apice levissime volventia, membrana destituta, apicem abdominis attingentia, clavo cum corio confluente,

cuneo haud discreto, corio margine exteriore late curvato, interiore usque ad tertiam apicalem partem fortiter sinuato. Metadorsum inter margines sinuatos hemielytrorum conspicuum, medio carina longitudinali instructo. Pedes longissimi et sat validi, coxis anticis longis, femoribus sublinearibus, posticis anticis parum crassioribus, tibiis spinulis destitutis, tarsis articulo tertio duobus primis simul sumtis multo longiore, apicem versus leviter sed distinete incrassato, unguiculis valde divaricatis, aroliis distinctis et ad unguiculos approximatis.

H. mirabilis n. sp.

Nigra, nitida, laevis, rostro, genis, antennis pedibusque pallide flavis, inferne flavovariegata; interdum linea tenuissima longitudinali pronoti in verticem prolongata testacea; pronoto ante callos subtiliter transversim strigoso et subtilius punctato, pronoto pone callos hemielytrisque fortius punctatis, scutello nonnihil subtilius punctato, venis hemielytrorum laevibus. — Long. 1—1.9 mm, lat. 0.7—1 mm.

Cuba: Cayamos, d. 29. dec. et 14. jan., D. E. A. Schwartz; St. Domingo, d. 4. sept. 1905, D. Aug. Busck.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1908

Band/Volume: [27](#)

Autor(en)/Author(s): Reuter Odo Morannal

Artikel/Article: [Hemisphaerodella mirabilis n.gen. et sp.](#) 297-298