

Bemerkungen zu *Epuraea Mühli* Reitter

in Wr. Ent. Ztg. 1908, pag. 245.

Von Forstrat Mühl in Frankfurt a. d. O.

In der Beschreibung des Herrn Autors sind die Fühler als „einfärbig rotgelb“ bezeichnet. Es muß ein auffallend helles Stück vorgelegen haben und um Mißdeutungen zu begegnen, bemerke ich, daß bei den 23 Stücken, welche ich in Händen hatte, die Fühlerkeule braun bis schwarz ist, etwa wie bei *E. terminalis*, und sich bei dem hellsten, mir bekannten Exemplare noch wesentlich dunkler als die Fühlergeißel und die Unterseite des Halsschildes zeigt.

Für die in der Tatra sammelnden Kollegen will ich noch anführen, daß die Art, welche durch matte Oberseite und abweichende Gestalt auffällt, von mir im Juli 1899 und wiederholt 1902 in dem alten Weißtannenbestande, welcher südlich der Straße Béla-Zdjár zwischen dem Orte Höhlenbain (Tátra-Barlangliget) und dem Maria Theresienwege liegt, aus ziemlich frischen Weißtannenästen, welche nach Fällung der von *Cryphalus piceae* befallenen alten Stämme auf kleine Haufen zusammengeworfen waren, geschüttelt wurde. Wahrscheinlich ist sie weiter verbreitet und wird nur verkannt; unter den zahlreichen Epuräen, welche ich im Altvater-, Glatzer-Iser- und Riesengebirge sammelte, fand sie sich aber nicht.

Lepidopterologische Bestimmungsübungen.

Die naturhistorische Fachgruppe des Wiener Volksheims (XVI. Bez. Koflerpark Nr. 7), welche trotz der relativ kurzen Zeit ihres Bestandes bereits über hübsche Sammlungen und eine nicht unbedeutende Fachbibliothek verfügt, plant in nächster Zeit in Erweiterung ihrer bisherigen Tätigkeit einen allgemein zngänglichen lepidopterologischen Sprechabend einzuführen, an welchen Anfängern eine Anleitung zur Bestimmung von Schmetterlingen geboten werden wird. Die Abende, welche von Mitte Jänner ab alle 14 Tage (Mittwoch 8—9 Uhr abends) stattfinden, stehen unter fachmännischer Leitung des Herrn Fritz Wagner. Beginn 20. Jänner.

Corrigenda.

Im Jahrgang XXVII, 1908, pag. 116, lies: Glied 8 der Fühler nicht kürzer als die umgebenden Glieder — statt: Glied 8 der Fühler viel kürzer als die umgebenden.
E. Reitter.

Jahrgang 1908, 10. Heft, pag. 308, zweite Zeile von unten, lies „fleißiger“ statt: flüssiger.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1909

Band/Volume: [28](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Corrigenda. 37](#)