

## Eine neue Varietät des *Phaedon pyritosus* Rossi aus Turkestan.

Vom Sanitätsrat Dr. A. Fleischer in Brünn.

### *Phaedon pyritosus* v. *alutaceus* n. sp.

Im Habitus, in der Größe und Farbe vollkommen mit *pyritosus* übereinstimmend; die Seitenrandleiste an den Flügeldecken hinter den Schultern hört in derselben kurzen Entfernung wie bei *pyritosus* auf; unterscheidet sich aber durch viel feinere Punktierung am Kopfe, Halsschild und den Flügeldecken, so daß die Chagrinierung der Grundskulptur auf der ganzen Oberfläche neben den feinen Punkten deutlicher hervortritt als bei *pyritosus*, und dadurch die Oberfläche ein wenig matt erscheint; die feinen Punkte in den Punktreihen der Flügeldecken stehen nicht in so geraden Reihen, wie die viel stärkeren Punkte bei *pyritosus*, sondern treten bald nach außen, bald nach innen aus der geraden Reihe heraus, wodurch mehr geschlängelte, und ganz ungleichmäßige Reihen entstehen.

Im übrigen ist der Käfer mit *pyritosus* übereinstimmend und ich halte denselben, weil der Unterschied nur in der Skulptur liegt, nur für eine Rasse des ersteren. Long. 3—3·5 mm.

Kuschik, (Turkestan) in Mehrzahl.

### Eine neue *Atomaria* s. str.

Vom Sanitätsrat Dr. A. Fleischer in Brünn.

### *Atomaria marginata* n. sp.

Habituell der *A. alpina* zunächst stehend, etwas kleiner, mehr depreß, etwa wie bei *linearis*.

Kopf, Halsschild und Unterseite schwarz, Fühler, Beine und Flügeldecken gelbrot; letztere an der Naht mit einem breiten schwarzen Längsstreifen, welcher im hinteren Drittel verschwindet am Seitenrande zieht von der Schulter ein ebenso langer und breiter Streifen; Fühler schlanker und kürzer als bei *alpina*; die Fühlerwurzeln stark aneinander genähert, die zwei vorletzten Glieder verkehrt kegelförmig, nur wenig breiter als lang. Halsschild etwas schmaler als die Flügeldecken, etwas breiter als lang, an den Seiten sehr wenig gerundet, mit fast rechtwinkligen Hinterecken, wenig gewölbt, ohne Quereindruck vor der Basis, stark und grob punktiert, stärker als die Flügeldecken vorn, viel stärker als bei der ähnlichen *alpina*. Flügeldecken gestreckt, niedergedrückt, besonders in der Mitte jeder Flügeldecke, vorn viel stärker punktiert als rückwärts. Long. 1·5 mm. — Aulie-Ata, ein Exemplar.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1909

Band/Volume: [28](#)

Autor(en)/Author(s): Fleischer Anton

Artikel/Article: [Eine neue Varietät des \*Phaedon pyritosus\* ROSSI aus Turkestan. 271](#)