

## Danacaea Rambouseki sp. nova (Col.)

Von Prof. J. Roubal, Příbram (Böhmen).

Ich erhielt von der ersten Exkursion nach Bulgarien des Herrn Ph. St. F. Rambousek zur Bearbeitung das Material der Gattung *Danacaea* und die Mordelliden. Unter *Danacaea* sind bloß drei Spezies vorhanden: *D. pallipes* Panz. in wenigen Exemplaren, *D. serbica* Kiesw. sehr häufig, die dritte in zwei Exemplaren vorliegende ist eine neue Art, deren Beschreibung hier folgt:

Die Art gehört in Procházkas Gruppe C. (Best. Tab. d. eur. Col.: Canthar., II. Th. Gen. *Danacaea*. XXX. Hft. 1894.) und steht in der Nähe von *D. opulenta* Schilsky (= *hypoleuca* Proch. nec Kiesw.)

Erzgrün, glänzend; die Behaarung hellgrünlich gefärbt. Die Fühler bis zum 6. Glied, die Füße außer den Tarsen hell rotgellb, die Fühlerenden und die Tarsen angedunkelt, die Mandibeln dunkel, an der Spitze rötlich durchscheinend, die Palpen dunkel.

Die Behaarung spärlich; die Schuppenhärchen ziemlich dick, dicker als z. B. bei *D. pallipes* Panz.

Der Kopf breiter als lang, grob punktiert, auf der Stirn mit zwei Eindrücken, die Augen wenig vorspringend, die Schläfen kurz.

Der Halsschild schmaler als der Kopf, so breit als lang, grob punktiert, in der Mitte stumpf erweitert, davon nach hinten stark verengt, die Hinterecken vollkommen abgerundet, nach den Vorder- und vor den Hinterecken niedergedrückt, ziemlich grob punktiert. Die Flügeldecken weniger grob und dicht punktiert als der Halsschild, schlank.

Long. 4.25 mm.

Rumelia, Sliven, 19. VI. 1908.

Ich widme diese Art dem Entdecker, Herrn Ph. St. F. Rambousek, Kr. Vinohradý (Böhmen).

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1909

Band/Volume: [28](#)

Autor(en)/Author(s): Roubal Jan

Artikel/Article: [Danacaea Rambouseki sp.nova \(Col.\). 341](#)