

zur vierten Längsader, von dieser geht die Bräunung bis zum ersten Drittel der Discoidalzelle, worauf sie die vierte Längsader bis an die Basis des Flügels begleitet. Ausserdem läuft entlang der vierten Längsader noch ein schmaler, brauner Strich, erreicht aber das Ende derselben nicht. Schwinger gelb. Long. 12 mm. — *Patria*: Canarische Inseln.

Echinomyia fera L. var. *canariensis* Macq. Ist *Echin. canariensis* Macq., Dipt. exot. III., pag. 37, welche ich nur für eine grössere Varietät von *E. fera* L. halte.

Tachina larvarum L.? ebenfalls durch den Weingeist verdorben und nicht sicher zu bestimmen.

Stomoxys calcitrans L.

Coleopterologische Notizen.

Von Edm. Reitter.

III.

26. *Triarthron Cedonulli* Schauf. (Ann. Fr. 1882, pag. 43) aus Californien stimmt bis auf die bei den Anisotomiden variable Grösse mit *T. Lecontei* Horn (Trans. Amer. Ent. Soc. VIII. 1880, pag. 279) von Oregon und Californien überein.

27. *Aglenus major* Schauf. (l. c. pag. 48), der von *A. brunneus* Gyll. durch dunklere Färbung mit deutlicher Punktirung als Species getrennt wird, ist sicher nur eine Varietät des letzteren.

28. *Zeatyrys Lawsoni* Sharp (Ent. Monthl. Mag. Juli 1881, pag. 48) habe ich in den Verhandlungen des naturforsch. Vereines von Brünn, XX. pag. 204 zu *Tyrus* gestellt, weil Sharp am Schlusse seiner Beschreibung bemerkt, dass mit dieser Art „zunächst verbunden sind“ *Tyrus mirandus* und *T. mutandus*, wovon der letztere, welchen ich in typischen Stücken besitze, in der Form der Maxillartaster von dem Typus der Gattung *Tyrus* durchaus nicht abweicht. Bei *Zeatyrys Lawsoni* hingegen ist das zweite Glied der Palpen langgestreckt, gegen die Spitze gebogen, an der letzteren ausgerandet und nach hinten winkelig erweitert, die Winkelspitze mit einem langen Borstenhaare versehen; das dritte Glied klein, so lang als breit, das letzte äusserst verbreitert, breit keulenförmig, an der Spitze mit einem kleinen Höckerchen. Die Gattung *Zeatyrys* mit der Art *Lawsoni* ist mithin hinter *Pselaphodes* einzureihen.

29. Nach schriftlicher Mittheilung des Herrn George Lewis ist der als Pselaphide beschriebene *Pselaphanax* Walker (1859), dessen Type von Lewis untersucht wurde, mit *Ega* (Casteln. 1835) *Westermanni* Motsch. (1857), also einem Carabiden, identisch.

30. *Cryptophagus Betae* Maquart, Annales des sciences naturelles, XXIII. (1831), 95, der meines Wissens bisher nicht gedeutet wurde, scheint der Beschreibung nach mit *Paramecosoma melanocephalum* Herbst identisch zu sein.

31. *Peritelus Caucasicus* Stierl. = *Otiorrhynchus Kirschii* Stierl. Der letzte Name ist der giltige.

32. *Articerus striticornis* Rtrr. Deutsch. Ent. Zeitschr. 1883, pag. 33 ist ein *Fustiger*.

33. *Phyllocerus herculeanus* Schauf. ist nach dem Materiale des kaiserl. Hofmuseum in Wien das ♀ von *Ph. longipennis* Ferrari und zwar mit einfarbig dunklem Körper, analog der Varietät *Grohmanni* von *Ph. flavipennis*.

34. *Carabus gemellatus* Falderm. ist von der gleichnamigen Ménétris'schen Art verschieden und ohne Zweifel mit meinem *C. Imitator* aus Swanetien identisch. Der *Car. gemellatus* Fald. ist ein mit *C. Bohemani* verwandtes Thier aus Talysch (an der persischen Grenze) und mit ihm ist wahrscheinlich *C. separandus* Kraatz von derselben Localität identisch. Dass Ménétris den *C. Imitator* nicht als Art erkannt hat, geht aus der Vaterlands-Angabe bei *Car. Stählini* sicher hervor. Nach ihm kommt letzterer in der hohen Gebirgskette des Caucasus, am Elbrus, Kasbek und Schadach vor; die *Stählini*-artigen Thiere vom Elbrus sind jedoch durchweg *C. Imitator* und *Swaneticus*. *C. Stählini* scheint nicht so weit westlich im Caucasus aufzutreten, aber keine dieser oder ähnlicher Arten finden sich südlich vom Caucasus, in Talysch.

35. *Pachytychius Kirschi* Tourn. von Oran = *P. puncticollis* Reitter.

36. *Carabus acutangulus* Chaud. Natural. 1879, pag. 109, von Erzerum, ist sowohl nach der Beschreibung, als auch nach dem mir von Herrn R. Oberthür freundlichst gesendeten Chandoir'schen Typus, eine unzweifelhafte, ziemlich kräftig sculptirte Varietät von *C. convexus*.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Reitter Edmund

Artikel/Article: [Coleopterologische Notizen. 95-96](#)