

Zwei neue Coleopteren.

Von Edm. Reitter in Paskau (Mähren).

Gastrallus Rollei n. sp.

Schmal und lang, parallel, braunrot, dicht und äußerst fein, staubartig behaart, fast matt. Kopf geneigt, von oben nicht sichtbar, Halsschild so lang als breit, von der Breite der Flügeldecken, Vorderrand gerundet, einfach, die chagrinierte Scheibe von der Mitte nach hinten mit erhabenem, vor der Basis verkürztem Längskiel, die Seiten daneben jederseits flach, vertieft, die Basalkante etwas aufgebogen. Schildchen klein, aber deutlich. Flügeldecken lang, parallel, dreimal so lang als der Halsschild, hinten gemeinschaftlich abgerundet, oben chagriniert, mit Spuren von Längsreihen, die seitlichen 3 Streifen stärker ausgeprägt, die Scheibe hinter der Basis im ersten Viertel ihrer Länge mit einem Quereindruck, die Naht weit vor der Spitze mit stärkerer Wölbung, von da zur Spitze flach abfallend. Beine dünn, die Tarsen heller. Long. 2·2—3 mm.

Von den bekannten Arten durch sehr lange und schmale Form, hinten gekielten Halsschild und etwas gebuckelte Flügeldecken abweichend. Herr. Rolle, Direktor der landwirtschaftlichen chemischen Versuchsstation, der sich mit Musealschädlingen befaßt, fand ihn im Museum von Peruvia und Barcelona in einiger Zahl und wurde ihm zu Ehren benannt.

Tanatophilus armeniacus n. sp.

Neue Art aus der nächsten Verwandtschaft von *pilosus* Jakowl. und *porrectus* Semen. aus Zentralasien, aber durch stärkeren Glanz, spärlichere Punktur, gleichmäßig hohe Rippen der Flügeldecken und dunkle, äußerst feine Behaarung verschieden.

Schwarz, etwas glänzend, nur das letzte sichtbare Sternit und Tergit rot, Kopf spärlich punktiert, rötlich behaart, Halsschild wenig dicht, fein punktiert, dunkel behaart, dazwischen mit heller Behaarung auf dem vorderen Seitenteile der Scheibe, mit einer Mittellinie und einem Schrägeindruck neben den hinteren Seiten. Schildchen dicht punktiert, in der Mitte mit gelben, schütterten Haarflecken. Flügeldecken parallel, wenig dicht, fein punktiert, mit 3 gleich hohen Rippen, Spitze flach und stumpf gerundet, beim ♂ das Analsegment rot behaart. Die Vordertarsen sind beim ♂ erweitert und mindestens so breit als die Schienen. Long. 10 mm.

1 ♂ von Kagysman in Russisch-Armenien.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: [31](#)

Autor(en)/Author(s): Reitter Edmund

Artikel/Article: [Zwei neue Coleopteren. 104](#)