

E. Landrocki (36), *E. membranacea* (37). — Tipulidae: *Tipula simplicicornis* (44), *T. brevicornis* (46). — Limnobiidae: *Dicranomyia distendens* (51), *D. cinereipennis* (52), *D. ponajensis* (53), *D. magnicauda* (54), *Rhypholophus pseudosimilis* (58), *Empeda areolata* (61), *Dicranota robusta* (66). Die Hypopygien der neuen Arten werden auf den sieben Tafeln abgebildet.

Lundström, Karl. Neue oder wenig bekannte europäische Mycetophiliden. II. (Mit 1 Tafel.) Annales Mus. National. Hungar., Vol. 10. 1912, p. 514—522.

Der Verfasser beschreibt folgende neue Arten aus Ungarn: *Platyura forcipula* (514) — *Loewiella hungarica* (516) — *Anaclinia minor* (517) — *Mycetophila pulchra* (518) — *M. calva* (519) — *M. triangularis* (520) — *M. posticalis* (521). Ferner: *Sciophila corcyrensis* (515) aus Corfu. A. Hetschko.

Notiz.

Julius Gerhardt, der Nestor der schlesischen und wohl auch der deutschen Coleopterologen, ist am 17. November v. J. nach kurzem Kranklager in Liegnitz hochbetagt gestorben.

Druckfehlerberichtigung.

Auf Seite 331, Zeile 1 von oben, des Jahrg. 1912 dieser Zeitung, soll Männchen statt Weibchen stehen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [32](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Notiz. 24](#)