

valachiae 71	velezianus 29	viridisetosus 84
valarsae 47	venustus 107	vitellus 112
validicornis 99	ventricola 44	vittatus 41
validus 55	versipellis 31	vlasuljensis 33
valtellinus 95	vestitus 93	vochinensis 46
variegatus 75	vesulianus 51	vranensis 27
vastus 70	vicinus 31	vulgaris 87
Vaulogeri 88	villosopunctatus 50	Weisei 79
vehemens 47	virgo 76	Winneguthi 70
velebiticus 26	viridilimbatus 36	Zustalestus 91

Otiorrhynchus apulus n. sp.

Per A. e F. Solari (Genova).

Subovatus, brunneus, rostro capite aequilongo, late et obsolete excavato, dense rugoso-punctato; oculis rotundatis, sat prominulis; capite convexo, dense punctato, fronte plana, lata, ut in rostro dense rugoso-punctata et in medio foveola elongata obsita; antennis subgracilibus, funiculi articulo 2° primo aequilongo, 3° et 4° brevioribus, obconicis, reliquis transverso-rotundatis; thorace longitudine latiore, lateribus valde ampliato, antice angustato, postice constricto, maxima latitudine post medium, villosus, densissime punctato, punctis umbilicatis, lateribus rugoso-subgranulato; elytris convexis, ovato-rotundatis, thorace valde latioribus, humeris rotundatis, parum profunde sulcato-substriato-punctatis, interstitiis subconvexis, sulcis multo latioribus, irregulariter obsoleteque granulatis, dense et irregulariter villososetosis (setis longis et hispidis) et squamulis piliformibus micantibus obsitis. Pedibus sat robustis, sat longe hispido-villosis. Subtus rugoso-punctato, segmentis abdominis 2°, 3° et 4° punctatis, processu mesosternali triangulari, sublineari.

♂ Angustior, segmento abdominis 1° late depresso, segmento anali undique profunde, crebre punctato.

♀ Segmento abdominis 1° medio impresso, segmento anali crebre punctato, apicem versus obsolete transversim impresso.

Long. $4\frac{1}{2}$ — $4\frac{3}{4}$, lat. $2\frac{1}{4}$ — $2\frac{1}{2}$ mill.

Grottagnie (Murgie), G. Paganetti-Hummler.

Molto simile all' *O. indefinitus*, specialmente alla ab. *squamulipennis*; se ne distingue però con facilità per la vestitura del corpo abbastanza diversa e per il segmento anale fortemente punteggiato tanto nel ♂ che nella ♀. Inoltre mentre nell' *indefinitus* la punteggiatura occupa soltanto la fronte e si arresta al margine posteriore degli occhi, nell' *apulus* la testa è punteggiata molto visibilmente e densamente fino alla base.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [32](#)

Autor(en)/Author(s): Solari Angelo F.

Artikel/Article: [Otiorrhynchus apulus n.sp. 118](#)