

valachiae	71	velezianus	29	viridisetosus	84
valarsae	47	venustus	107	vitellus	112
validicornis	99	ventricola	44	vittatus	41
validus	55	versipellis	31	vlasuljensis	33
valtellinus	95	vestitus	93	vochinensis	46
variegatus	75	vesulianus	51	vranensis	27
vastus	70	vicinus	31	vulgaris	87
Vaulogeri	88	villoso-punctatus	50	Weisei	79
vehemens	47	virgo	76	Winneguthi	70
velebiticus	26	viridilimbatus	36	Zustalestus	91

Otiorrhynchus apulus n. sp.

Per A. e F. Solari (Genova).

Subovatus, brunneus, rostro capite aequilongo, late et obsolete excavato, dense rugoso-punctato; oculis rotundatis, sat prominulis; capite convexo, dense punctato, fronte plana, lata, ut in rostro dense rugoso-punctata et in medio foveola elongata obsita; antennis subgracilibus, funiculi articulo 2º primo aequilongo, 3º et 4º brevioribus, obconicis, reliquis transverso-rotundatis; thorace longitudine latiore, lateribus valde ampliato, antice angustato, postice constricto, maxima latitudine post medium, villoso, densissime punctato, punctis umbilicatis, lateribus rugoso-subgranulato; elytris convexis, ovato-rotundatis, thorace valde latioribus, humeris rotundatis, parum profunde sulcato-substriato-punctatis, intersticiis subconvexis, sulcis multo latioribus, irregulariter obsoleteque granulatis, dense et irregulariter villososetosis (setis longis et hispidis) et squamulis piliformibus micantibus obsitis. Pedibus sat robustis, sat longe hispido-villosis. Subtus rugoso-punctato, segmentis abdominis 2º, 3º et 4º punctatis, processu mesosternali triangulari, sublineari.

♂ Angustior, segmento abdominis 1º late depresso, segmento anali undique profunde, crebre punctato.

♀ Segmento abdominis 1º medio impresso, segmento anali crebre punctato, apicem versus obsolete transversim impresso.

Long. $4\frac{1}{2}$ — $4\frac{3}{4}$, lat. $2\frac{1}{4}$ — $2\frac{1}{2}$ mill.

Grottaglie (Murgie), G. Paganetti-Hummel.

Molto simile all' *O. indefinitus*, specialmente alla ab. *squamulipennis*; se ne distingue però con facilità per la vestitura del corpo abbastanza diversa e per il segmento anale fortemente punteggiato tanto nel ♂ che nella ♀. Inoltre mentre nell' *indefinitus* la punteggiatura occupa soltanto la fronte e si arresta al margine posteriore degli occhi, nell' *apulus* la testa è punteggiata molto visibilmente e densamente fino alla base.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [32](#)

Autor(en)/Author(s): Solari Angelo F.

Artikel/Article: [Otiorrhynchus apulus n.sp. 118](#)