

8. *Labidogaster grandis* B. B.

Cette espèce dont j'ai reçu 3 ♂ ♂ n'est rien autre chose que *Dionaea forcipata* Meig. type.

9. *Parexorista clavellariae* B. B.

Bonne espèce dont *Exorista laxiceps* Pand. est synonyme.

Une ♀ porte l'étiquette: „Chodau, Stein“ avec la mention: „ad *agnata* Rond.“ — On sait qu'elle a été décrite par Brauer et Bergenstamm comme une variété de *Parex. clavellariae*. Or, elle appartient à une espèce bien distincte et je trouve rangé parmi *Parex. grossa* B. B. un individu qui, à n'en pas douter, doit être le ♂ de cette soi-disant variété! Celle-ci a la nerv. transv. apicale de l'aile courte et naissant en angle droit à sommet mousse; les palpes passent au jaunâtre vers l'extrémité; la taille est d'environ 9—10 millim. Pandellé lui a donné le nom de *glirina* Rond. — Il convient de faire remarquer immédiatement que l'espèce *glirina* dans la collection Br. et Bergenst. est représentée par 2 ♀ ♀ plus robustes et plus grandes (12 millim.), ayant le front un peu plus saillant et les palpes entièrement jaunes. Quelle est la véritable espèce de Rondani: est-ce *glirina* B. B. ou *glirina* Pand.? Je ne sais. Du reste, ces 2 formes très voisines entre elles sont aussi très voisines de *Exorista glauca* Meig.: c'est un groupe en évolution, mal fixé, à variations fréquentes. On peut en dire autant de *Exorista agnata* Rond. qui s'en distingue parfois difficilement, par ses seuls palpes noirs.

***Otiorrhynchus Jovis* Miller var. *Holdhausi* nob.**

Per A. e F. Solari (Genova).

Robustior, magis parallelus, antennis paullo validioribus, clava crassiore, thorace magis ampliato, clytris lateribus subparallelis, tantulum longioribus. — ♂ latet.

All'infuori delle differenze indicate null'altro si osserva che possa comunque servire a far specificamente separare questa razza locale dalla forma tipica del *Jovis*.

La differenza nella forma degli elitri è abbastanza forte; nel *Jovis* gli elitri si restringono in curva regolare a partire dalla loro metà, nel *Holdhausi* invece sono subparalleli ai lati per circa $\frac{2}{3}$ della loro lunghezza e poi si restringono rapidamente fino all'apice.

Anche nella regione omerale gli elitri sono più arrotondati nel *Jovis*, più paralleli nel *Holdhausi*.

Lago S. Giovanni: Gargano.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [32](#)

Autor(en)/Author(s): Solari Angelo F.

Artikel/Article: [Otiorrhynchus Jovis MILLER var. Holdhausi nob. 121](#)