

Description d'une nouvelle espèce du genre *Rhinomorinia* Br. et Berg. (Dipt.)

par le Dr. J. Villeneuve, de Rambouillet.

Cette espèce est remarquable par sa bouche saillante en museau, disposition assez fréquente chez les espèces alpines appartenant aux Tachinidae et Anthomyidae. Elle a été prise par M. Oldenberg dans les Alpes italiennes.

Rhinomorinia subrostrata n. sp., ♂ et ♀.

Ab aliis differt ore valde exserto setaque antennarum fere omnino nuda.

♂. Il ressemble à *Rhin. puberula* Zett., mais la saillie de la bouche fait que la grande vibrisse affleure le bord supérieur de l'ouverture buccale au lieu d'être située un peu au dessus. Les yeux sont plus obliques vus de profil; la portion rétrooculaire du péristome apparaît comme 2 fois environ plus étendue que chez *Rhin. puberula*. Le chète antennaire est à peine pubescent; les palpes sont d'un roux obscur, les gènes velues seulement près des soies frontales. Les yeux, au vertex, ont un écart d'à peu près $\frac{2}{5}$ de diamètre oculaire (chez *R. puberula*, au contraire, les yeux se rapprochent jusqu'à n'être plus distants que de $\frac{1}{5}$ d'œil). L'abdomen a le 1^{er} segment nu; le 2^e avec des soies marginales; les 3^e et 4^e segments avec des soies marginales et discales. Le coude de la 4^e nervure longitudinale de l'aile est arrondi ici tandis qu'il est en angle mousse chez *Rhin. puberula*. La taille est la même.

♀. Elle a la coloration de *Rhin. sarcophagina* Schin. ♀ mais l'aspect du chète antennaire et la bouche beaucoup plus proéminente permettront d'éviter toute confusion.

Provenance: Macugnaga (25. VII. 1900).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [32](#)

Autor(en)/Author(s): Villeneuve Janti Joseph de

Artikel/Article: [Description d'Â'une nouvelle espèce du genre Rhinomorinia BR. et BERG. \(Dipt.\). 178](#)