

Deux espèces européennes inédites du genre *Cyrtopogon* Loew (Dipt.)

par le Dr. J. Villeneuve.

(Avec 1 figure.)

1. *Cyrtopogon pyrenaicus* n. sp., ♂ et ♀.

Syn.: *C. pyrenaicus* Pand. i. litt.

♂. Comme *C. pulchripes* Lw. dont il se différencie seulement par la taille plus grande et par une autre coloration des segments abdominaux. Tandis que, chez *C. pulchripes*, la pruinose et la pilosité d'un cendré jaunâtre ne couvrent que les 2^e et 3^e segments, elles envahissent aussi les côtés du 4^e segment chez *C. pyrenaicus*, en ménageant à la face dorsale un large espace triangulaire qui s'appuie par sa base sur le 5^e segment dont il a la coloration noire veloutée à cause de la présence commune d'une brosse rase de poils serrés. A droite et à gauche, une brosse semblable vient encadrer les derniers segments abdominaux, laissant à découvert une grande partie de leur face dorsale qui se montre d'un noir assez mat. Les 2^e, 3^e, 4^e et 5^e segments sont assez largement dénudés sur leurs flancs sous forme de plaques plus ou moins quadrangulaires d'un noir brillant.

♀. Celle-ci est difficile à distinguer de *C. ruficornis* Meig. — Le thorax m'a paru plus court, l'abdomen plus allongé, à côtés presque parallèles, moins convexe. Les 2^e, 3^e, 4^e et 5^e segments sont totalement couverts au milieu par la pruinose, dénudés latéralement dans la moitié antérieure qui apparaît d'un noir brillant; sur les 4^e et 5^e segments la pruinose affecte plutôt la forme triangulaire.

Chez *C. pyrenaicus*, le 3^e article des antennes est un peu plus court et, dans les 2 sexes, plus ou moins rembruni dans sa moitié basale. Les ailes teintées légèrement de gris sale ont les nervures transv. nettement enfumées. Taille: ♂♂, 12—15 millim.; ♀♀, 16—18 millim.

Cette espèce est assez répandue dans les Pyrénées. Je l'ai prise à Vernet-les-bains (Pyrénées-Orientales) où elle est commune en juillet; il y en a plusieurs individus dans la collection Pandellé (2 ♂♂, 2 ♀♀) qui proviennent de Gavarnie. La description a été établie par comparaison avec un ♂ de *C. pulchripes* Lw. recueilli à Tuovilanlaks (Finlande) par Palmén et une femelle unique de *C. ruficornis* Meig. qui a les Alpes italiennes pour origine.

180 Dr. J. Villeneuve: Deux espèces du genre *Cyrtopogon* Loew (Dipt.).

2. *Cyrtopogon platycerus* n. sp., ♀.

Espèce entièrement noire; pruinosité grise et dense couvrant le front, la face entière et le thorax, ce dernier portant 3 bandes dorsales dénudées et d'un noir terne. Scutellum gris sauf sur le bord libre. Abdomen d'un noir brillant; tous les segments, à l'exception du dernier, marqués d'une bande blanche qui, de chaque côté, va en s'amincissant pour disparaître bien avant d'atteindre le milieu de la face dorsale. Face couverte d'une longue et abondante pilosité noire; front hérissé de poils plus courts mais plus serrés et plus fins excepté au voisinage des antennes qui sont surmontées d'un espace glabre. Celles-ci sont caractéristiques: entièrement noires, courtes et robustes, avec le 3^e article large et triangulaire, terminé par un long style également noir (Fig. 1). Ailes hyalines, avec les nervures très noires. Taille: 11 millim. $\frac{1}{2}$.



Fig. 1.

Une seule femelle prise en juillet à Bérisal (Suisse) par mon distingué ami M. de Gaulle, qui me l'a offerte pour ma collection.

Verzeichnis der Schriften von Ludwig Ganglbauer.

Nachtrag.¹⁾

144. Von Herrn E. König in Turkmenien gesammelte Buprestiden und Cerambyciden.
Horae soc. entom. Ross., T. 22, 1888, p. 192—198.
145. Eine neue Phytoecia.
Horae soc. entom. Ross., T. 22, 1888, p. 376.
146. Synopse des Oedemerides de l'Ancien-Monde.
L'Abeille, T. 25, 1888 (38 pg.) (Übersetzung von Nr. 1).
147. Neue Cerambyciden aus Rußland. (*Toxotus turkestanicus* und *Hybometopia* Starcki).
Horae soc. entom. Ross., T. 23, 1889, p. 280—285.
148. Neue Fundorte von Höhleninsekten.
Ann. d. naturh. Hofmus. Wien, 4. Bd., 1889, Notizen, p. 103.
149. Nove Pselaphide iz Bosne i Hercegovine.
Glasnik Zemk. Muz. u Bosni i Herceg., T. 8, 1896, p. 201—204. (Übersetzung von Nr. 85.)
150. [*Trechus* (*Anophthalmus*) *Holdhausi* n. sp.].
Beiträge zur Kenntnis der Koleopteren-Geographie der Ostalpen von K. Holdhaus — München. Koleopt. Zeitschr., 2. Bd., 2. Liefg., 1904, p. 224—225.

A. Hetschko.

¹⁾ S. Wien. Entom. Zeitg., 1913, I. Heft, p. 7.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [32](#)

Autor(en)/Author(s): Villeneuve Janti Joseph de

Artikel/Article: [Deux espèces européennes inédites du genre Cyrtopogon LOEW \(Dipt.\). 179-180](#)