

Urodon rufipes Oliv. var. nigritarsis nov.

Von Edm. Reitter in Paskau (Mähren).

Mit der Stammform übereinstimmend, aber die Fühler und Beine ganz schwarz, was die Zugehörigkeit zu *rufipes* sehr erschwert, weshalb auch die Aufstellung dieser Form notwendig erscheint. In seltenen Fällen sind die Vorder- und Mittelschenkel dunkel braun, Fühler und Tarsen bleiben tief schwarz. Die Behaarung der Oberseite etwas von der Stammform verschieden, entweder graugelb oder weißlichgrau; auch die Stärke der Behaarung ändert etwas ab.

Herr Zeman fand diese Form am 5. Juni 1915 auf *Reseda* zahlreich bei Prokop in Böhmen und sandte sie mir als *pygmaeus*, mit dem sie wenig Ähnlichkeit hat.

Verbesserung zur Bestimmungstabelle der Adesmia-Arten.

In der Bestimmungstabelle der *Adesmia*-Arten. W. E. Ztg. 1916, Heft I—II (Bestimmungstab. d. pal. Coleopteren, 76. Heft) ist durch ein unliebsames Versehen der Absatz 3' auf p. 7 an eine falsche Stelle gelangt.

Ich bitte dringend an der betreffenden Stelle folgende Anmerkung zu machen: Absatz 3' (auf p. 7) gehört auf p. 8, hinter den Absatz 4'.
Edm. Reitter.
