

herculeanus 89, Heydeni 78, humeralis 86, Hummleri 80, Hylis 85, Hylocharis 81, Hypocoelus 85, Hypohylis 85, Hyporrhagus 81. imitator 86, immaculatus 74, inhumeralis 86, ineditus 85, Isorhipis 75. Königi 84. — laticollis 66, latior 67, Lepaigei 76, lepidus 79, limbatus 86, longicornis 80, longipennis 89, longulus 67. macrotis 77, Manuelli 79, Marmottani 76, maronita 78, Matthiesseni 86, Megathambus 78, Melasis 75, melasoides 76, Micado 68, Micorrhagus 79, minutus 72, modestus 68, Morawitzi 79, mordelloides 74, morulus 70, musculus 85. — Nematodes 84, nigriceps 77, nitidus 79, nominandus 79. obtusus 72, orientalis 72, Otho 87, ovalis 73. penicillus 70, Phlegon 84, Phyllocerus 88, Potanini 77, procerulus 85, Prosopotropis 83, pusillus 72, pygmaeus 79, pyrenaeus 80. Rougei 68, rufangulus 74, rufescens 76, rufipennis 76, rufulus 71. Sahlbergi 81, Schenklingi 71, Seidlitz 87, semicastaneus 76, sibiricus 77, siculus 81, Silenus 87, similis 67, simplicifrons (Trixagus) 70, (Hypocoelus) 85, Spinolae 89, spondyloides 87, subparallelus 74, sulcatus 74. Thambus 78, Tharops 76, Throscus 66, Trixagus 66, turkestanicus 71. — Ullmanni 89, unicolor 81. — Xylobius 86, Xylophilus 87.

Cryptophagus cellaroides n. sp. (Col. Cryptophag.)

Von Edmund Reitter.

Dem *Cr. cellaris* Scop. in Form und Färbung ähnlich. Von demselben in nachfolgenden Punkten abweichend:

Die Augen sind viel kleiner und stehen seitlich stärker vor, sind feiner fazettiert und kürzer als der Vorderkopf von den Augen zum Clypeusrande; die vorletzten 2 Fühlerglieder sind stärker quer und nicht konisch; der Halsschild ist weniger parallel, zur Basis stärker verengt, oben sehr dicht, aber viel stärker punktiert, die Punktur ist doppelt so stark als jene auf den Flügeldecken, die Vorderwinkel sind nicht schräg linienförmig wie bei *cellaris*, sondern viel stärker entwickelt, hakenförmig, aussen gebogen und münden in eine schärfere, grössere Spitze am Hinterrande, länger als bei *quercinus* und kürzer und mehr in die Länge gezogen als bei *acutangulus*, das Lateralzähnen steht in der Mitte, die Seiten von da zur Basis stärker verengt, aber auch dicht und lang bewimpert, die Hinterwinkel sind ähnlich, nicht ganz rechtwinkelig. Die Flügeldecken sind kürzer, mehr oval, dicht und fein punktiert, die Behaarung mässig reich, die längeren Haare sind hier nicht in deutliche Reihen geordnet. L. 2·2—2·7 mm.

Russisch-Armenien: Araxestal, bei Ordubad.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1921

Band/Volume: [38](#)

Autor(en)/Author(s): Reitter Edmund

Artikel/Article: [Cryptophagus cellaroides n.sp. \(Col. Cryptophag.\). 90](#)