

Hyria bilineata, Assirghur (170); *Tephрина granitalis*, Mhow.; *T. lithina*, Kurrachee; *T. Zebrina*, Mhow. (171); *Nadagara grisea*; *Delocharis* n. g. *Geometrites* (172); *D. herbicolens*, Solun; *Crambus Todarius*, Neilgherries (173); *Depressaria Swinhoei*, Mhow.; *Ypsolophus robustus*, Kurrachee (174).

Moore F. Descriptions of new Genera and Species of Asiatic Lepidoptera Heterocera. (Proc. of the Scientif. Meet. of the Zoolog. Soc of London for the year 1883, pag. 15—30, Pl. V u. VI col.)

Diese, als neu beschriebenen Genera und Species sind folgende: *Histia fraterna*, Calcutta; *Cleosiris fasciata*, Borneo maj., N. India (15); *Aloa marginata*, Nepal (15, Pl. V, Fig. 1); *Baradesa* n. g. Notodontidae (16), *B. lithosioides*, Darjiling (17, Pl. V, Fig. 2); *Lymantria fuliginosa*, Bombay, *Trisuloides catocalina*, Darjiling (17); *Thaumatopoea Cheela*, District Umballa (18, Pl. V, F. 3); *Taragama intensa*, Bengal (18, Pl. V, F. 4); *T. Hyperantherae*, Distr. Calcutta (18, Pl. V, F. 5); *Calpe bicolor*, N. W. India (19); *Arthisma* n. g. Gonopteridae (20), *A. scissuralis*, Singapore (20); *Ruscada Diversalis*, Singapore (21); *Gonitis Trilineata*, Bombay (21, Pl. VI, F. 1); *Thalatta Albiorbis*, Ceylon; *T. Modesta*, Ceylon (22); *Donda Eurychlora*, Cherra Punjee (23, Pl. VI, F. 2); *D. Ornata*, Bombay (23, Pl. VI, F. 3); *Pandesma Similata*, N. W. India; *Ercheia Pannosa*, S. India; *E. Uniformis*, S. India; *Sypna Contellata*, Dharmasala; *S. Rubrifascia*, Darjiling (24); *S. Prunosa*, Darjiling; *S. Fraterna*, Darjiling; *S. Renisigna*, Khasia hills; *Argiva Strigipennis*, Khasia hills (25); *Nyctipao Prunosa*, N. W. Himalaya; *Sericia Calamistrata*, Andaman Isles; *Hypopyra Pallida*, Ceylon (26); *Nazia Duplexa*, Darjiling (26, Pl. VI, F. 4); *Ophiusa Acuta*, Khasia hills (27, Pl. VI, F. 5); *Durdara Fenestrata*, Bombay (27, Pl. VI, F. 6); *Sonagara Bivittata*, Andaman Isles (27, Pl. VI, F. 7); *S. Decussata*, N. E. Himalaya (27, Pl. VI, F. 8); *S. Vialis*, Himalaya (27, Pl. VI, F. 9); *Capnodes Stellata*, Singapore (28); *Acharya Costalis*, Andaman Isles (28, Pl. VI, F. 10); *Byturna* n. g. Hype-nidae (28), Type: *Bacana digramma* Walk., India; *Pasira Biatomea*, Ceylon; *Leucinodes Discisigna*, Darjiling; *Eudorea Lativitta*, Darjiling (29).

F. A. Wachtl.

Notiz.

In der Versammlung der k. k. Zool.-botan. Gesellschaft vom 2. Jänner 1884 legte der Secretär Herr Castos A. Rogenhofer folgende zwei Arbeiten vor: 1. F. Kohl „Die Gattungen der Pompiliden“, 2. E. Reitter „Bestimmungstabelle Nr. X“ (enthaltend einen Nachtrag zur Bestimmungstabelle V, welche die Pselaphiden umfasst). In der ersteren Arbeit werden zwei neue Gattungen: *Sphictostethus* und *Haploneura* aufgestellt; *Priocnemis* Schiödtte weicht der Gatt. *Salix* F.; *Agencia* Schiödtte wird *Pseudagenia* Kohl heissen, da *Agencia* für *Pogonius* Dahlb. zu setzen ist. Ausser einer Charakteristik der Familie werden Bestimmungstabellen der Gattungen gegeben, letztere werden natürlich abgegrenzt und kurz beschrieben, ausserdem wird bei den einzelnen Gattungen die Zahl der bekannten Arten und ihre bisherige Vertheilung auf die einzelnen Regionen angegeben.

J. Mik.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1884

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Notiz 64](#)