download unter www.biologiezentrum.at

Berichtigungen und Zusätze zum „Catalogus Coleopterorum Europae et Caucasi".

Von den Autoren desselben: **Dr. L. v. Heyden, E. Reitter und J. Weise.**

(Schluss.)

Pag. 27. I. *Metabletus exclamationis* Mén. Creta. (*M. fuscomaculatus* Motsch., *virgatus* Reiche, *patruelis* Chaud.), vor *obliquesignatus*, fehlt.

— 27. I. *Lionychus albonotatus* Dej. *v. bimaculatus* Paul. Lu. einschalten.

— 27. III. *Brachynus caspius* Dej. ist gute Art.
— *nitidulus* Muls. et *strepens* Fisch. = *explodens*.

— 30. III. *Hydroporus fulviventris* Costa *S.* fehlt.

— 32. III. *Gyrinus colymbus* Er. et Synonyma = *caspius* Mén. (W.)
— *dorsalis* Gyll. ist als letzte Var. hinter *aeneus* Thoms. aufzuführen und *marinus* Gyll. als Name der Art wiederherzustellen.

— 34. II. *Hydrobius picicrus* Thoms. (n. sp.) = *v. Rottenbergi* Gerh.

— 36. I. *Dryops bicolor* Costa, S. und *sulcipennis* Costa, S. sind am Schlusse nachzutragen.

— 37. I. *Heterocerus pictus* Muls., hinter *nanus*, ist zu streichen.

— 40. III. *Calodera glabrata* Kiesw. = eine *Echidnoglossa* (37. I.) und *Ech. Paulinoi* Skalitzky (n. sp.) ist mit ihr identisch.

— 47. I. Lese *Oligota* statt *Ollgota*.

— 56. III. *Pinophilus erythrostomus* Costa, *S.* nachzutragen.

— 61. I. *Compsochilus Heydeni* Epph. beschrieben in den Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1880, pag. 211 aus Slavon. fehlt hinter *cephalotes*.

— 65. I. Der Name *Amicrops* ist von Montrouzier im Jahre 1858 an eine Hemipteren-Gattung vergeben, weshalb ich für denselben: *Bergrothia* vorschlage.

— 65. III. *Bryaxis Piccioli* Saulc. auch in *Gr.*

— 66. II. *Bythinus levantinus* Schauf. = *convexus* Kiesw., der ebenfalls von Zante stammt.

— 66. II. — *scapularis* Reitt. = ein *Machaerites*, hinter *Eppelsheimi* zu stellen.

— 66. III. — *germanus* Reitt. = *collaris* Baudi.

download unter www.biologiezentrum.at

Pag. 67. I. *Tychus mendax* Kiesw. ist gute Art.

— 67. II. Statt *Philus* Saulcy, ein Name, der bei den Cerambyciden im Jahre 1853 von Saunders eingeführt wurde, ist *Aphiliops* Rttr. zu setzen.

— 70. II. Vor den Sylphiden ist einzuschalten:

Platypsyllidae.

Platypsylla Ritsema.

mit der Art: *castoris* Ritsem. *Ga. m.*

— 71. I. *Bathyscia proserpina*, schreibe *Proserpina.*

— 72. II. *Colon* ist als Masculinum zu brauchen.

— 73. I. *Necrophorus sepulchralis* Heer, welcher fehlt = *nigricornis* Fald.

— 74. III. *Loricaster* ist wegen der vorn abgestutzten Mittelbrust, der Form der Schenkeldecken und der Mittelschenkel von *Clambus* sehr verschiedene Gattung.

— 76. III. *Peltinus* Muls. mit der Art: *velatus* Muls. Eur. m. fehlt und ist vor *Orthoperus* einzuschalten. (Wurde wiederholt.)

— 77. III. *Dapsa acuticollis* Reitt., And. hinter *denticollis* fehlt.

— 78. I. *Mycetina binotata*, nicht Dahl, sondern Costa.

— 79. I. *Cryptophagus lapidarius* Fairm. ist zu streichen. Dafür tritt ein:
— *montanus* Bris. *J. b. Ga.* (*lapidarius* Reitt. non Fairm.)

— 79. I. *Spaniophaenus amplicollis* Bris. = *lapidarius* Fairm.

— 80. III. *Holoparamecus Truquii* ist zu streichen, dafür hat einzutreten: *Beloni* Reitt., Gr.

— 80. III. Zu *Anommatus 12-striatus* kommt als Syn. *pusillus* Schauf. pars.

— 81. I. *Anommatus pusillus* Schauf. ist zu streichen; dafür ist zu setzen: *basalis* Reitt. Ga. G. (*A. pusillus* Reitt. non Schauf., *pusillus* Schauf. pars.)

— 81. I. Die *Metophthalmus*-Arten sind in nachfolgender Weise zu ordnen: 1. *hungaricus* Reitt., *Hu.* 2. *lacteolus* Motsch., *Krim* (Hu. ist zu streichen), 3. *Brenskei* Reitt., *Gr.*, 4. *humeridens*, 5. *niveicollis*, 6. *Ragusae*, 7. *obesus.*

— 82. II. *Corticaria cucujiformis* Reitt. kommt auch in *Gr.* vor.

download unter www.biologiezentrum.at

Pag. 84. I. Der Name *Micruria* ist mehrfach vergeben; ich wende dafür den Namen: *Micrurula* an.

— 87. II. Bei *Aglenus brunneus* ist nachzutragen das Vaterland: *E.*

— 88. III. Bei *Silvanus similis* Er. ist *E.* nachzutragen.

— 89. III. *Trogoderma nigrum* Hrbst. (fehlt) = *glabrum* Herbst.

— 90. II. *Syncalypta arragonica* Reitt. (i. l.) zu streichen.

— 90. II. Die *Curimus*-Arten sind in nachfolgender Reihe anzuordnen: 1. *insignis* (*submaculosus* Fairm.), 2. *tauricus* Reitt., *R. m.*, 3. *interstitialis*, 4. *rudis*, 5. *taygetanus* (gute Art), 6. *parnassius* Reitt., *Gr.*, 7. *petraeus*, 8. *terrifer* Reitt., *Gr.*, 9. *decorus*, 10. *hispidus*, 11. *Erichsoni*, 12. *lariensis*, 13. *Brenskei* Reitt., *Gr.*, 14. *erinaceus*, 15. *terminatus* Reitt., *Gr.*, 16. *montenegrinus*; 17. *caucasicus*.

— 90. II. Die Gattung *Byrrhus* Lin. ist zu streichen; dafür hat einzutreten: *Seminolus* Muls. und als Syn. *Byrrhus* Lin. et auct. — *Cistela* Geoffr. hat für *Cytilus* zu verbleiben.

— 91. III. *Hister smyrneus* Mars. kommt auch in *Gr.* vor.

— 92. II. *Saprinus gangeticus* Mars., Hi. einzufügen hinter *nitidulus*.

— 93. II. *Lucanidae* und *Lucanus* Lin. ist zu streichen, dafür tritt ein: ***Platyceridae*** und *Platycerus* Geoffr. darunter als Syn. *Lucanus* Lin. et auct.

— 94. II. *Onthophagus ponticus* Harold, *Ca.* einzuschalten hinter *verticornis*.

— 97. II. *Geotrupes v. caucasicus* Weise = *caspius* Mén.
— *reflerus*, schreibe *reflexus*.

— 98. II. *Triodonta aquila* kommt auch in Montenegro und Griechenland vor.
— *unguicularis* Er. ist eine grosse, graue, *cinctipennis* Luc. (*pumila* Burm.) eine kleine helle Art mit dunklerem Rande des Körpers.

— 98. II. *Homaloplia ruricola v. atrata* Foucr. Gr., hinter *pruinosa*, fehlt.

— 99. I. *Rhizotrogus spartanus* Brenske (n. sp.) = *nomadicus* Reiche.

— 99. III. Bei *Polyphylla Olivieri* ist das Vaterland *Si.* zu streichen.

download unter www.biologiezentrum.at

Pag. 99. III. *Tanyproctus rufideus*, schreibe *rufidens*.
— 101. III. *Cetonia hieroglyphia*, schreibe *hieroglyphica*.
— 101. III. — *v. cuprea* Gory hinter *v. caucasica* ist zu streichen.
— 102. III. *Poecilonota gloriosa* Muls. *Bosnia*, *Ital.* ist hinter *decipiens* nachzutragen.
— 108. III. *Athous impressifrons* Hmpe: *I.*, schreibe *Cro.*
— 110. II. *Agriotes nitidicollis* Mil. auch in *Gr.*
— 114. III. *Pygidia tibialis* Brull. = *Armidia sulcollis* Brull. Var. (114. II.)
— 119. II. *Haplocnemus rufomarginatus* Perr., auch in *Gr.*
— 121. II. Ueber die *Bruchidae* befindet sich eine Bestimmungstabelle unter der Presse, welche verschiedene Richtigstellungen enthält.
— 122. III. *Anobium* Fabr. ist zu streichen; dafür ist zu setzen: *Byrrhus* Geoffr. und als Syn. *Anobium* Fabr. et auct.
— 124. I. Die *Theca*-Arten sind in nachfolgender Weise zu ordnen: 1. *byrrhoides*, 2. *pilula*, 3. *puncticollis* Reitt., *Gr.*, 4. *pellita*, 5. *elongata*, 6. *remota* Reitt., *Si.*, 7. *curimoides* Reitt., *Gr.*, 8. *andalusiaca*.
— 126. II. Nach Allard sind *Gnathosia Carceli* Sol. (*depressicornis* Fald.) und *hispana* Sol. gute Arten. Nachzutragen sind: *nasuta* Mèn. (*variabilis* Sol., *laevigata* Dej.), *Ca; Chevrolati* All., *Toscana.*; *crenata* Reiche *Ca.* Letztere wurde von Leder gesammelt und von Allard determinirt.
— 128. III. *Blaps mortisaga* L. *v. elongata* Mén. *Ca.* fehlt.
— 128. III. *Blaps tenuicollis* Sol. (aus Syrien) kommt auch im *Ca.* vor (Leder, Allard). Ist nach *orbicollis* zu stellen.
— 129. I. *Blaps songarica* Fisch., Ca. (*intricata* Fisch., *georgica* Fisch., *halophila* Fisch.) hinter *confluens* nachzutragen (Leder, Allard).
— 130. III. *Ocnera philistrina* Reiche Gr. (*gomorrhana* Reiche, *jaffana* Mil. und *graeca* Desbr.) nachzutragen. Die beiden ersten Synonyma können fortbleiben. — *Beckeri* Desbr. = *setosa* Mén.
— 131. III. *Isocerus purpurascens* Hbst., *Hi. Lu.* gute Art.
— 136. I. *Stenomax picipes* Küst., schreibe *picipes* Bon.

download unter www.biologiezentrum.at

Pag. 136. III. Nach Baudi ist die Gattung *Gerandryus* identisch mit *Gonodera*; zu *Gonodera* ist die Art: *aetnensis* Rottbg., *Si.* zu stellen, dagegen ist *Ger. oculatus* Baudi, *Si.* ein *Catomus*, zu stellen nach *sphaericollis*. Wohin *Ger. sardiniensis* All. gehört, bleibt fraglich.

— 136. III. Als Synonyma zu *Apolites* sind zu stellen: *Ceratanisus* Gem. = *Anisocerus* Fald. *Apolites tristis* Fald., *Ca.* ist nachzutragen.

— 137. III. *Podonta pulcherrima* Fald. ist zu streichen. Sie ist eine unzweifelhafte, von Leder gesammelte und durch mich verbreitete *Gonodera*.

— 137. III. *Podonta lugubris* Küst. hinter *elongata* ist zu streichen.

— 139. I. *Conopalpus thoracicus* Baudi. = *flavicollis* Gyll. Letztere ist Var. und nicht nur das ♀ von *testaceus*.

— 140. I. *Tomoderus serbicus* ist zu streichen.

— 142. II. *Anaspis variegata* Power, *Br.* hinter *maculata* einzufügen, und

— *Truquii* Baudi., *J.* hinter *varians*.

— 144. II. *Oenas fuscicornis* Abeille, *Hi. Lu.*

— 144. III. Vor *Zonitis bipunctata* Rag. ist v.? zu setzen.

— 145. I. *Xanthochroa italica* Chevr. ist ein *Nacerdes*.

— 145. II. Vor *Nacerdes* i. sp. hat *Oedichira* Mot. die Priorität. *Xanthochroina Auberti*, schreibe *Auberti* Abeille.

— 145. II. *Opsimea quadrinervosa* Reiche hat vor *ventralis* Mil. Priorität, da diese wegen *Oedemera quadrinervosa* Latr. nicht collidirt.

— 145. III. Schreibe *Oncomera purpureo-coerulea*.

— 145. III. *Oedemera crassipes* Abeille, Gr. hinter *virescens* nachzutragen.

— 146. II. *Otiorrhynchus* Germ. soll mit *Brachyrrhinus* Latr. identisch sein.

— 148. II. *v. supdentatus*, schreibe *subdentatus*.

— 149. II. *Ot. cribellarius* Stierl. (n. sp.) = *horridus* Stierl.

— 152. I. *Phyllobius celadonius* Brulle, Gr. hinter *fulvipilis*, fehlt.

— *maculifer* = *montanus*.

— 152. III. *Polydrosus variegatus* Desbr. = *subglaber* Desbr. Var. (153. I.)

download unter www.biologiezentrum.at

Pag. 153. III. *Platytarsus* Schönh. (1840) soll mit *Brachysomus* Steph. (1831) identisch sein.

— 156. III. *Dactylorrhinus* Tourn. soll mit dem älteren Namen *Philopedon* Steph. identisch sein.

— 157. II. *Thylacites fullo* Er., *Hi.* fehlt.

— 159. I. Nach Faust gehört die Gattung *Alophus* zu den *Tropiphorini* und *Procas* (160. I.) zu den *Erirrhini.*

— 162. II. *Lixus cylindricus* Hrbst. = *bardanae* Fbr.

— 164. II. Die Gattung *Lepyrus* gehört nach Faust zu den *Cleonini.*

— 164. II. *Pissodes strobili* Redt. = *validirostris* Gyll. pars., et = *notatus* pars.

— 165. II. *Sharpia rubida* kommt auch in *Gr.* vor.

— 166. II. *Arthrostenus* gehört nach Faust in die Nähe von *Bagous.*

— 167. III. *Bradybatus carbonarius*, nicht *C.*, sondern *Ca.*

— 170. II. Nach Brisout ist *Nanophyes setulosus* Tourn. gute Art.

— 180. II. et III. Die *Mylabris*-Arten dieser Spalten sind ebenfalls im Femininum zu halten.

— 182. II. *Tomicus trepanatus* Nördl. = *bidentatus* Hrbst.

— *rectangulus* Eichh., schreibe *rectangulus* Ferrari.

— *Mannsfeldi*, nach Wachtl gute Art.

— *chalcographus* Ratzeb. = *chalcographus* Lin. Die Untersuchung österreichischen Materiales hat ergeben, dass die Annahme Lindemann's im Bull. Mosc. 1875. pag. 133 sich nicht bestätigt.

— *xylographus* Sahlb. = *chalcographus* L. var.

— 184. II. *Vadonia unipunctata* F., schreibe *impunctata* F.,

— 185. II. *Molorchus Schmidti* Ganglb. Galizien, neu, = *minimus* var.

— 186. III. *Clytus pantherinus* Saven. hierzu kommt *C. Moei* Thoms. als Syn.

— 187. III. *Purpuricenus Kähleri*, setze *Köhleri.*

— 188. III. *Dorcadion Brenskei* Ganglb. = *minutum* var.

— 196. I. *Pachybrachys sinuatus* Muls. soll nach Rey gute Art sein.

— 196. II. *Stylosomus flavus* Mars. *Gr. R. m.* fehlt hinter *tamaricis.*

— *rugithorax* Ab. und *depilis* Ab. sollen nach Rey gute Arten sein.

download unter www.biologiezentrum.at

Pag. 196. III. *Pachnephorus laevicollis* Fairm., *Si*, hinter *Brucki* aufzuführen.

— 197. III. *Cyrtonus* ist nach Fairmaire's neuesten Arbeiten so aufzuführen:

major Fairm. *Hi. m. or.*
plumbeus Fairm. *Hi. m. or.*
Fairmairei Rosh. *And.*
gratiosus Rosh. *P. or.*
Pazii Fairm. *Hi. m. or.*
conformis Fairm. *And.*
contractus Fairm. *And.*
Ehlersi Fairm. *Hi. m. or.*
dorsolineatus Fairm. *And.*
rotundatus H. Schff. *Ga. m. Hi. or.*
punctipennis Fairm. *P. or.*
coruscans Vuill. *Lu.*
elegans Germ. *Lu.*
denticulatus Chevr. *? Hi.*
montanus Fairm. *Hi.*
thoracicus Fairm. *And.*
curtus Fairm. *Ast.*
brevis Fairm. *Hi. b. or.*
puncticeps Fairm. *Hi. m. or.*
curtulus Fairm. *Lu.*
strictus Fairm. *Hi. md.*
cupreovirens Perez *Hi.*
sycophanta Fairm. *Hi. m. or.*
scutellatus Fairm. *Lu.*
gibbicollis Fairm. *? Hi. m.*
Arcasi Fairm. *Hi. m.*
Martorelli Fairm. *Hi. md.*
Dufouri Duf. *Ga. m. Hi. Lu.*
Heydeni Fairm. *Ast.*
ruficornis Fairm. *Hi. md.*
eumolpus Fairm. *Hi.*
angusticollis Fairm. *And.*
minor Fairm. *And.*
punctulatus Fairm. *Hi.*
oomorphus Fairm. *Hi. Ast.*
cylindricus Mars. *Hi. m.*
versicolor Mars. *Lu.*
canalisternus Mars. *Lu.*

Pag. 199. I. *Chrysomela magnifica* Rttr. bei *angelica*, ist, weil nicht beschrieben, zu streichen.

— 202. III. *Orestia sierranae*, schreibe *sierrana*.

— 203. I. *Mantura cylindrica* Mill. *D.* fehlt.

— 203. I. *Chaetocnema Coquereli* All. *T. Gr.*, von Merkl und Krüper gefangen.

— 205. III. *Dibolia erythrogaster* All. kommt in Andalusien vor.

— 206. III. *Cassida suadae* Halid. = *deflexicollis* Bohem.

— 209. III. *Scymnus zig-zag* Costa *S.* fehlt.

— 210. Bei den Addendis ist auf vorletzter Zeile statt *Icosium*, *Isoserus* zu lesen.

— 221. Im Index ist bei *Lymnaeum* statt 23 = 9,

— 222. bei *Oligomerus* statt 108 = 123 und

— 227. bei *Trachodes* statt 165 = 164 zu lesen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Wiener Entomologische Zeitung

Jahr/Year: 1884

Band/Volume: 3

Autor(en)/Author(s): Heyden Lucas [Lukas] Friedrich Julius Dominicus von, Reitter Edmund, Weise Julius

Artikel/Article: Berichtigungen und Zusätze zum "Catalogus Coleopterorum Europae et Caucasi". 207-213