

## Übersicht der Gattungen der Homopteren-Tribus Orgeriini.

Von Victor Kusnezov.

- 1 (2). Scheitel, Pronotum und Schildchen ohne Mittelkiel. Scheitel gewölbt, fast fünfeckig, die Ecken abgerundet. Schenkel nicht blattartig erweitert, Hinterschienen mit 4—5 Dornen. (Typus: *fedtschenkoi* Osh.) **Haumavarga** Osh.
- 2 (1). Pronotum mit einem Mittelkiel.
- 3 (8). Die Seitenkiele und der Mittelkiel der Stirn vereinigen sich unter dem Stirnapex. Scheitel mit einem Mittelkiel.
- 4 (7). Scheitel kürzer als der Kopf, Stirnapex von oben sichtbar.
- 5 (6). Seitenränder des Scheitels kielförmig, nicht blattartig erweitert. Stirn oben gewölbt. Schenkel und Schienen der Vorder- und Mittelbeine blattartig erweitert; Hinterschienen mit 4—6 Dornen. (Typus: *orbicularis* Osh.) **2. Repetekia** Osh.
- 6 (5). Seitenränder des Scheitels blattartig erweitert und erhoben. Stirn an der Basis verschmälert. Schenkel und Schienen der Vorder- und Mittelbeine verschmälert, nicht blattartig erweitert, mit Längsfurchen versehen. Hinterschienen mit 3—5 Dornen. (Typus: *auritus* Osh.) **3. Ototettix** Osh.
- 7 (4). Scheitel länger als der Kopf, Stirnapex von oben nicht sichtbar. Vorder- und Mittelschenkel nicht blattartig erweitert. Hinterschienen mit 2—4 Dornen. (Typus: *recurviceps* Osh.) **4. Kumlika** Osh.
- 8 (3). Die Seitenkiele und der Mittelkiel der Stirn vereinigen sich am Stirnapex.
- 9 (12). Seitenkiele des Scheitels blattförmig erweitert.
- 10 (11). Seitenkiele des Scheitels stark blattförmig erweitert, und vertikal gestellt; dieselben beinahe in der Mitte der Länge recht- oder stumpfeckig erweitert, wodurch die Seitenkiele hier ihre größte Breite erreichen. Scheitel tief furchenartig eingedrückt. Der Mittelkiel des Scheitels fehlt gänzlich oder ist nur auf dem Vorderteile schwach ausgeprägt. Schenkel und Schienen der Vorder- und Mittelbeine nicht blattartig erweitert. In der Mitte der Schenkel eine flache Rippe, mit zwei flachen Furchen jederseits. Hinterschienen mit 4—5 Dornen. (Typus: *tiorata* Osh.) **5. Tigrachauda** Osh.
- 11 (10). Seitenkiele des Scheitels im ersten Drittel von der Basis gerechnet blattartig, ohrförmig erweitert und vertical erho-

- ben, nach dem Apex zu nicht erweitert. Mittelscheitelkiel gut ausgeprägt, von der Basis bis zur Mitte scharf, niedrig und schmal, im Apexteile stark erweitert und kammförmig abgerundet. Schenkel und Schienen der Vorder- und Mittelbeine nicht blattartig erweitert. Hinterschienen mit 1, 2 od. 3 Dornen. (Typus: *ototettigoides* Osh.) 8. **Otorgerius** gen. nov.
- 12 (9). Seitenkiele des Scheitels nicht blattartig erweitert. Scheiteldiscus mehr oder weniger flach.
- 13(24). Scheitel mit einem deutl. Mittelkiel, welcher niemals gespalten ist.
- 14 (21). Augen durch einen kielartigen Nackenrand vom Pronotum abgetrennt.
- 15 (18). Kein Querkiel auf den Wangen, zwischen den Augen und der Fühlerbasis. Wangen an der Fühlerbasis flach. Mittel- und Seitenstirnkiele in einer Fläche liegend.
- 16 (17). Kopf stark vorgezogen. Scheitel eineinhalb oder zwei-mal länger als das Pronotum und Schildchen zusammengenommen. Adern der Homelytren sehr schwach runzelig ausgeprägt. (Typus: *megacephalus* Osh.) 6. **Sphenocratus** Horv.
- 17 (16). Kopf kurz. Der Scheitel beinahe so lang wie das Pronotum und das Schildchen zusammen. Aderung der Homelytren mit deutlicherer Runzelung. (Typus: *longiceps* Osh.) 7. **Sphenocratoides** gen. nov.
- 18 (15). Ein Querkiel auf den Wangen, zwischen den Augen und der Fühlerbasis. Fühler in flachen Fühlergrübchen sitzend. Stirnbasis stark quergewölbt, weshalb die Seitenstirn- und Mittelkiele in verschiedenen Flächen liegen.
- 19 (20). Schenkel und Schienen nicht blattartig erweitert. (Typus: *dimorphus* Osh.) 9. **Nymphorgerius** Osh.
- 20 (19). Schenkel und Schienen der Vorder- und Mittelbeine blattartig erweitert. (Typus: *stali* [Osh.]) 10. **Anorgeriopus** gen. nov.
- 21 (14). Augen durch keinen kielartigen Nackenrand vom Pronotum abgetrennt und das Pronotum berührend. Kein Querkiel auf den Wangen, zwischen den Augen und der Fühlerbasis. Mittel- und Seitenstirnkiele in einer Fläche liegend.
- 22 (23). Schenkel und Schienen der Vorder- und Mittelbeine blattartig erweitert, die größte Breite des Schenkels am Apex. (Typus: *jakobsoni* [Osh.]) 11. **Phyllorgerius** V. Kusnez.
- 23 (22). Schenkel und Schienen der Vorder- und Mittelbeine nicht blattartig erweitert. (Typus: *rhyparus* Stal.) 13. **Orgerius** Stal.
- 24 (13). Scheitel mit zwei Mittelkielen, die durch eine schmale Längsfurche von einander getrennt sind. Scheitel in der Mitte fast halb so lang als zwischen den Augen breit. (Typus: *scytha* [Osh.]) 12. **Schizorgerius** gen. nov.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1930

Band/Volume: [47](#)

Autor(en)/Author(s): Kusnezow Victor

Artikel/Article: [Übersicht der Gattungen der Homopteren-Tribus Orgeriini. 89-90](#)