

Beiträge zur Kenntniss der Microlepidopteren-Fauna der Erzherzogthümer Oesterreich ob und unter der Enns und Salzburgs.

Von Josef Mann in Wien.

(7. Fortsetzung.)

Argillella Z., HS. — 5, auf dem Bisamberg an grasreichen Lehnen, sehr selten.

Schoenherrella Zett. — 7, Schneeberg auf der Heuplacke um *Pinus Mughus* gefangen.

Capitella Cl. — 6, 7, Schneeberger Alpen, Alpeleck, Krumbachgraben, Lackerboden.

Oehlmanniella Tr. — 7, Praterauen auf *Urtica*, *Parietaria* und *Rubus fruticosus*.

Rupella Schiff. und ab. Aurata Z. — 7, auf den Schneeberger Alpen in Holzschlägen.

Nemophora Hb.

Swammerdammella L. — 5, überall in jungen Gebüschchen. Raupe anfangs die Blätter von *Alnus*, *Acer* und *Fagus* minirend, dann im Sacke unter abgefallenem Laub.

Panzerella Hb. — 5, 6, in den Remisen bei Tivoli und bei Mauer in jungen Gebüschchen.

Schwarzziella Z. — 5, 6, in jungen Buchenwäldern, Dornbach beim Hölzländerdörfel, Mauer, Anninger. Raupe im Sacke an Baumstämmen nahe der Erde.

Pitulella Hb. 409. HS. — 6, Mauer, 7, Schneeberg auf dem Gahns, Alpeleck, Kuhschneeberg auf *Abies excelsa* und *Abies pectinata*.

Pilella F. — 5, in der Wiener Gegend in jungen Gebüschchen, 7, auf den Alpen, nicht selten.

Metaxella Hb. — 5, 6, im Prater in Erlengebüsch, auf *Parietaria* und anderen Pflanzen; Mauer an Waldrändern.

Adelidae.

Adela Latr.

Fibulella F. — 5, überall in der Wiener Gegend auf pflanzenreichen Wiesen und Berglehnen.

Leucocerella Sc. — 5, Prater, Mauer bis Baden auf Hutweiden und Berglehnen auf *Veronica* blüthen. Raupe auf *Veronica officinalis* in unreifen Samenkapseln.

Ruffrontella Tr. — 4, 5, in lichten Gebüschchen im Prater, bei Mauer und Kaltenleutgeben.

Ruffimitrella Sc., und **var. Purpuratella Z.** — 4, 5, in Remisen, an Bachrändern und in Auen.

Violella Tr. — 5, in den Remisen bei Tivoli, am Laaerberg, im Prater und bei Mödling.

Mazzoletta Hb. — 6—8, Prater, Klosterneuburg, am Eichkogel und Bisamberg. Nach Freund Hornig bei Sonnenschein schwärmend um Blüten von *Nasturtium armoracoides*.

Albicinctella Mn. z. b. V. 1852. — 5, am Hochkohl in Niederösterreich, von meinem Freunde Schleicher gesammelt; grosse Seltenheit.

Ochsenheimerella Hb. — 5, 6, im Mauerer Gemeindewald um *Abies pectinata* schwärmend, auch auf den Alpen, selten. Sack im Mauererwalde unter dürrer Laub gefunden.

Congruella F. R. — 6, auf dem Sonnwendstein um junge *Abies excelsa* und um *Festuca ovina*, sehr selten. Raupe im Sacke unter feuchtem Moos und *Festuca ovina*.

Degeerella L. — 5, 6, überall in Oesterreich in grasreichen Gebüschchen.

Raupe im Sack an *Anemone nemorosa* und anderen niederen Pflanzen.

Croesella Sc. — 5, 6, an Waldrändern um Gesträuch schwärmend. Raupe unter abgefallenem Laube.

Associatella Z. Is. 1839. F. R. 68. 1. — 6, im Mauererwalde um *Abies pectinata* schwärmend. Raupe im Sacke unter abgefallenen Blättern von *Quercus* und *Abies pectinata*.

Viridella Sc. — 4, 5, überall in Oesterreich um junge Gebüsche schwärmend. Raupe unter abgefallenem Laub von *Acer* und *Quercus*.

Caprella Thib. — 4, 5, um Weidengebüsche, selten. Sack an *Salix*.

Nemotois Hb.

Metallicus Pod. — 6, 7, überall um Wien an Bergwiesen auf *Scabiosa*. Raupe in den Blüten der *Scabiosa arvensis*.

var. **Aerosellus** Z. — 7, 8, im Höllenthal, bei Gutenstein, am Schneeberg im Saugraben und am Alpeleck.

Pfeifferellus Hb. — 6, auf dem Eichkogel, Rodaun auf Hecken und Gesträuch, um *Scabiosa*.

Raddaëllus Hb. — 7, 8, bei Neusteinhof, Liesing, bei Rodaun, am Bache auf blühendem *Carduus*. Raupe im Sack an den unteren Blättern von *Dipsacus vulgaris*.

Cupriacellus Hb. — 7, 8, an Bächen, wo *Carduus* vorkommt, auf den Blüten (♂ noch unbekannt). Raupe im Sack gesellschaftlich mit *Raddaëllus*.

Fasciellus F. — 7, um Schlehenhecken, wo viel *Ballota* wächst. Raupe an *Ballota nigra*, nahe der Wurzel.

Lenellus Z. — 7, Schneeberg im Saugraben und Heuplacke, Hochschwab.

Viollus Z. — 7, Höllenthal, Vaitund Gutensteiner Thal an Berglehnen auf blühender *Scabiosa*.

Minimellus Z. — 7, 8, Mauer bis Baden auf Berglehnen, auf Blüten von *Scabiosa ochroleuca*.

Barbatellus Z. — 7, einzeln im Helenenthal und am Bisamberg, auf Berglehnen.

Dumeriliellus Dup. — 8, in den Remisen bei Tivoli, selten.

Ochsenheimeridae.

Ochsenheimeria Hb.

Taurella Schiff. — 6, in der Hetzendorfer Allee an den Stämmen der Alleebäume in der Erde. Raupe in Stengeln von *Gramineen*.

Vacculella F. R. — 6, Mauer, einzeln unter Laub gefunden.

Teichobidae.

Teichobia Hs.

Verhuelleta Stt. — 6, Liechtenstein an Felsen beim schwarzen Thurme.

Acrolepididae.

Acrolepia Curt.

Cariosella Tr. — 6, Mauer, Sonnwendstein, 7, Hohe Wand um *Salix*-Gebüsche.

Arnicella Heyd. — 6, Schneeberg, Gahns auf der Bodenwiese.

Assectella Z. — 6, Gutenstein, Weidling-am-Bach in jungen *Betula*-Gebüschchen, selten.

Pygmaeana Hw. — 6, im Prater in *Alnus*-Gebüschchen, selten.

Perlepidella Stt. — 5, 6, Prater am Schüttelzaun. Raupe in Blättern von *Conyza squarrosa*.

Granitella Tr. — 6, in Gärten und auf Berglehnen, wo *Inula* vorkommt.

Roeslerstammia Z.

Erlebnella F. — 5, Mauer, Kaltentgeben, Brühl, an Waldrändern um Gebüsch, selten. Raupe auf jungen Linden und anderen Laubhölzern im Gespinnst.

Pronubella Schiff. — 5, einigemale bei Mauer auf der Himmelswiese auf Sträuchern gefangen.

Hyponomeutidae.**Scythropia Hb.**

Crataegella L. — 7, auf Hecken von *Prunus spinosa* in Gespinnsten.

Hyponomeuta Z.

Vigintipunctatus Retz. — 7, in Perchtoldsdorf auf dem Kalvarienberge einmal in Menge gefunden. Raupen auf *Sedum* in Gespinnsten.

Plumbellus Schiff. — 7, überall in der Wiener Gegend auf *Evonymus*-Sträuchern. Raupe auf *Evonymus europaeus*.

Irrorellus Hb. — 7, im Prater an Zäunen. Raupe auf *Evonymus europaeus*.

Padellus L. — 7, um Schlehen und Pflaumenbäume überall in Oesterreich. Raupe in Gespinnsten auf *Prunus spinosa*.

Rorellus Hb. — 7, auf Weiden im Prater. Raupe in Gespinnsten auf *Salix*.

Malinellus Z. — 6, auf Aepfelbäumen häufig. Raupe auf *Pyrus Malus* schädlich.

Cagnagellus Hb. — 6, 7, überall in der Wiener Gegend auf *Evonymus*-Sträuchern. Raupe sehr häufig auf *Evonymus europaeus* in Gespinnsten.

Evonymellus L. — 6, 7, überall in der Wiener Gegend, häufig. Raupe auf *Prunus Padus* in Gespinnsten.

Swammerdamia Hb.

Combinella Hb., Btr. — 4, in den Remisen auf dem Laaerberg und bei Tivoli bei blätterlosen *Rosa*-Sträuchern.

Compunctella HS. — 7, auf den Schneeberger Alpen, Alpeleck, Sonnenwendstein auf *Rubus Idaeus*.

Griseocapitella Stt. (Caesiella Hb. 172.) — 5, 7, in Birkengebüschen: Weidling-am-Bach, Dornbach und Mauer. Raupe minirt auf *Betula alba*.

Caesiella Hb. — 5, 6, Rodaun und Mödling auf Weissdornhecken. Raupe auf *Crataegus*.

Pyrella Vill. — 5, 6, in der Wiener Gegend in Gärten und Baumpflanzungen. Raupe meist auf *Pyrus Malus* und *Prunus avium*.

Conspersella Tgstr. — 7, auf dem Lackerboden am Schneeberge, sehr selten. Raupe an *Empetrum nigrum*.

Alpicella HS. 359. — 7, Schneeberg, im Sangraben und Alpeleck. Raupe an *Prunus spinosa*?

Prays Hb.

Curtisellus Don. — 7, Höllenthal und Semmering, Atilitzgräben auf Haselsträuchern, selten. Raupe in den Trieben und zwischen den jungen Blättern von *Fraxinus*.

var. Rustica Hw. — 6, im Prater an Zäunen, selten. Raupe wie vorige, aber auch auf *Acer*.

Atemelia HS.

Torquatella Z. — 5, im Prater auf Weissdornbäumen und Sträuchern.

Zelleria Stt.

Saxifragae Stt. — 7, auf den Schneeberger Alpen, Sangraben, Heuplacke, selbst beim Kaiserstein.

Argyresthia Hb.

Ephippella F. — 5—8, auf Weissdorn und anderem Gesträuch, nicht selten. Raupe in den Knospen von *Crataegus*, *Prunus avium* etc.

Nitidella F. — 5—8, auf *Acer*, *Ulmus* und *Crataegus* im Prater und auf Gebirgen. Raupe in Knospen von *Crataegus*.

var. Ossea Hw. — 6, Prater, Mauer, auf *Crataegus* und *Prunus avium*, selten.

Semitestacella Curt. — 7, 8, in *Fagus*-Gebüsch, Dornbach, Eichkogel, Anninger.

Albistria Hw. — 5, 6, in der Wiener Gegend in Gärten auf Pflaumenbäumen und Schlehen. Raupe auf *Prunus spinosa* und *Pr. domestica*.

Spiniella Z. — 6, 7, Schneeberger Alpen, Alpeleck um *Sorbus*. Raupe auf *Sorbus Aucuparia*.

Conjugella Z. — 6, Schneeberger Alpen, Gahns, Lackerboden. Raupe auf *Sorbus* und *Rubus Idaeus*.

Semifusca Hw. — 7, Mauer auf der Himmelswiese, sehr selten.

Mendica Hw. — 5, 6, überall auf Schlehen gemein. Raupe auf *Prunus spinosa*.

Pulchella Z. — 6, Mauer um *Pinus* und *Abies pectinata*, sehr selten.

Glaucinella Z. — 6, Mauer auf jungen *Abies pectinata*, sehr selten.

Fundella F. R. — 5, 6, Mauer, Gemeinewald auf *Abies pectinata*, nicht selten. Raupe auf *Abies excelsa* (nach Frey).

Retinella Z. — 6, bei Kalksburg auf *Salix*. 1883 eine Partie im Prater auf *Ligustrum* gefangen, selten.

Abdominalis Z. — 6, Bisamberg in *Juniperus*-Sträuchern.

Dilectella Z. — 6, in den Alexandrowitsch'schen Anlagen bei Baden, sehr selten. Raupe in den Knospen von *Juniperus communis*.

Andereggiella Dup. — 7, von Freund Schleicher in Gresten auf den Alpen gefangen.

Cornella F. — 6, Brigittenau, Mauer, Sonnwendstein auf wilden Aepfelbäumen. Raupe auf *Pyrus Malus*, in Blattknospen, besonders in Obstgärten.

Sorbiella Tr. — 6, Perchtoldsdorf, Flesselberg, Gahns, Brandstattwiese, auf *Sorbus Aucuparia*.

Pygmaeella Hb. — 7, Schneeberger Alpen, Brandstattwiese, Alpensteig auf *Salix*.

Goedartella L. — 5, 6, an Erlen im Prater, Hütteldorf. Raupe im Baste von *Alnus* und *Betula*.

Brockeella Hb. — 6, Mauer und Weidling-am-Bach in *Betula*-Gebüsch.

Laevigatella HS. — 7, auf dem Alpeleck einzeln. Raupe auf *Larix europaea*.

Amiantella Z. — 6, Mauer und auf dem Gahns, auf *Abies excelsa* und *Abies pectinata*.

Arceuthina Z. — 5, 6, Bisamberg, Baden, auf *Juniperus*.

Illuminatella Z. — 5, 6, auf *Abies pectinata* und *Abies excelsa*, überall vorkommend.

Certella Z. — 5, 6, auf *Larix europaea* und *Abies pectinata*, Mauer und Weidling-am-Bach, selten.

Aurulentella Stt. — 6, auf dem Bisamberg und bei Baden auf *Juniperus communis*.

Cedestis Z.

Gysselella Dup. — 6, Mauer, Mödling auf *Pinus*.

Farinatella Dup. — 6, Mauer, Liechtenstein, Gahns, Hohewand auf *Pinus*. (In Bozen häufig.)

Ocnerostoma Z.

Piniariella Z. ♂ (*Argentella Z.* ♀) 5, 6, 8, Mauer, Liechtenstein, auf *Pinus*.

Plutellidae.

Eidophasia Stph.

Messingiella F. R. 68, 3. — 6, Rodanner Gaisberg, Abends auf Sträuchern, sehr selten; auch bei Tulln.

Plutella Schr.

Hufnageli Z. — 5, 6, im Prater auf Wiesen. Raupe hat Herr v. Hornig auf den untersten Blättern von *Arabis hirsuta* gefunden, wahrscheinlich polyphag.

Porrectella L. — 5, 6, in Gärten in der Wiener Gegend. Raupe in zusammengezogenen Blättern von *Hesperis matronalis*.

Geniatella Z. — 7, Schneeberg, im Sangraben zwischen *Pinus Mughus*, selten.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Mann Josef Johann

Artikel/Article: [Beiträge zur Kenntniss der Microlepidopteren-Fauna der Erzherzogtümer Oesterreich ob und unter der Enns und Salzburgs. 71-74](#)