

Beiträge zu einem Verzeichnisse der Dipteren Böhmens.

Von Ferdinand Kowarz.

V.*)

Eine weitere Bereicherung erfuhr mein Verzeichniss durch die Dipteren, welche mir Frau Anna Zugmayer und deren Bruder Herr Franz Wolf in Waldegg aus der Ascher, Egerer und Franzensbader Gegend gefälligst zukommen liessen, wofür ich gebührend danke.

Syrphidae.**Baccha F.***elongata* F. 5.—8. A E M Pl.*obscuripennis* Mg. 5.—8. A F M Pr.**Sphegina Mg.***clunipes* Fll. 5.—8. A E M.*Zetterstedti* Schin. 5. Ch.**Ascia Mg.***podagrica* F. (= *lanceolata* Mg.)

4.—9, überall.

floralis Mg. 5. M.*dispar* Mg. (= *quadripunctata* Mg.) 5.—7. A Ch.**Xanthogramma Schin.***citrofasciatum* Dg. 5. 6. A Ch E F.*ornatum* Mg. 7. Pr.**Melithreptus Lw.***nitidicollis* Lh. 6.—8. Ch F.*scriptus* L. (= *dispar* Lw. = *nigricoxus* Ztt. = *strigatus* Stg.) 4.—9, überall.*menthastri* L. (= *pictus* Mg. = *taeniatus* Mg. = *dubius* Ztt.)

5.—9, überall.

Pelecocera Mg.*scaevoides* Fll. 5.—8. A E.**Didea Mcq.***alneti* Fll. 5.—8. A Ch E M.*fasciata* Mcq. 6.—8. A C Ch E M.*intermedia* Lw. 5.—8. A Ch F.**Catabomba O. S.¹⁾***selenitica* Mg. 6.—8. A Ch M.*pyrastri* L. 7.—9, überall.**Syrphus F.***glauceus* L. 7.—9, überall.*laternarius* O. F. Müller. Nach Schiner.²⁾*albostrigatus* Fll. (= *confusus* Egg.)³⁾ 5.—8. A C Ch M Pl.*tricinctus* Fll. 5.—9. A Ch E F M Pl.*annulipes* Ztt. 5.—9. A E M Pl.*topiarius* Mg. 4.—9. A Ch E F M.*venustus* Mg. (= *hilaris* Ztt.) 4.—6. A C Ch E F Pr.*lunulatus* Mg. 5.—8. A Ch E F M.*macularis* Ztt. 5. A.*lasiophthalmus* Ztt. 3. 4. A.*bifasciatus* F. 5.—10. A Ch E F M Pr.*balteatus* Dg. 7.—9, überall.*euchromus* n. sp. 5. A.*lineola* Ztt. 5.—7. A Ch E F M.*vittiger* Ztt. 4.—8. A Ch E G M.*grossulariae* Mg. 5.—8. A Ch E F Pl.

*) Nr. IV siehe diese Zeitung, Jahrg. III. 1884, pag. 45 u. 107. — Unter den abgekürzten Fundortsnamen findet sich in diesem Verzeichnisse zum ersten Male El, d. h. Bad Elster (conf. diese Zeitung II. pag. 109). — ¹⁾ Osten-Sacken: „Western Diptera“ 1877. 326. — ²⁾ Schiner: Verh. d. zool. bot. Ges. Wien. 1857. 59. — ³⁾ Verrall: Ent. monthly mag. 1873. 251.

ribesii L. (= *vitripennis* Mg.) 4.
— 10, überall.

nitidicollis Mg. 5.—8. A E F M.

melanostomus Ztt. 5. A.

ochrostomus Ztt. 6. M.

cinctus Fll. 5.—7. A Ch F.

cinctellus Ztt. 4.—10. A Ch E M
Pl Pr.

auricollis Mg. 6. Pr.

guttatus Fll. 6 F.

curvipes Boh. 5. F.

triangulifer Ztt. 5. 6. A Ch F.

maculicornis Ztt. 3.—5. A.

amoenus Lw.⁴⁾ 7.—9. A F.

umbellatarum F. 6.—9. A Ch E F
M Pl Pr.

arcuatus Fll. 4.—7. A Ch E M.

sexmaculatus Ztt. 5. A E.

corollae F. 5.—10. überall.

luniger Mg. 4.—9. A Ch E Pl.

Melanostoma Schin.

hyalinatum Fll. 7.—9. Ch E F Pl Pr.

quadrinaculatum Verr.⁵⁾ 3—5. A.

dubium Ztt. 5. 6. A M.

barbifrons Fll. (= *nitidulum* Ztt.

♀. = *latifrons* Schml.

♀.)⁶⁾ 3.—5. A E.

gracile Mg. 6. M Pr.

ambiguum Fll. (= *concolor*
WLK.) 5. 6. Ch F Pr.

mellinum L. 5.—9, überall.

cingulatum Egg. 5. 6. A E M.

Platyichirus St. Farg. et Serv.

manicatus Mg. 5.—9. A Ch E M.

tarsalis Schml.⁶⁾ (= *ciliger* Lw.)

5, böhm.-mähr. Grenze.

peltatus Mg. (= *cristatus* Schml.⁶⁾
5.—9, überall.

scutatus Mg. 5.—8. A Ch E F.

albimanus F. 5.—9, überall.

discimanus Lw.⁷⁾ 4. 5. A E F.

scambus Ztt. 5.—8. A Ch F.

fulviventrtris Mcq. 5.—8. A Ch F.

clypeatus Mg. 5.—8. überall.

Pyrophæna Schin.

ocymi F. 5.—8. Ch E F Pr.

rosarum F. 5. Ch.

Chilosia Mg.

oestracea L. 8. 9. A Ch E F.

variabilis Pz. 5.—7, überall.

barbata Lw. 6. 7. M.

frontalis Lw. 5. F.

intonsa Lw. 5.—8. Ch F.

lasiopa n. sp. 5. 6. A M Pr.

canicularis Pz. 6. 7. Ch M.

grossa Fll. 4. 5. A F.

flavicornis F. 4. 5. A Ch.

impressa Lw. 8. F.

albitarsis Mg. 5.—7. überall.

morio Ztt. 4. 5. A Ch.

gilvipes Ztt. 5, böhmisch-mähr.
Grenze.

praecox Ztt. 4. 5. A Ch F G Pr.

fasciata Egg. Schin. 5. C E F.

olivacea Ztt. 5. E.

rostrata Ztt. (= *cynocephala* Lw.)
9. Pr.

chloris Mg. (*dimidiata* Ztt. =
rustibia Egg.⁸⁾ 4.—6, über-
all.

vernalis Fll. 4.—8, überall.

pubera Ztt. 4. 5. A.

antiqua Mg. 5. El E F Pr.

⁴⁾ Loew: Isis. 1840. 575. — ⁵⁾ Verrall: Ent. monthly mag. 1873. 281.

— ⁶⁾ Schummel: Arb. u. Veränd. d. schles. Ges. 1836. 84. 85. — ⁷⁾ Loew:
„Besch. eur. Dipt.“ II. 1871. 227. — ⁸⁾ Egger: Verh. d. zool. bot. Ges.
Wien. 1860. 349.

coerulescens Mg. (= *signata* Egg.)

5.—8. E.

pulchripes Lw. 4.—8. A E M.

scutellata Fll. 6.—9. A E I E P I Pr.

plumulifera Lw. 8. 9. A E.

Leucozona Schin.

lucorum L. 5.—8. A Ch E F M.

Eriozona Schin.

syrrhoides Fll. 6.—9. A E F M.

Brachyopa Mg.

conica Pz. 6. Ch.

dorsata Ztt. 5. 6. F.

Rhingia Scop.

rostrata L. 5.—9. Ch E F G M.

Volucella Geoffr.

bombylans L. 5.—7, überall.

pellucens L. 6.—8, überall.

zonaria Pd. 8. 9. E P I Pr.

inanis L. 7. 8. A Ch E G P I.

Sericomyia Mg.

borealis Fll. 5.—9. A Ch E M G.

lappona L. 5.—8. A C Ch M.

Arctophila Schin.

bombiformis Fll. 6.—9. Ch F M P I.

Eristalis Ltr.

sepulcralis L. 4.—8. A Ch E F Pr.

aeneus Scop. 6. Pr.

cryptarum F. 5. F.

tenax L. 4.—10, überall.

intricarius L. 4.—9, überall.

arbustorum L. 4.—10, überall.

rupium F. 5.—9. A Ch E M P I.

pertinax Scop. 4.—9, überall.

nemorum L. 4.—9. A Ch E F Pr.

alpinus Pr. 7.—9. A Ch.

horticola Dg. 5.—9 A Ch E M.

Myiathropa Rond.⁹⁾

florea L. 4.—10, überall.

Helophilus Mg.

trivittatus F. 4.—9. A Ch E F.

pendulus L. 4.—9, überall.

Eurymyia Big.¹⁰⁾

lineata F. 6. A E F.

Mallota Mg.

fuciformis F. 6. Pr.

Merodon Mg.

armipes Rd. Brück (Klepsch).

senilis Mg. Brück (Klepsch).

Tropidia Mg.

milesiformis Fll. 7. F.

Spilomyia Mg.

diopthalma L. 7. 8. A Ch E F.

Temnostoma St. F. et S.⁹⁾

speciosa Rossi 6. M.

vespiformis L. 8. E.

fallax L. 6.—8. C M.

Xylota Mg.

segnis L. 5.—9, überall.

confinis Ztt. 6. Ch.

pigra F. 7. 8. E M.

lenta Mg. 6. 7. M.

ignava Pz. 5.—9. A C Ch E F M.

femorata L. 5.—7. A Ch E F M.

curvipes Lw. Nach Schiner.

florum F. 6.—8. A Ch E M Pr.

abiens Mg. 5.—7. M.

silvarum L. 6.—9. Ch E M P I.

Syrirta St. Farg. et Serv.

pipiens L. 4.—10, überall.

Brachypalpus Mcq.

angustus Egg. 5. 6. A Ch M.

Criorrhina Mcq.

ruficauda Dg. Nach Schiner.

berberina F. 6. M.

Pocota St. Farg. et Serv.¹¹⁾

apiformis Schrk. Pr. (v. Stein.)

⁹⁾ St. Farg. et Serv., *Encycl. Méth.* X. 1875. 518. — ¹⁰⁾ Bigot: *Bull. soc. ent. de France* 1883. 21. — ¹¹⁾ Osten-Sacken: *Catal. Dipt. N. Amer.* 1878. 251.

Eumerus Mg.

ovatus Lw. Nach Loew.¹³⁾
tarsalis Lw. 5.—8. ACChEMPL.
tricolor F. Pr. (v. Stein.)
sabulonum Fll. Nach Loew.¹³⁾
flavitaris Ztt. (= *elegans* Schin.

Egg.) 7. 8. M Pl.

ruficornis Mg. Nach Loew.¹³⁾
lunulatus Mg. 7.—9. A Ch EF.

Chrysochlamys Rond.

cuprea Scop. (= *nigrifrons* Egg.)
 4.—9. A Ch EFG.
ruficornis F. 6. 7. A CE.

Orthoneura Mcq.

geniculata Mg. 4.—6. A Ch F.
nobilis Fll. 5.—9. A Ch EFM.

Chrysogaster Mg.

metallica F. 5.—8. A Ch EF.
chalybeata Mg. 7. A.
coemeteriorum L. 5.—8. AChEM.
virescens Lw. 5. A.
viduata L. 5. 6. A Ch EFM.
hirtella Lw. 5.—7. A Ch FH.
aerosa Lw. 5.—7. A Ch.
Macquarti Lw. 6. Ch FM.

Pipizella Rond.

virens F. 5.—8, überall.

Heringia Rond.

flavitaris Mg. (= *bipunctata*
 Strobl)¹³⁾ 5.—7. A.

Zetterstedti Rd. 5. 6. CF.

Pipiza Fll.

quadrinaculata Pz. 5. 6. A Ch E
 F. G. M.

festiva Mg. (= *luteitarsis* Ztt.)
 5.—7. EF.

plana Rd.¹⁴⁾ 7. A.

signata Mg. 7. Ch.

guttata Mg. 6.—8. A.

noctiluca L. 5.—8. A Ch EFM.

stigmatica Ztt.¹⁵⁾ 5. A.

lugubris F. Pr.

austriaca Mg. 7.—9. A Ch Pl.

Cnemodon Egg.

latitarsis Egg.¹⁵⁾ 5.—7. AChEF.

morionellus Ztt. 5. 6. A M.

fulvimanus Ztt. 5. 6. AELEFM.

brevicens Egg.¹⁶⁾ 7. FM.

Penium Phil.¹⁷⁾

carbonarium Mg. 6. 7. A M.

Paragus Ltr.

tibialis Fll. 5.—8. Ch F.

albifrons Fll. 6. C.

bicolor F. 6. Ch.

Chrysotoxum Mg.

fasciolatum Dg. 5.—8. ACChEM.

arcuatum L. 5. 6. A Ch M.

silvarum Mg. 5.—7. C Ch E.

intermedium Mg. 7. Ch Pr.

bicinctum L. 7. 8. A Ch EF.

lineare Ztt. 7. Ch.

festivum L. 5.—9, überall.

vernale Lw. 5.—7. C Ch Pr.

octomaculatum Curt. Pr. (von
 Stein.)

elegans Lw. 6. G Pr.

Psarus Ltr.

abdominalis F. 6. 7. K Pr.

Microdon Mg.

mutabilis L. 5. 6. A Ch.

devius L. 5. 6. A Ch EFM.

Ceria F.

conopsoides L. 7. E.

¹³⁾ Loew: Verh. d. zool. bot. Ges. Wien. 1855. 8. — ¹⁴⁾ Rondani: „Dipt. ital. Prodr.“ I. 1856. 53. Mik: Verh. d. zool. bot. Ges. Wien. 1881. 349: — ¹⁴⁾ Rondani: „Dipt. ital. Prodr.“ II. 1857. 179. — ¹⁵⁾ Zetterstedt. Dipt. Scand. XIII. 1859. 6029. — ¹⁶⁾ Egger: Verh. d. zool. bot. Ges. Wien. 1865. 573. — ¹⁷⁾ Philippi: Verh. d. zool. bot. Ges. Wien. 1865. 741. Bigot: Ann. de la Soc. ent. de France. 1882. 253.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Kowarz Ferdinand

Artikel/Article: [Beiträge zu einem Verzeichnisse der Dipteren Böhmens. V. 105-108](#)