

# Beiträge zur Kenntniss der Microlepidopteren-Fauna der Erzherzogthümer Oesterreich ob und unter der Enns und Salzburgs.

Von Josef Mann in Wien.

(9. Fortsetzung.)

**Adspersella Kollar.** — 6, Grinzing an Gebüsch en gefangen. Raupe auf Dolden.

**Silerella Stt.** — 7, Grinzing und Kahlenberg an Waldrändern. Raupe auf Dolden.

**Ocellana F.** — 5, 8, Mauer, Mödling und Bisamberg aus Gebüsch en gescheucht.

**Alstroemeriana Cl.** — 8, 9, in der Wiener Gegend in jungen pflanzenreichen Gebüsch en, selten.

**Purpurea Hw.** — 8, Prater am Schüttelzaun, selten. Raupe auf *Daucus Carota*.

**Liturella Hb.** — 7, Mauer im Gemeindewald, aus Hecken gescheucht, Tivoli in Remisen. Raupe auf *Hypericum*.

**Conterminella Z.** — 7, 8, Mauer auf der Himmelswiese, aus Gebüsch en gescheucht. Raupe in den Endtrieben an *Salix Caprea*.

**Impurella Tr.** — 7, auf dem Gahns um *Abies excelsa*, selten.

**Applana F.** — 4; 7, 8, an Waldrändern und in Auen um Hecken. Raupe auf *Conium*, *Daucus*, *Chaerophyllum sylvestre*.

**Capreolella Z.** — 4, 8, auf Berglehnen in der Wiener Gegend.

**Angelicella Hb.** — 6, 7, Mödling, Eichkogel, Mauer, an Gebüsch en.

**Cnicella Tr.** — 6, 7, in der Wiener Gegend auf Berglehnen um junges Gehölz.

**Parilella Tr.** — 6, Weidling am Bach und Mauer um Birkengebüsch, selten.

**Ferulae Z.** — 7, Eichkogel in jungen Gebüsch en auf Grasplätzen, sehr selten. Raupe auf Doldenpflanzen.

**Furvellia Tr.** — 7, Perchtholdsdorf und Giesshübel auf Berglehnen in Gebüsch en auf Doldenblüthen. Raupe auf *Dictamnus albus* in zusammengesponnenen Blättern.

**Depressella Hb.** — 6, 7, auf Berglehnen am Liechtenstein bis Baden. Raupe in den Dolden von *Daucus* und anderen Umbelliferen.

**Pimpinellae Z.** — 7, 8, Mauer, Bisamberg an Waldrändern im Gebüsch. Raupe in den Dolden von *Pimpinella saxifraga*.

**Libanotidella Schl.** — 9, auf dem Bisamberg um Weingärten, selten.

**Badiella Hb.** — 8, Mauer auf *Quercus* und *Pinus*.

**Cervicella HS.** — 4, 5, auf den Berglehnen von Mödling bis Baden vorkommend.

**Heracliana De Geer** — 6, im Helenenthal und bei Siegenfeld auf Dolden.

**Olerella Z.** — 7, Mauer im Gemeindewald an freien Stellen, auf Dolden sehr selten.

**Albipunctella Hb.** — 7, Mauer, Gemeindewald, am Waldrande der Wiesen, von *Abies pectinata* geklopft. Raupe auf *Chaerophyllum*.

**Douglasella Stt.** — 7, auf Eichen-

stämmen am Waldrande auf der Himmelswiese.

**Chaerophylli Z.** — 7, Lainz, Hütteldorf, Halterthal an Waldrändern auf Dolden. Raupe in den Blüten von *Chaerophyllum bulbosum*.

**Artemisiae Nick.** — 6, bei Baden um Artemisien.

**Heydenii Z.** — 8, 9, entwickelt aus Raupen, die ich am Schneeberge auf Doldenblüthen gesammelt hatte.

**Nervosa Hw.** — 6, in Gemüsegärten. Raupe in den Blüten von *Daucus Carota*.

**Dictamnella Tr.** — 8, auf den Berglehnen von Gumpoldskirchen bis Baden. Raupe in den Blüten von *Dictamnus*.

#### Psoricoptera Stt.

**Gibbosella Z.** — 8, 9, Mauer, Gemeinewald an *Quercus*, nicht selten. Raupe auf *Quercus*.

#### Gelechia Z.

**Pinguinella Tr.** — 6—8, im Prater an italienischen Pappeln häufig. Raupe auf *Populus*; Verpuppung in Rindenritzen.

**Nigra Hw.** — 6, 7, im Prater an Silberpappelstämmen. Raupe auf *Populus alba*.

**Muscoseella Z.** — 7, Mauer an Eichenstämmen. Raupe in gerollten Blättern auf *Populus* und *Salix*.

**Rhombella Schiff.** — 7, in Obstgärten, besonders auf Birnbäumen. Raupe in eingerollten Blättern von *Pyrus*, *Malus* und *P. communis*.

**Hippophaëlla Schrk.** — 7, bei Gloggnitz am Silberberg, selten, auch auf dem Laaerberg und bei Leobersdorf. Raupe an *Hippophaë rhamnoides*.

**Albicans Hein.** — 7, Laaerberg, in den Remisen, selten.

**Tephritella Dup.** — 4, 5, Mödling auf kahlen Bergen.

**Spurcella HS.** — 5, Mödling auf kahlen Berglehnen, auf Gebüsch.

**Holosericella HS.** — 7, Heuplacke am Schneeberge, sehr selten.

**Distinctella Z.** — 7, in den Remisen bei Tivoli und am Laaerberg, in Rodaun um Gebüsch und junge *Pinus*. Raupe auf *Genista tinctoria* zwischen zusammengezogenen Blättern.

**Scotinella HS.** — 6, Mödling bei der Schiessstätte um junge *Pinus*, in den Tivoli-Remisen, selten.

**Sororculella Hb.** — 6, Tivoli, Mauer und Rodaun um junges Gebüsch, selten. Raupe auf niederen Pflanzen und *Salix*.

**Flavicomella Z.** — 4, 5, auf *Prunus spinosa*, selten. Raupe überwintert in Gespinnsten auf *Prunus spinosa*.

**Velocella Dup.** — 5, 6, auf der Bodenwiese am Gahns und bei Mauer auf Haidekraut. Raupe auf *Calluna* und *Vaccinium*.

**Decolorella Z.** — 7, Alpeleck und Saugraben am Schneeberg.

**Ignorantella HS.** — 6, Mödling auf dem Liechtenstein, selten.

**Pellella Tr.** — 6, im Prater auf Weissdorn und Pflaumbäumen. Raupe auf *Crataegus*, *Prunus spinosa*, auch Pomaceen.

**Ericetella Hb.** — 4—8, überall wo Haidekraut vorkommt. Raupe auf *Calluna* und *Vaccinium*.

**Infernalis HS.** — 7, Schneeberger Alpen, auf dem Alpeleck und der Bodenwiese. Raupe auf *Vaccinium Myrtillus*.

**Lentiginosella Z.** — 7, auf Berglehnen, in Remisen bei Tivoli und am Bisamberg. Raupe auf *Genista tinctoria* und *Erythraea Centaurium*.

**Mulinella Z.** — 6, Liechtenstein um Hecken, selten.

**Interruptella Hb.** — 6, auf dem Bisamberg um *Juniperus*.

**Petasis Pfaff.** — 7, Saugraben und Heuplacke am Schneeberge. Raupe auf *Tussilago* zwischen Blättern.

**Malvella Hb.** — 7, in Gärten um Malven. Raupe lebt in Samenkapseln der *Althea rosea*.

**Galbanella Z.** — 6, im Mauererwald an Baumstämmen.

**Continuella Z.** — 7, auf dem Alpeleck in Holzschlägen.

**Perpetuella HS.** — 7, auf der Heuplacke und am Waxrigel um *Pinus Mughus*.

**Solutella Z.** — 4, 6, von Mauer bis Vöslau auf den Berglehnen nicht selten.

**Longicornis Curt.** — 6, Gahns auf der Bodenwiese. Raupe auf *Callunna*.

**Elatella HS.** — 7, Saugraben, am Schneeberge auf Steingerölle.

**Albifemorella Hofm.** — 7, Saugraben am Schneeberge auf Steingerölle und unter Steinen. Raupe auf *Rumex*, welcher im Steingerölle wächst.

**Diffinis Hw.** — 6, Rodaun, Gaisberg um junge *Pinus*. Raupe im unteren Theil des Stieles von *Rumex acetosa*.

**Electella Z.** — 7, Hohewand, Trenkwiese, Alpeleck am Schneeberge auf *Abies excelsa*.

**Scalella Sc.** — 5, 8, Mauer an Eichenstämmen und Laubgebüsch. Raupe auf *Quercus*.

**Lugubrella F.** — 7, einmal einige Stücke auf der Brandstattwiese am Schneeberge gefangen.

**Viduella F.** — 7, Waxrigel am Schneeberg zwischen *Pinus Mughus*, sehr selten.

**Luctuella Hb.** — 7, auf dem Alpeleck einmal zwei Stück auf *Epilobium* gefangen.

**Tessella Hb.** — 7, überall in der Wiener Gegend auf *Berberis vulgaris*. Raupe auf *Berberis* in einem Gespinnste.

**Maculatella Hb.** — 6, 7, auf den Berglehnen von Tivoli bis über Baden, um Hecken, selten.

**Cytisella Tr.** — 6, Bisamberg, Mauer, Giesshübel, Eichkogel, aus Sträuchern gescheucht, sehr selten.

### Brachmia Hein.

**Mouffetella Schiff.** — 7, Mauer, Richardshof und auf den Alpen auf *Abies excelsa*. Raupe in versponnenen Blättern von *Loniceren*.

**Nigricostella Dup.** — 4, 5, in der Wiener Gegend auf Berglehnen. Raupe auf niederen Pflanzen wie *Medicago sativa* an den Endblättern.

### Bryotropha Hein.

**Latella HS.** — 6, in den Laaerberger Remisen, selten.

**Terrella Hb.** — 6, 7, überall auf Wiesen, Hutweiden und Bergen, gemein. Raupe auf verschiedenen Grasarten.

**Senectella Z.** — 6, Mauer und Mödling auf grasreichen Berglehnen. Raupe wohl an niederen Pflanzen.

**Minorella Hein.** — 6, Mödling auf Berglehnen, 1839 gefangen.

**Cinerosella Tgstr.** — 7, auf der Bodenwiese auf dem Gahns, selten.

**Affinis Dgl.** — 6, im Prater am Schüttelzaun, einige Male gefangen.

**Umbrosella Z.** — 6, auf Berglehnen in der Wiener Gegend. Raupe auf *Anthyllis vulneraria* in Blüten und Samen.

**Basaltinella Z.** — 7, um Steingerölle bei Rodaun und im Saugraben.

### Lita Tr.

**Inustella HS.** — 6, auf trockenen Berglehnen bei Mödling, Baden u. s. w.

**Psilella HS.** — 6, 7, Mauer, bei der Schiesstätte und bei der Himmelswiese um Gesträuch. Raupe auf *Artemisia campestris*.

**Diffuella Hein.** — 7, Schneeberger Alpen, im Saugraben und auf der Bodenwiese.

**Artemisiella Tr.** — 6, überall um Wien, 7 auf den Alpen auf Wiesen. Raupe auf *Thymus* und *Artemisia campestris*.

**Atriplicella F. R.** — 5, 8, überall um Wien. Raupe in zusammengesponnenen Blättern von *Atriplex*.

**Salinella Z.** — 7, Mödling beim schwarzen Thurm, auf *Pinus*.

**Obsoletella F. R.** — 5, 8, überall auf *Atriplex laciniata*. Raupe im Stengel dieser Pflanze; Metamorphose bei F. R. abgebildet; von mir 1838 entdeckt.

**Tussilaginata Hein.** — 7, Eichkogel und Lackerboden, am Schneeberg, um *Tussilago*. Raupe in den Blättern von *Tussilago Farfara* minirend.

**Murinella HS.** — 4, Mauer bei der Schiessstätte, auf *Callunna*. Raupe auf *Callunna*.

**Rancidella HS.** — 6, Berglehnen bei Mödling, Rodaun, selten.

**Halonella HS.** — 5, Mödling auf Berglehnen um Gebüsch, selten. Raupe auf *Artemisia campestris*.

**Acuminatella Sircom.** — 5, im Prater um Disteln in Gebüsch.

**Ingloriella Hein.** — 7, Schneeberger Alpen, Heuplacke, Alpeleck.

**Hübneri Hw.** — 7, Tivoli, in Remisen, auf *Quercus*, selten.

**Maculea Hw.** — 7, Tivoli, in Remisen, auf jungen *Quercus*.

**Tricolorella Hw.** — 6, 7, im Prater auf *Crataegus*, bei Mauer um *Prunus spinosa*. Raupe auf *Stellaria Holostea*.

**Maculiferella Dgl.** — 6, 7, Prater, an Zäunen und Baumstämmen.

**Junctella Dgl.** — 7, Tivoli, in Remisen, um *Quercus*.

**Marmorea Hw.** — 4, auf *Prunus domestica* und *Populus*.

**Albifrontella Hein.** — 5, in den Remisen bei Tivoli.

**Kiningerella HS.** — 6, an Gartenzäunen im Prater, in Altmanndorf, Liesing und Hütteldorf, sehr selten.

**Fischerella Tr.** — 7, 8, Mödling, Gumpoldskirchen, Rodaun, um *Saponaria officinalis*. Raupe auf *Saponaria officinalis* in zusammengesponnenen Blütenknospen.

**Cauligenella Schmid.** — 7, Mauer, um Eichengebüsch bei der Schiessstätte, selten.

**Leucomelanelia Z.** — 7, Rodaun und Prater, auf *Crataegus*.

**Tischeriella Z.** — 6, 7, im Prater an Baumstämmen und Zäunen, selten.

**Sestertiella HS.** — 7, 8, im Prater

an Zäunen, *Acer* und *Crataegus*. Raupe auf *Acer* und *Crataegus*.

### Teleia Hein.

**Vulgella Hb.** — 7, in Gärten auf Obstbäumen, in Mauer, Mödling; im Prater, um *Prunus spinosa* und *Crataegus*. Raupe auf Obstbäumen und *Crataegus*

**Scriptella Hb.** — 6, Prater, Mauer, Tivoli, an Weiden, Weissdorn- und Ahornhecken, sehr selten. Raupe auf *Acer*, *Crataegus* und *Salix*.

**Alburnella Z.** — 6, 7, Weidling-am-Bach, Mödling, auf *Betula*.

**Sequax Hw.** — 6, überall um Wien und auf Alpen um Sträucher. Raupe auf *Helianthemum vulgare* und anderen niederen Pflanzen in zusammengesponnenen Blättern.

**Fugitivella Z.** — 6, 7, im Prater, an Zäunen, Ahorn- und Ulmen. Raupe auf *Ulmus* und *Acer*, Verpuppung in den Rindenrissen.

**Fugacella Z.** — 6, 7, Prater, an Zäunen, Ahorn- und Ulmenstämmen. Raupe auf *Acer*, *Populus* und *Ulmus*.

**Humeralis Z.** — 4—8, Mauer an *Quercus* und *Fagus*. Raupe wohl auf Laubhölzern?

**Proximella Hb.** — 6, im Prater an Zäunen und Pappelstämmen, in Mauer, Weidling-am-Bach, an Birken und Eichen. Raupe auf *Betula*, *Alnus* und anderem Laubholz.

**Notatella Hb.** — 5, Remisen bei Tivoli, bei Mauer, im Prater, um Hecken. Raupe auf *Salix*.

**Triparella Z.** — 6, in Remisen bei Tivoli und am Laaerberg, dann bei Mauer im Eichengebüsch. Raupe auf niederen Pflanzen.

**Luculella Hb.** — 6, im Prater, an Zäunen, Pappeln und Weidenstämmen. Raupe in Moderholz nach Frey, vielleicht in morschen Stämmen von *Salix*.

**Dodecella L.** — 6, Mauer, Mödling, auf *Pinus*, 8 auf Alpen um *Pinus Mughus*. Raupe in Knospen von *Pinus*.

(Fortsetzung folgt.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Mann Josef Johann

Artikel/Article: [Beiträge zur Kenntniss der Microlepidopteren-Fauna der Erzherzogthümer Oesterreich ob und unter der Enns und Salzburgs. 9. Fortsetzung. 129-132](#)