

Die Nitiduliden Japans.

Von Edm. Reitter in Mödling.

(Fortsetzung. Vide pag. 104.)

Epuraea Erichs.

- foveicollis Reitt. l. c. 1873. 33. — Nagasaki, Kiga.
 funeraria n. sp. (vide III. Jahrg. p. 301). Kiga, Miyanoshita.
 **carpathica Reitt. Deutsch. Ent. Zeitschr. 1878. 51. —
 var. quadrimaculata Reitt. — (vide III. Jahrg. p. 301.)
 Yuyama.
 **variegata Herbst, Käf. V. 245. t. 54. f. 3. — Kumamoto,
 Nagasaki, Kobe und Miyanoshita.
 **obsoleta Fbr. Ent. Syst. I. 256. Hagi (Hiller). (Hilleri Reitt.
 Deutsch. Ent. Zeitschr. 1876. 315.) — Nagasaki, Hiogo.
 **imunda Sturm, Ins. XVI. 59. t. 294. f. d. D. — Niohosan.
 decolor n. sp. (vide III. Jahrg. p. 302.) — Chiuzenji.
 domina Reitt. Verh. nat. Ver. 1873. 31. — Nagasaki.
 obnoxia Reitt. l. c. 1873. 32. — Yokohama.
 similis Reitt. l. c. 1873. 32. — Japan.
 apposita n. sp. (vide III. Jahrg. p. 302.) — Chiuzenji.
 paulula Reitt. l. c. 1873. 36. — Hagi. (Hiller.)
 submicrurula n. sp. (vide p. 15). — Miyanoshita.
 rubronotata Reitt. l. c. 1873. 37. — Nagasaki, Miyanoshita,
 Yokohama.
 parilis Reitt. l. c. 1873. 37. — Nagasaki, Hagi.
 rapax Reitt. n. sp. (vide p. 15.) — Hitoyoshi.

Micrurula Reitt.

- japonica Reitt. Verh. nat. Ver. 1873. 39. — Nagasaki, Chiu-
 zenji, Junsai.
 fusciceps n. sp. (vide p. 15.) — Hakodate.
 dura n. sp. (vide p. 16.) — Enoshima.
 mandibularis Reitt. l. c. 1873. 38. — Yokohama, Nagasaki.

Aphenolia Reitt.

- pseudosoronia n. sp. (vide p. 16.) — Higo, Konosé und
 Yuyama.

Parametopia Reitt.

- x-rubrum n. sp. (vide p. 17 et Taf. IV, Fig. 6.) — Ichibosa-
 yama, Higo.

Nitidula Fabr.

- ** *carnaria* Schaller, Schrift. nat. Ges. Hal. I. 1783. 257. —
Nagasaki, ein Exemplar. (*quadripustulata* Fabr.)

Omosita Erichs.

- japonica* Reitt. Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1874. 510. —
Japan.

- ** *colon* Linn. Faun. Suec. p. 151. — Wie die Vorige.

- ** *discoidea* Fabr. Syst. Ent. p. 78. — Wie die Vorige.

Stelidota Erichs.

- multiguttata* Reitt. Deutsch. Ent. Zeitschr. 1876. 110. —
Nagasaki, Kobé, Kiga, Tokio.

Ipidia Erichs.

- * *variolosa* Reitt. l. c. 1879. 215. — In Buchenschwämmen
allenthalben gemein.

- * *sibirica* Reitt. (vide Taf. IV, Fig. 4.) Auf allen japanischen
Inseln gemein. (*Stelidota sibirica* Reitt. l. c. 1879. 216.) —

Soronia Erichs.

- * *japonica* Reitt. Verh. nat. Ver. Brünn, 1873. 47. — Nagasaki,
Yokohama.

- Lewisi* n. sp. (vide p. 17.) — Shiba, Tokio.

- fracta* n. sp. (vide p. 18 et Taf. IV, Fig. 2.) — Junsai.

Physoronia Reitt.

- explanata* n. sp. (vide p. 18.) — Konosé, Kiga, Suyama, in
weissen Buchenschwämmen.

- tuberculifera* Reitt. — Nagasaki. (*Lasiodactylus tuberculifer*
Reitt. Verh. nat. Ver. Brünn, 1873. 87.)

- Hilleri* Reitt. — Hitoyoshi, Fukui, Chiuzenji, Junsai. (*Soro-*
nia Hilleri Reitt. Deutsch. Ent. Zeitschr. 1876. 315.)

Atarphia Reitt.

- fasciculata* n. sp. (vide p. 39 et Taf. IV, Fig. 5.) — Yuyama
Miyanoshta, Nikko, Wada-togé und Sapporo.

- quadripunctata* n. sp. (vide p. 39.) — Hitoyoshi, Suyama,
Nikko.

Pria Steph.

- japonica* Motsch. Etud. ent. 1860. 12. — Kompira, Nagasaki.

(Schluss folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Reitter Edmund

Artikel/Article: [Die Nitiduliden Japans. \(Anm.: Fortsetzung\). 141-142](#)