

# Beiträge zur Kenntniss der Microlepidopteren-Fauna der Erzherzogthümer Oesterreich ob und unter der Enns und Salzburgs.

Von Josef Mann in Wien.

(11. Fortsetzung.)

## Glyphipterygidae.

### Glyphipteryx Hb.

**Bergstraesserella F.** — 6, Weidlingbach, Sonnwendstein, Saugraben auf Birken, um Fichten und Kiefern.

**Thrasionella Sc.** — 5, 8, überall auf Sumpfwiesen.

**Haworthana Sth.** — 6, Moosbrunn auf den Torfwiesen, selten.

**Equitella Sc.** — 5, 6, auf dem Wiener Linienwall und überall auf Berglehnen und Wiesen.

**Majorella Hs.** — 5, Mauer und Mödling auf *Clematis*, selten.

**Forsterella F.** — 5, Mauer auf Sumpfwiesen, auf Blumen.

**Fischeriella Z.** — 5 und 8, im Prater am Henstadel-Wasser und in der ganzen Wiener Gegend.

## Gracilaridae.

### Gracilaria Z.

**Alchimillella Sc.** — 5, 6, Tivoli, Laaerberg, Mauer, überall in der Wiener Gegend in Gebüsch. Raupe in einer Blattdüte auf *Quercus* und *Acer*.

**Stigmatella F.** — 5, 8, um Wien in Laubgebüsch. Raupe in einer Blattdüte auf *Salix*.

**Oneratella Z.** — 5, im Prater auf Erlen gefangen. Raupe in eingerollten Blättern von *Alnus*.

**Onustella Hb.** — 5, 8, Tivoli, Mauer, auf Eichen und wildem Hopfen. Raupe auf *Humulus Lupulus*.

**Hemidactylella F.** — 9, im Prater auf Ahorn, Weissdorn und Ulmen.

**Fidella Reutti.** — 5, im Prater auf wildem Hopfen und Nesseln. Raupe in Blättern von *Humulus Lupulus*.

**Falconipennella Hb.** — 9, bei Tivoli, Mauer und am Bisamberg, auf Eichen. Raupe in eingerollten Blättern von *Alnus*.

**Semifascia Hw.** — 4, 5, Prater, Mauer in Gebüsch. Raupe auf *Acer* und *Crataegus*.

**Populetorum Z.** — 5, 8, Mauer, Weidlingbach, Bisamberg auf Birken und Eichengebüsch. Raupe auf *Betula*, *Populus* und *Salix*.

**Elongella L.** — 5—9, überall in der Wiener Gegend in Laubgebüsch. Raupe auf *Acer* in dütenartig umgeschlagenen Blättern.

**Juglandella Mn.** — 5, auf Nussbäumen im Piestingthal, Payerbach. Raupe auf *Juglans regia* in dütenartig umgeschlagenen Blättern.

**Rufipennella Hb.** — 5, 8, im Prater auf Ahorn und Weissdornbäumen. Raupe in umgeschlagenen Blättern von *Acer*.

**Tringipennella Z.** — 5, 6, überall um Wien auf trockenen Wiesen und Berglehnen.

**Limosella Z.** — 4, 5, überall in der Wiener Gegend auf Wiesen und Bergen, 6 auf dem Gahns. Raupe wie eine *Lithocolletis* die Blätter von *Teucrium Chamaedrys* minirend.

**Roscipennella Hb.** — 5, 8, Prater auf Ahornbäumen. Raupe in einem dütenartigen Umschlage der Blätter von *Acer*.

**Syringella F.** — 5, 8, überall in Oesterreich. Raupe auf *Syringa vulgaris* in Düten der umgebogenen Blätter.

**Simplioniella F. R.** — 8, von Herrn Schleicher am Hochkrohr aufgefunden.

**Phasianipennella** Hb. — 5, 6, im Prater, bei Tivoli, Mauer.

**ab. Quadrupella** Z. — 5, in Remisen auf dem Laaerberg, selten. Raupe auf *Rhamnus Frangula* in Blattminen.

**Quadrignella** Z. — 5, 6, Tivoli, Mauer, Liechtenstein auf *Prunus spinosa* und *Crataegus*.

**Auroguttella** Sph. — 5, 6, Prater, Tivoli bis Baden auf grasreichen Berglehnen.

**Ononidis** Z. — 6, von Mauer bis Baden, selten. Raupe an *Ononis* und *Trifolium* minirend.

**Imperiaella** Mn. — 6, Prater an Stämmen von *Prunus Padus*. Raupe an *Symphytum officinale*.

**Pavoniella** Z. — 5, auf dem Bisamberg auf pflanzenreichen Lehnen gefangen.

**Kollariella** Z. — 5, in Remisen bei Tivoli und in Mauer auf *Fraxinus*.

#### Corscium Zell.

**Brongniardellum** F. — 8, 9, in jungen Eichengebüschen überall um Wien.

**Cuculipennellum** Hb. — 8—9, um Liguster-Hecken.

**Sulphurellum** Hw. — 5, 9, bei Tivoli, im Prater, bei Mauer, Baden auf Ahorn, Eichen und Kiefern. Raupe auf *Acer* in Blattminen.

#### Ornix Zell.

**Guttea** Hw. — 5, 6, in Obstgärten auf *Pyrus Malus*, *P. communis* und *Prunus domestica*. Raupe biegt den Blattrand um, in welchem sie minirt.

**Interruptella** Zett. — 7, fand Herr Schleicher am Hochkohl und Scheiblingstein diesen schönen Falter. Ich fing im Juli 1873 einige Exemplare am Lackerboden auf *Rubus Idaeus*.

**Petiolella** Frey. — 5, im Prater an Weissdorn. Raupe auf Blättern von *Pyrus Malus* und *Crataegus*.

**Fagivora** Stt. — 6, Kaltenlentgeben, Richardshof auf junger *Fagus*.

**Anglicella** Stt. — 5, im Prater auf Weissdornbäumen und Hecken.

**Avellanella** Stt. — 6, Rodaun, Gaisberg um *Corylus*.

**Finitimella** Z. — 5, Tivoli in Remisen auf Schlehen. Raupe auf *Prunus spinosa*.

**Torquillella** Z. — 5, 6, Remisen bei Tivoli und Mauer auf Schlehen. Raupe an *Prunus spinosa*.

**Betulae** Stt. — 5, Mauer um junge Birken gefangen.

**Anguliferella** Z. — 6, 7, Prater am Schüttelzaun, an Planken gefangen. Raupe auf *Pyrus communis*.

**Caudulatella** Z. 1839. — 6, Prater an alten Weidenstämmen und Zaunplanken, sehr selten. Raupe an *Salix*?

### Coleophoridae.

#### Coleophora Zell.

**Laricella** Hb. — 5, 7, überall, wo Lärchenwälder sind, sehr schädlich. Raupe im Sack an den Nadeln von *Larix europaea*.

**Badiipennella** Dup. — 5, 6, im Prater an Ulmen und *Parietaria*. Sack an *Ulmus* und *Acer*.

**Milvipennis** Z. — 6, Weidling-am-Bach, Bisamberg und Mauer um junge Birken. Sack an *Betula*.

**Unipunctella** Z. — 4, 5, im Prater und an anderen Orten, wo *Chenopodium hybridum* wächst. Sack im Herbste an dem Samen von *Chenopodium hybridum*; Raupe überwintert.

**Limosipennella** Dup. — 5, 6, Prater auf *Alnus* und *Parietaria*, auch auf *Ulmus*.

**Ochripennella** Z. — 6, im Prater am Heustadelwasser aus Hecken gescheucht. Sack an *Ballota nigra*.

**Cornuta** Frey. — 5, am Liechtenstein auf *Onobrychis* gefangen.

**Lithargyrinella** Z. — 6, Mauer: Schiessstätte und Himmelswiese.

**Flavipennella HS.** — 6, 7, Prater in Gebüsch auf *Parietaria* und *Alnus*. Sack auf *Parietaria officinalis* und *Ballota nigra*.

**Lutipennella Z.** — 6, 7, Laaerberg, Tivoli in Eichenwäldchen.

**Fuscedinella Z.** — 5, 7, im Prater auf *Crataegus*. Sack von mir auf *Alnus incana* gesammelt.

**Binderella Kollar.** — 7, Prater, überall in Erlengebüsch. Sack 5, 6, häufig auf *Alnus*-Blättern.

**Viminetella Z.** — 7, im Prater auf *Salix*.

**Glitzella Hofm.** — 8, im Prater auf *Parietaria* gefangen. Sack an *Vaccinium Vitis idaea*.

**Orbitella Z.** — 7, Gahns am Lackerboden, an Rändern in Holzschlägen. Sack an *Vaccinium Myrtilus*.

**Gryphipennella Bouché.** — 7, Prater um Erlengebüsche. Sack auf alten *Salix*-Stämmen.

**Nigricella Stph.** — 7, überall auf *Prunus spinosa*, *P. domestica* und *P. avium*.

**Paripennella Z.** — 6, im Prater und den Taborauen an Erlenstämmen. Säcke 5, auf Flechten an *Alnus*.

**Ledi Stt.** — 6, auf Cornelkirschen, Laaerberg, Mauer bis Baden. Sack an *Cornus*, *Viburnum*, auch auf jungen Linden.

**Albitarsella Z.** — 7, Bisamberg um Haselgebüsch. Sack an *Corylus*.

**Fuscocuprella HS.** — 6, Kaltenleutgeben und Rodauner Gaisberg um Gebüsch.

**Cuprariella Z.** — 6, Baden auf Berglehnen, auf Grasstengeln, selten. Sack an Baumstämmen.

**Aleyonipennella Kollar.** — 5, 6, in den Praterauen und auf den Berglehnen von Tivoli bis Baden, auch auf dem Gahns.

**Deauratella Z.** — 6, 1842, einmal bei Baden auf dem Kalvarienberge gefangen.

**Hieronella Z.** — 6, Prater, Rodaun, Mödling auf Hutweiden und Berglehnen.

**Fabriciella Vill.** — 6, auf den Lehnen am Eichkogel und von Gumpoldskirchen nach Baden auf Gräsern. Sack auf *Trifolium pratense*.

**Hemerobiella Sc.** — 6, auf *Pyrus Malus*, *P. communis* und *Prunus avium*. 4, 5, an Blättern, Stämmen und Aesten der Obstbäume.

**Anatipennella Hb.** — 6, Prater, Schönbrunn, an *Tilia*. Sack an Blättern von *Tilia* und *Prunus avium*.

**Palliatella Zk.** — 6, am Liechtenstein auf wilden Kirschen und anderen Laubbälzern. Sack an verschiedenen Laubbälzern.

**Currucipennella Z.** — 7, Tivoli, Schönbrunn, Mödling, Baden etc. allenthalben um Eichegebüsch. Sack an *Quercus*, *Acer* und *Fagus*.

**Serratulella HS.** — 7, 8, Mödlinger und Badener Berge im Grase und auf *Serratula*. Sack an *Jurinea mollis*; überwintert öfters.

**Auricella F.** — 6, Hetzendorfer Haide, Mödling und im Prater auf Gräsern und Pflanzen. Sack auf *Thymus* und *Lavathera*.

**Virgatella Z.** — 7, Schneeberger Alpen.

**Serenella Z.** — 6, 7, auf Berglehnen und in Gärten in der Wiener Gegend. Sack an *Astragalus glycyphyllos*, *Hippocrepis comosa* und *Colutea arborescens*.

**Coronillae Z.** — 5, 6, Rodaun bis Baden auf Berglehnen um *Onobrychis*. Sack an Blättern von *Coronilla varia*.

**Gallipennella Hb.** — 7, Mödling, Baden, Bisamberg, selten. Sack an *Coronilla*.

**Vulnerariae Z.** — 5, 6, Tivoli, Himmelswiese, Mauer und Baden, auf trockenen Lehnen und Bergen. Sack nach Zeller an *Anthyllis vulneraria*.

**Bilineella HS.** — 6, Tivoli, Mauer, Mödling auf Berglehnen, auf Gräsern,

sehr selten. Herr v. Hornig hat diese Art aus im Juli bei Rodaun auf *Helianthemum vulgare* gefundenen Säcken erzogen.

**Pyrrhulipennella Z.** — 6, Prater in den Heustadelwasser-Auen und bei Hütteldorf.

**Ditella Z.** — 6, Liechtenstein auf den Wiesen am Saume der Kiefernbestände. Sack an *Artemisia campestris*.

**Vibicigerella Z.** — 6, Rodaun, Giesshübel, Mödling, Baden auf Berglehnen im Gebüsche. Sack an *Onobrychis*.

**Astragalella Z.** — 5, 6, Hetzendorf, Mauer, Giesshübel an Gebüschen auf Berglehnen. Sack an *Astragalus glycyphyllos*.

**Colutella F.** — 7, Baden, Helenenthal, Siegenfeld auf Berglehnen, sehr selten. Sack auf *Scabiosa*.

**Fuscociliella Z.** — 7, Mauer bis Baden auf Berglehnen und Bergen, auf Gräsern. Sack an *Helianthemum vulgare* und *Coronilla*.

**Vicinella Z.** — 5, 7, Mauer, Rodauner Gaisberg, Mödling auf Berglehnen an Waldrändern.

**Conspicuella Z.** — 5, 6, am Liechtenstein und Eichkogel auf Berglehnen. Sack an *Centaurea nigra* und *C. Scabiosa*.

**Caelebipennella Z.** — 6, Eichkogel auf Berglehnen um Hecken, auch auf Alpenwiesen. Sack an *Artemisia campestris*.

**Vibicella Hb.** — 6, Mauer bis Baden in pflanzenreichen Gebüschen. Sack an *Solidago Virgaurea*.

**Stramentella Z.** — 5, Tivoli, Mauer und Mödling auf Berglehnen, selten. Sack auf *Artemisia campestris*.

**Lixella Z.** — 7, Schneeberger Alpen, Heuplacke, Alpeleck, Waisnixwiese. Sack an *Thymus Serpyllum* und an Gräsern.

**Ornatipennella Hb.** — 5—7, in ganz Oesterreich, häufig. Sack an *Salvia* und an Gräsern.

**Ochrea HS.** — 7, 8, Mödling bis Baden an Pflanzenstengeln. Sack an *Helianthemum vulgare*.

**Binotapennella Dup.** — 7, Wien in Gärten an Zäunen und Mauern auf *Chenopodium*. Sack an *Chenopodium*; er besteht aus Samenkörnern.

**Ballotella F. R.** — 6, 7, überall, wo *Ballota nigra* wächst. Sack an der Unterseite der Blätter von *Ballota nigra*.

**Onordiella Z.** — 6, bei Baden in den Alexandrowitsch'schen Anlagen einigemale gefangen. Sack an *Onopordon* und *Betonica officinalis*.

**Leucapennella Hb.** — 5, in den Remisen am Laaerberg und bei Tivoli, um Mauer und Baden auf pflanzenreichen Stellen. Sack an *Lychnis viscaria*, *Silene nutans* und *Silene gallica*.

**Marginatella HS.** — 6, bei Mödling ober dem Steinbruche gefangen.

**Discordella Z.** — 5, 6, Mödling und Baden auf Berglehnen.

**Genistae Stt.** — 6, 7, in den Remisen bei Tivoli, bei Mauer, am Eichkogel um *Genista* und andere Pflanzen.

**Bilineatella Z.** — 6, 7, Mödling, Baden, Siegenfeld, auf grasreichen Plätzen.

**Arenariella Z.** — 6, Mödling und Bisamberg auf sandigen Berglehnen.

**Onobrychiella Z.** — 7, 9, Rodauner Gaisberg in der Nähe der alten Burg Kammerstein. Sack an *Onobrychis sativa*.

**Niveicostella Z.** — 5, 6, im Prater und in der ganzen Umgebung von Wien, auch auf Alpen, auf Wiesen und Berglehnen. Sack an *Thymus Serpyllum*.

**Albicostella Dup.** — 5, 6, 9, überall um Wien, auf Wiesen, Berglehnen und Bergen. Sack an Doldengewächsen und *Potentilla cinerea*.

(Fortsetzung folgt.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Mann Josef Johann

Artikel/Article: [Beiträge zur Kenntniss der Microlepidopteren-Fauna der Erzherzogthümer Oesterreich ob und unter der Enns und Salzburgs. 11. Fortstzung. 197-200](#)