

# Beiträge zur Kenntniss der Microlepidopteren-Fauna der Erzherzogthümer Oesterreich ob und unter der Enns und Salzburgs.

Von Josef Mann in Wien.

(12. Fortsetzung.)

**Trifariella Z.** — 5, Bisamberg und Baden auf Berglehnen in jungen Gebüschen.

**Oriolella Z.** — 6, auf dem Liechtenstein um Kiefern gefangen. Sack an *Coronilla* und *Astragalus*.

**Fringillella Z.** — 5, im Prater auf Wiesen.

**Rectilinella F. R.** — 7, Schneeberger Alpen, Heuplacke, Saugraben und Waxrigel.

**Tractella Z.** — 7, Schneeberg am Waxrigel.

**Saponariella Heeger.** — 7, in Gärten in der Umgebung Wiens.

**Striolatella Z.** — 6, Mauer, Himelwiese und Rodauner Gaisberg, selten. Sack an *Centaurea*.

**Onosmella Brahm.** — 6, 7, Prater, Liechtenstein, Eichkogel. Sack an *Echium vulgare*, *Anchusa officinalis*, *Achillea Millefolium*.

**Chamaedryella Stt.** — 6, Liechtenstein, Richardshof, auf grasreichen Stellen, auf Berglehnen.

**Striatipennella Tgstr.** — 9, Mauer, Rodaun auf Berglehnen, auch auf dem Gahn, auf der Bodenwiese.

**Therinella Tgstr.** — 7, 8, Liechtenstein, Laaerberg, Baden auf Berglehnen zwischen Hecken. Sack an *Artemisia*.

**Troglodytella Dup.** — 7, Liechtenstein, Eichkogel auf Berglehnen und Bergen, wo *Inula* vorkommt. Sack an *Inula* und *Artemisia*.

**Inulae Wke.** — Von Herrn Eduard Kreithner in den Donau-Auen bei Spillern der Sack im August auf *Inula salicina* gefunden.

**Pratella Z.** — 6, bei Moosbrunn auf Torfwiesen gefangen.

**Lineolea Hw.** — 6, in der Wiener Gegend auf Berglehnen. Sack an *Stachys sylvatica* und *Ballota nigra*.

**Nutatella Mühlig.** — 7, in Weidling-am-Bach, Hermannskogel.

**Lineariella Z.** — 5, 6, Prater, dann von Tivoli bis Baden auf Berglehnen und auf dem Schneeberge.

**Dianthi HS.** — 5, 6, Mödling, auf der Berghöhe, bei der goldenen Stiege.

**Succursella HS.** — 8, Prater, Rodaun, Bisamberg.

**Silenella HS.** — 6, Mauer bis Baden auf Berglehnen.

**Ciconiella HS.** — 6, 7, in den Remisen bei Tivoli und dem Laaerberge.

**Millefolii Z.** — 7, 8, auf den Berglehnen bei Mödling und Baden.

**Directella Z.** — 7, 8, Mauer bis nach Baden auf Berglehnen und Bergen, auch im Saugraben.

**Gnaphalii Z.** — 6, 7, Bisamberg und Korneuburg.

**Motacillella Z.** — 6, 7, Wien an Gartenzäunen und Mauern. Sack auf *Chenopodium* und *Atriplex*.

**Argentula Z.** — 6, in den Remisen bei Tivoli. Sack an den Blüten von *Achillea Millefolium*.

**Granulatella Z.** — 7, Wien in Gärten und bei Tivoli und Mauer. Sack an *Artemisia campestris*.

**Virgaureae Stt.** — 5, 6, bei Tivoli, Mauer, Richardshof und Baden in jungen Gebüschen.

**Asteris Mühlig.** — Brühl an Berglehnen und Waldrändern.

**Artemisiae Mühlig.** — 7, Rodauner Gaisberg, Giesshübel an Waldrändern.

**Otitae Z.** — 6—8, im Prater, Möd-

ling, Baden um Hecken. Sack an den Wurzelblättern der *Silene Otites*.

**Laripennella** Zett. (*Annulatella Tgstr.*) — 7, in Gärten, im Prater und auf Berglehnen.

**Flavaginella** Z. — 8, Kuhschneeberg und Saugraben am Schneeberg.

**Taeniipennella** HS. — 6, im Prater auf *Parietaria officinalis*.

**Otidipennella** HS. — 5, Mauer, Himelsswiese auf Graslehnen.

**Murinipennella** Dup. — 4, 5, überall in der Wiener Gegend auf Hutweiden und Wiesen.

**Gaespititiella** Z. — 6, im Prater an Gebüschrändern; 7, auf den Schneeberger Alpen. Sack an *Alnus incana*.

#### Gonidoma Z.

**Auroguttella** F. R. — 8, 9, in Wien an Gartenzäunen. Sack an den Blüten von *Atriplex laciniata*.

### Lavernidae.

#### Chauliodus Tr.

**Illigerellus** Hb. — 6, im Prater in Erlengebüsch.

**Scurellus** HS. — 6, 7, Schneeberger Alpenwiesen.

**Pontificellus** Hb. — 6, überall in der Wiener Gegend auf Berglehnen und Bergen.

**Insecurellus** Stt. — 5, Laaerberg, spät Abends auf Grasplätzen.

**Aequidentellus** Hofm. — 7, Gahns, Lackerboden auf *Epilobium*.

**Chaerophyllellus** Goeze. — 5, 8, bei Tivoli, im Prater und am Bisamberg, Oberweiden. Die Herren v. Hornig und Rogenhofer haben diese Art aus Raupen auf *Seseli coloratum* erzogen.

#### Ochromolopis Hb.

**Ictella** HS. — 5, 6, überall in der Wiener Gegend, auch auf Alpen.

#### Schreckensteinia Hb.

**Festaliella** Hb. — 6, 7, Prater, Bisamberg, Mauer, selten.

### Cyphophora HS.

**Idaei** Z. — 6, 7, Schneeberger Alpen, Alpeleck, Lackerboden.

#### Laverna Curt.

**Conturbatella** Hb. — 6, 7, Schneeberger Alpen. Raupe auf *Epilobium angustifolium*, in jungen Herzblättern.

**Lacteella** Stph. — 5, 6, Gaisberg bei Rodaun, Giesshübel, 7, auf Alpen, sehr selten. Raupe auf *Epilobium*-Arten.

**Propinquella** Stt. — 7, auf der Heuplacke mehreremale gefangen.

**Decorella** Stph. — 6, in den Praterauen, auch auf dem Lackerboden und am Alpeleck.

**Subbistrigella** Hw. — 7, 8, Kaltentgeben, Aninger, Schneeberger Alpen.

**Fulvescens** Hw. (*Epilobiella* Schrk.) — 7, an Gräben, Bächen, Waldrändern. Raupe in den zusammengesponnenen Herzblättern des *Epilobium hirsutum*.

**Ochraceella** Curt. — 7, auf dem Kuhschneeberg, Lackerboden, Brandstattwiese, sehr selten.

**Epilobiella** Roemer. (*Longiella* Hb.) — 5, 6, Mauer, Mödling, Baden auf Lehnen und an Waldrändern.

#### Ascalenia Wk.

**Vanella** Frey. — 6, im Prater an den Planken des Fasanggartens beim Lusthaus und in Stadlau. Raupe in Trieben von *Tamarix germanica*.

### Mompha HS.

**Rhamnietta** Z. — 6, Tivoli und Mauer in jungen Laubgebüschchen.

### Stagmatophora HS.

**Heydeniella** F. R. — 6, Mödling, Purkersdorf, dann Alpen, Gahns auf Heidekraut (in Steiermark häufig).

**Pomposella** Z. — 6, Mauer, Himelsswiese und bei der Schiessstätte um Gesträuch, sehr selten.

**Serratella** Tr. — 6, Wiener Gegend auf Berglehnen, sehr selten.

**Albiapicella** HS. — 5, überall in der Wiener Gegend auf Berglehnen

und auf den Alpen. Raupe in den Samen der *Globularia vulgaris*.

#### Pyroderces Z.

*Argyrogrammos* Z. — 6, im Prater auf den Hirschweiden. Raupe nach Herrn v. Hornig in Klettenköpfen.

#### Stathmopoda Stt.

*Pedella* L. — 7, 8, im Prater auf Erlen. Raupe in den Früchten von *Alnus*.

#### Heinemannia Wk.

*Festivella* Schiff. — 6, am Bisamberg im Gebüsch, sehr selten.

*Laspeyrella* Hb. — 6, 7, Mauer, Mödling und Baden in jungen Gebüschchen, selten.

#### Blastodacna Wk.

*Hellerella* Dup. — 6, Prater, Mauer, Dornbach auf Weissdorn und Obstbäumen. Raupe auf *Crataegus* und Obstbäumen in den Blütenknospen.

#### Tebenna HS.

*Miscella* Schiff. — 5—8, überall in der Wiener Gegend, auch auf den Alpen, in Remisen und auf Berglehnen.

*Stephensi* Stt. — 6, auf Hutweiden und an Waldrändern auf Disteln, auch an Eichenstämmen, selten.

*Raschkiella* Z. — 7, Schneeberg auf dem Gahns, Alpeleck und der Krumbachriese. Raupe auf *Epilobium angustifolium*, selten.

#### Chrysoclista Stt.

*Aurifrontella* Hb. — 5, Prater, Brigittenau, Tivoli, Mauer, auf Weissdornbäumen. Raupe auf *Crataegus* und *Acer* im Mark der Zweige.

*Bimaculella* Hw. — 5, 6, Prater, Brigittenau an Weidenstämmen: Raupe wohl auf *Salix* in der Borke?

*Linneella* Cl. — 7, Klosterneuburg, Hetzendorf, an Lindenstämmen. Raupe in der Borke von *Tilia*.

#### Psacaphora HS.

*Schranckella* Hb. — 6, 7, Schneeberger Alpen, Saugraben, Alpeleck, Lackerboden, selten.

#### Aechmia Stt.

*Dentella* Z. — 6, Rodaunerberg, Mauer auf Gräsern. Raupe auf *Angelica sylvestris*.

#### Douglasidae.

#### Tinagma Z.

*Perdicellum* Z. — 5, 6, Wiener Gegend in lichten Wäldchen auf Erdbeerblüthen, Gahns, Lackerboden. Raupe auf *Fragaria vesca* an den Blüten.

#### Douglasia Stt.

*Balteolella* F. R. — 5, Rodauner Berg, auch bei Baden.

*Herrichiella* HS. — 5, 6, Laaerberg in Remisen.

*Transversella* Z. — 5, Rodaun, Mödling auf Berglehnen und Wiesen.

*Ocnorostomella* Stt. — 6, bei Gumpoldskirchen um *Echium vulgare*. Raupe an *Lonicera Xylosteum* in Blasenminnen.

#### Heydenia Hofm.

*Fulviguttella* Z. — 6, Schneeberger Alpen, Saugraben und Brandstattwiese um *Epilobium*.

#### Metriotes HS.

*Modestella* Dup. — 5, bei Tivoli, überhaupt in der Wiener Gegend an den Blüten von *Stellaria Holostea*. Raupe in den Samenkapseln von *Stellaria Holostea*.

#### Augasma HS.

*Aeratellum* Z. 1839. — 6, Bisamberg, Mödling, Baden auf Berglehnen und an Waldrändern, selten. Raupe in aufgetriebenen Stengeln von *Polygonum aviculare*.

#### Butalidae.

#### Butalis Tr.

*Obscurella* Sc. — 7, 8, Schneeberger Alpen, Alpeleck, Lackerboden auf *Epilobium*. Raupe auf *Epilobium angustifolium*.

*Productella* Z. — 7, Gahns, Bodenwiese, Lackerboden, Saugraben am

Schneeberge um *Epilobium*. Raupe ebenfalls auf *Epilobium*.

**Seliniella Z.** — 5, 6, überall in Oesterreich auf Wiesen, Berglehnen und Alpen.

**Subseliniella Hein.** — 6, Moosbrunn auf den Torfwiesen. (Ob gute Species? bezweifle ich.)

**Fallacella Schl.** — 7, 8, Schneeberg, Heuplacke und Saugraben, auch auf der Bodenwiese. Raupe auf *Helianthemum vulgare*.

**Flaviventrella HS.** — 6, Mödling, Brühl auf *Centaurea*-Blüthen, sehr selten.

**Paulella HS.** — 6, Saugraben auf Steingerölle. (Aufgefunden bei Reichstadt in Böhmen, Kamnitzberg 1830.)

**Parvella HS. Z.** — 5, Bisamberg, auf Berglehnen.

**Laminella HS.** — 5, 6, Mauer bis Baden auf Berglehnen, Bisamberg, Emmerberg (neue Welt).

**Cuspidella Schiff.** — 6, 7, Mauer, Richardshof auf pflanzenreichen Berglehnen und in Remisen.

**Leucogaster Mn.** — 7, Schneeberg im Saugraben.

**Restigerella Z.** — 6—8, von Mauer bis Gloggnitz verbreitet, auf trockenen Berglehnen. Raupe auf *Helianthemum vulgare*, von Herrn v. Hornig gezogen.

**Chenopodiella Hb.** — 6—9, in Wien, Prater an Zäunen und Gartenmauern. Raupe auf *Chenopodium* und *Atriplex* in zusammengezogenen Blättern.

**Noricella Z.** — 8, am Schneeberg in Holzschlägen.

**Dissimilella HS.** — 7, Alpeleck am Schneeberge auf Himbeeren, sehr selten. Raupe wohl auf *Epilobium*?

**Inspersella Hb.** — 7, auf den Schneeberger Alpen auf *Epilobium*. Raupe auf *Epilobium angustifolium*.

**Siccella Z.** 1839. — 5, Bisamberg, bei der Pyramide, sehr selten.

**Cicadella Z.** — 5, Brühl auf Berglehnen auf Distelblüthen, sehr selten.

**Endrosis Hb.**

**Lacteella Schiff.** — Das ganze Jahr hindurch überall in Oesterreich in Mehlkammern. Raupe in Mehl, Abfällen und getrockneten Früchten.

**Pancalia Curt.**

**Latreillella Curt.** — 5, 8, überall auf trockenen Wiesen und Berglehnen.

**Leuwenhoekella L.** — 5, 8, auf trockenen Wiesen und Berglehnen. Raupe auf *Thymus*.

## Elachistidae.

### Scirtopoda Wk.

**Saltatricella F. R.** — 4, 5, Tivoli- und Laaerbergremisen auf *Ulmus* und jungen *Quercus*.

### Elachista Stt.

**Cingillella HS.** — 6, Tivoli, Laaerberg, Mauer, Prater in Gebüsch.

**Megerlella St.** — 6, Mauer, Himelwiese am Waldsaume in Hecken, Gahns, Lackerboden. Raupe auf *Brachypodium sylvaticum*.

**Cinctella Z.** — 7, Schneeberger Alpen und Wiener Gegend um junge Gebüsch und Gräser. Raupe in *Sesleria coerulea* und *Carex acuta*.

**Adscitella Stt.** — 6, in der ehemaligen Brigittaa in Wien an Zaunplanken.

**Revinctella Z.** — 5, 6, Prater und Tivoli auf jungen Gebüsch; Hochschwab und Schneeberg.

**Taeniatella Stt.** — 5, 6, Tivoli in den Remisen auf Gesträuch, selten.

**Chrysodesmella Z.** — 6, Taborau, Prater, Rodaun, Giesshübel in Gebüsch und an Zaunplanken. Raupe in *Carex montana*.

**Gangabella Z.** — 5, 6, Mauer, Mödling und auf dem Gahns um Hecken, auch um Kiefern.

(Fortsetzung folgt.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Mann Josef Johann

Artikel/Article: [Beiträge zur Kenntniss der Microlepidopteren-Fauna der Erzherzogthümer Oesterreich ob und unter der Enns und Salzburgs. 12. Fortsetzung. 233-236](#)