

Beiträge zur Kenntniss der Microlepidopteren-Fauna der Erzherzogthümer Oesterreich ob und unter der Enns und Salzburgs.

Von Josef Mann in Wien.

(13. Fortsetzung und Schluss.)

Zonariella Tgstr. — 6, im Prater an Zäunen, bei Mauer auf grasreichen Stellen.

Cerusea Hb. — 5, in den Prateranen an feuchten Gräben.

Pollinariella Z. — 5, 6, überall um Wien auf Hutweiden, Berglehnen.

Collitella Dup. — 5, 6, auf Berglehnen von Tivoli bis Baden, nicht selten.

Disertella HS. — 5, 6, Tivoli, Laaerberg-Remisen, Rodauner Gaisberg, Abends auf Pflanzen und Gräsern.

Rudectella Stt. — 5, 6, Bisamberg, Tivoli, Laaerberg, in Remisen und auf Berglehnen.

Squamosella HS. — 5, Tivoli, Laaerberg-Remisen, Mauer, Rodaun auf Berglehnen.

Anserinella Z. — 5, 6, Remisen bei Tivoli, am Laaerberg, Bisamberg, Tulner Boden, bei Mauer, auf pflanzenreichen Stellen.

Dispilella Z. — 5, 6, Rodauner Gaisberg, Mauer in Remisen, im Prater auf Wiesen.

Dispunctella Dup. — 5, Laaerberg, Tivoli-Remisen, Mauer und Mödling.

Nitidulella HS. — 5, 6, im Prater auf Wiesen, Mödling auf Berglehnen. Raupe in *Artemisia*.

Argentella Cl. — 6, überall in Oesterreich auf Wiesen.

Pollutella HS. — 4, Prater und bei Tivoli, Laaerberg-Remisen.

Festucicolella Z. — 6, auf dem Kalvarienberge bei Gumpoldskirchen.

Immotatella Z. — 7, Schneeberger Alpen, Alpeleck, um *Sorbus* schwärmend; (kommt auch in Südtirol bei Schluderbach vor). Raupe wohl an *Sorbus*?

Subocellea Stph. — 6, Kaltenleutgeben auf den Wiesen.

Utonella Frey. (*Albidella* Tgstr.) — 6, Moosbrunn auf Torfwiesen. Raupe in *Eriophorum angustifolium* und *Scirpus caespitosus*.

Bifasciella Tr. — 7, Sonnwendstein auf Waldwiesen.

Pullicomella Z. — 6, im Prater und in der Mödlinger Gegend, auf Wiesen und Berglehnen.

Extensella Stt. — 6, Mödling und Eichkogel auf Berglehnen um Schlehensträucher.

Bedelletta Sircom. — 6, Prater an Wassergräben.

Arundinella Z. — 6, Prater am Heustadelwasser, auf Binsen.

Griseella Z. — 5, Tivoli, Laaerberg-Remisen, dann auf den Berglehnen von Mauer bis Baden.

Incanella HS. — 5, Mödling, Tivoli, Prater auf trockenen Wiesen und Berglehnen. Raupe auf *Artemisia campestris*.

Humilis Z. — 6, 7, Schneeberg auf der Bodenwiese um *Urtica*.

Poae Stt. — 5, Mauer auf der Himmelswiese um Gebüsch, selten.

Atricomella Stt. — 7, Richardshof, auf einer Waldwiese ans Gebüsch gescheucht.

Luticomella Z. — 7, 8, auf den Schneeberger Alpen, Alpeleck, Brandstattwiese um *Epilobium*.

Abbreviatella Stt. — 7, auf dem Schneeberg und den Semmering-Alpen in Holzschlägen um *Epilobium*. Raupe an *Festuca* in Minen.

Holdenella Stt. — 6, Kaltenleutgeben auf Bergwiesen an Waldrändern

um Buchengebüsch, selten. Raupe in *Aira caespitosa*; von Herrn Wocke gezogen.

Albifrontella Hb. — 5, 6, Taborau, Prater, Dornbach, Neusteinhof in grasreichen feuchten Gräben und auf Alpen.

Perplexella Stt. — 6, Mauer und Eichkogel auf Berglehnen.

Nobilella Z. — 6, in Tannen- und Kieferwäldern, am Richardshof, Marchfeld auf Gräsern.

Gleichenella F. — 6, bei Tivoli in den Remisen.

Magnificella Tgstr. — 5, 6, Tivoli in den Remisen auf jungen Eschen.

Trapeziella Stt. — 6, bei Tivoli in Remisen, nur einmal gefangen.

Quadrella Hb. — 5, Tivoli und Laaerberg-Remisen, auf unbelaubten Rosenhecken.

Stephensia Stt.

Brunnichella L. — 6, bei Tivoli und Mauer in jungen Gebüschchen.

Poeciloptilia HS.

Nigrella Hw. — 5, überall auf Hutweiden, Wiesen und Berglehnen, auf Gräsern.

Pullella HS. 946 (Aridella Hein). — 5, Prater, Tivoli, Mauer, auf Sträuchern. Raupe in *Poa*-Arten.

Incertella Frey. — 6, Mauer und Mödling auf Berglehnen, auf Gräsern sitzend.

Heliozelidae.

Antispila Hb.

Pfeifferella Hb. — 5, Tivoli, Laaerberg-Remisen, Mauer, Himmelswiese, um *Cornus*-Gestrüch schwärmend.

Treitschkiella F. R. — 6, überall um *Cornus sanguinea* schwärmend. Raupe in den Blättern von *Cornus*.

Heliozela HS.

Sericella Hw. — 5, Tivoli, Mauer, Mödling, um Eichengebüsch schwärmend.

Stannella F. R. — 6, Tivoli, auf Eichen, früher sehr selten, jetzt bei Mauer häufiger.

Heliodinidae.

Heliodines Stt. (Chrysesthia HS.)

Roesella L. — 6, 7, auf *Chenopodium* an Gartenzäunen und auf Spinat in Gärten. Raupe an *Atriplex*, *Chenopodium*, *Spinacia*, in zusammengesponnenen Blättern.

Cosmopterygidae.

Cosmopterya H.

Lienigiella Z. — 6, im Prater um Erlengebüsch und auf *Parietaria*, sehr selten.

Scribaella Z. — 6, in der ehemaligen Brigittenau bei Wien und im Prater auf Hopfen. Raupe an *Humulus Lupulus*.

Eximia Hw. (Drurella H. S. 999.) — 6, im Prater an Zäunen, auf Disteln und Hopfen. Raupe an *Carduus* und *Humulus Lupulus*.

Druryella Z. Frey 258. — 5, Taborau, Prater, unter Weiden, auf *Parietaria*, sehr selten. Raupe in den Blättern von *Festuca arundinacea*.

Batrachedra Stt.

Praeangusta Hw. (Turdipennella Fr.) — 6—9, überall in Oesterreich an Pappelstämmen, gemein.

Pinicolella Dup. — 5, 6, Mauer und Mödling auf jungen Kiefern. Raupe minirt die Nadeln von *Pinus Abies*, *sylvestris* und *Mughus*.

Lithocolletidae.

Lithocolletis Z.

Roboris Z. — 4, 5, 8, Tivoli, in der ganzen Umgebung von Wien auf *Quercus*. Raupe auf Eichen.

Amyotella Dup. — 5, 6, Prater, an Zäunen und Eichenstämmen. Raupe auf *Quercus*.

Hortella F. — 5, 6, Laaerberg, Tivoli-Remisen in Eichen- und Ahorn-

gebüsch. Raupe auf *Quercus* und *Acer*.

Sylvella Hw. — 4, 5, in der Wiener Gegend in Laubholzgebüsch. Raupe auf *Acer*.

Acerifoliella Z. — 5, Prater, am ehemaligen Thiergartenzaun gefangen, sehr selten; ist nicht mit *Sylvella* zu verwechseln. (Bei Reichstadt in Böhmen fand ich sie 1832 auf *Acer*.)

Helianthemella HS. — 5, Mödling, um Laubgebüsch an Berglehen, selten.

Abrasella Z. — 4, 5, Tivoli, Laaerberg, Prater, Mauer etc., in Eichengebüsch. Raupe auf *Quercus*.

Cramerella F. — 5, in der Wiener Gegend, in Laubgebüsch, besonders auf *Carpinus*. Raupe auf *Fagus*, *Quercus*, *Acer* etc.

Tenella Z. — 5—7, überall in der Wiener Gegend, ebenfalls in Laubgebüsch. Raupe auf *Populus*, *Acer* und *Quercus*.

Heegeriella Z. — 5—7, Tivoli, Laaerberg-Remisen, auch in Alpenthälern auf Laubgebüsch. Raupe auf *Quercus*, *Acer* und *Fagus*.

Alniella Z. — 5, 6, im Prater an Erlenstämmen. Raupe auf *Alnus*.

Strigulatella Z. — 5, 6, Schönbrunn, Halterthal, Anninger, um junge Buchen schwärmend. Raupe auf *Fagus* und *Carpinus*.

Lautella Z. — 5, 6, am Laaerberg und bei Tivoli, in den Remisen, selten. Raupe auf *Quercus*.

Bremiella Frey. — 5, Eichkogel, um Hecken gefangen, selten.

Insignitella Z. — 5, 6, Tivoli-Remisen, auf *Fraxinus* gefangen, selten.

Ulmifoliella Hb. — 5, 6, Prater, Bisamberg, Anninger etc., um *Ulmus* und *Fagus*. Raupe auf *Ulmus*.

Spinolella Dup. — 5, 7, auf Schlehenhecken und *Salix Caprea* in der Wiener Gegend.

Fraxinella Z. — 5, 6, Tivoli-Remisen, auf *Fraxinus*, selten.

Cavella Z. — 5, am Laaerberg, Eichkogel, auf jungen Buchen und *Acer*.

Viminetorum Stt. — 5, Prater, in Weidengebüsch. Raupe auf *Salix viminalis*.

Salicicolella Sirc. — 5, Prater und Kalksburg auf *Salix*.

Salictella Z. — 5, 6, im Prater und der ehemaligen Brigittenau, an Weidenstämmen und Zaunplanken. Raupe auf *Salix*.

Dubitella HS. — 5, 6, im Prater, in Weidling-am-Bach und am Buchberg um Weidengebüsch. Raupe auf *Salix*.

Mannii Z. — 5, 8, bei Tivoli und in den Laaerberg-Remisen auf *Quercus*. Raupe auf *Quercus*.

Pomifoliella Z. — 6, auf Obstbäumen und *Crataegus*. Raupe, oft häufig, auf *Pyrus Malus*.

Sorbi Frey. — 6, bei Perchtoldsdorf und auf den Schneeberger Alpen, auf *Sorbus*.

Cydoniella Frey. — 5, Bisamberg, um *Cornus mascula* und *Cydonia vulgaris* schwärmend, selten.

Cerasicolella HS. — 5, 6, Mödling, Kaltenleutgeben, auf wilden Weichseln. Raupe auf *Prunus avium*.

Mahalebella Mühl. — 5, im Prater, in der Brühl auf *Prunus Padus*. Raupe an *Prunus*, selten.

Spinicolella Stt. — 5, 8, Tivoli, Mauer, Mödling, Heiligenkreuz, etc. auf Schlehen- und anderen Gebüsch.

Padella Glitz. — 5, Mödling, Brühl, Weichthal etc. auf *Prunus Padus*.

Oxyacanthae Frey. — 5, 6, um Weissdornbäume im Prater.

Faginella Z. — 5, Holländerdörfel, Richardshof, Anninger, auf Rothbuchen. Raupe auf *Fagus*.

Coryli Nicelli. — 5, 6, Rodaun, Gaisberg, Kaltenleutgeben, um *Corylus*-Sträucher, selten.

Carpinicolella Stt. — 6, 7, Schneeberger Alpen, Alpeleck, um Gesträuch, selten.

Illicifoliella Z. — 5, 8, Tivoli-Remisen, Laaerberg und Mauer in jungen Eichenwäldchen. Raupe auf *Quercus*.

Distentella Z. — 5, Laaerberg und Bisamberg um Eichen- und Ahorngebüsch, selten. Raupe auf *Quercus*.

Lan'anella Schrk. — 5, Laaerberg, in den Remisen, selten.

Junoniella Z. — 6, Gahns, auf der Bodenwiese.

Scitulella Z. — 5, Laaerberger Remisen auf *Quercus*.

Quercifoliella Z. — 4–8, überall auf *Quercus*, worauf auch die Raupe lebt.

Delitella Z. — 4, 5, Laaerberger und Tivoli-Remisen auf Eichengebüsch. Raupe auf *Quercus*.

Quinquenotella Frey. — 5, Tivoli und Schönbrunn, auf Eichen- und Eschengebüsch, selten.

Scopariella Z. — 5, Prater, Liechtenstein, Richardshof, auf Sträuchern, selten.

Connexella Z. — 5, Laaerberg und Prater um Laubgebüsch.

Viminella Stt. — 5, Prater, Kalksburg auf *Salix*.

Betulae Z. — 5, Weidling-am-Bach und Sievering in Birkengebüschen. Raupe auf *Betula*.

Nicellii Stt. — 6, am Rodanner Gaisberg und am Bisamberg, auf *Corylus*-Sträuchern, selten.

Froelichiella Z. — 4, 5, im Prater, auf *Alnus* und *Crataegus*. Raupe minirt in *Alnus*-Blättern.

Stettinensis Nicelli. — 5, im Prater auf *Alnus*, selten.

Kleemannella F. — 5, 6, 8, auf *Alnus* und *Crataegus*. Raupe in *Crataegus*-Blättern.

Schreberella F. — 5, u. 8, überall in Ulmengebüsch. Raupe in *Ulmus*-Blättern minirend.

Emberizaepennella Bouché. — 5, 8, in *Lonicera*-Hecken. Raupe in den Blättern von *Lonicera*.

Tristrigella Hw. — 7, in Gärten und im Prater, um Ulmengebüsch, selten.

Scabiosella Dgl. — 5, Mauer und Mödling auf Bergelehnen auf *Scabiosa*.

Trifasciella Hw. — (*Heydenii Z.*) 5, 6, Mauer, Mödling und Bisamberg, um *Lonicera*-Hecken, sehr selten.

Acaciella Z. — 9, im Prater und auf der Siebenbrunnerwiese, sehr selten.

Agilella Z. — 9, im Prater, auf *Ulmus*. Raupe in *Ulmus*-Blättern, selten.

Pastorella Z. — 10, im Prater, auf *Ulmus*, *Salix* und an Zaunplanken.

Populifoliella Tr. — 4 u. 8, im Prater, an Pappelstämmen. Raupe in *Populus*-Blättern.

Tremulae Z. — 4, 8, im Prater und in Weidling-am-Bach an Pappelstämmen, besonders auf *Populus tremula*, deren Blätter die Raupe minirt.

Comparella Z. — 4, 5, 8, Prater, an Baumstämmen und Zaunplanken, häufig.

Tischeria Z.

Complanella Hüb. — 5, 6, überall um Wien in Eichengebüschen. Raupe in *Quercus*-Blättern.

Dodonaea Stt. — 6, Tivoli-Remisen auf *Quercus*, selten.

Marginea Hw. — 5, im Prater, bei Tivoli, Mauer bis Baden, auf Brombeeren. Raupe minirt in Blättern von *Rubus fruticosus* selten.

Gaunacella Dup. — 5, 8, überall in der Wiener Gegend auf Schlehen. Raupe in Blättern v. *Prunus spinosa*.

Angusticollella Z. — 5, 6, in der Wiener Gegend auf Alpen an Schlehen. Raupe in Blättern von *Rosa* und *Prunus spinosa* minirend.

Lyonetidae.

Lyonetia Hb.

Clerkella L. — 5, 6, in der Wiener Gegend in Obstgärten. Raupe minirt

in den Blättern von *Prunus avium* und *Pyrus Malus*, in manchen Gegenden häufig. Puppe in seidenartigem Cocon.

var. Aeerella Tr. — Vorkommen wie von *Clerkella*.

Ledi Wk. — 6, Mauer und Rodann, einzeln.

Prunifoliella Hb. — 4, 5, Mauer und Bisamberg, auf *Prunus Padus*, selten. Raupe minirt die Blätter.

v. Padifoliella Hb. — 7, im Prater und bei Tivoli, auf Sträuchern gefangen.

Pulverulentella Z. — 6, in den Remisen bei Tivoli, auf *Fraxinus* gefangen.

Phyllocnistidae.

Phyllocnistis Z.

Suffusella Z. — 5, 6, im Prater und bei Kalksburg auf *Salix* und *Populus*, in deren Blättern die Raupe minirt.

Saligna Z. — 4, 5, überall in Weidengebüschchen. Raupe an glattblättrigen *Salix*-Arten.

Cemiostoma Z.

Spartifoliella Hb. — 5, 8, überall in der Wiener Gegend in Gärten auf *Cytisus Laburnum*.

Laburnella Stt. — 5, 6, überall in der Wiener Gegend auf *Cytisus*-Sträuchern. Raupe in den Blättern von *Cytisus Laburnum*, in weisslicher Mine.

Susinella HS. — 6, im Prater auf jungen Pappeln.

Scitella Z. — 5, 8, um Wien in Gärten auf Aepfelbäumen, selten. Raupe in Blättern von *Pyrus Malus*, *P. communis* und verschiedenen anderen Laubbölzern.

Lustratella HS. — 5, Tivoli-Remisen, einige Male um *Fraxinus* gefangen, selten.

Bucculatrix Z.

Thoracella Thnbg. — 5, im Augarten und Prater, an *Tilia*-, *Aesculus*-Stämmen und Zaunplanken.

Cidarella Z. — 6, im Prater in Erlengebüschchen an den Stämmen. Raupe auf *Alnus*.

Ulmella Z. — 5, 8, im Prater auf Ulmen und Zaunplanken. Raupe auf *Ulmus*. Cocon gerippt.

Vetustella Stt. — 6, Prater, Schönbrunn etc., an *Acer*-Stämmen, selten.

Crataegi Z. — 5, 8, überall um Wien auf Weissdorn. Raupe auf *Crataegus*-Blättern, gemein.

Maritima Stt. — 6, einmal bei Tivoli um *Fraxinus* gefangen, selten.

Boyerella Dup. — 5, 6, 9, überall in Ulmengebüschchen. Raupe auf *Ulmus*.

Frangulella Goeze. — 6, im Prater, in Mauer, am Bisamberg etc., um *Rhamnus*-Gebüschchen. Raupe auf *Rhamnus Frangula*.

Artemisiae HS. — 5, 6, Mödling, Baden, auf Berglehnen, auf *Artemisia campestris*, nahe den Wurzelblättern sitzend. Raupe auf *Artemisia campestris*.

Absynthii Gart. — 5, in Mödling, am Eichkogel, in Baden, am Bisamberg etc., an Berglehnen, auf *Artemisia Absinthium*.

Gnaphaliella Tr. — 5, Mödling, auf Berglehnen, an niederen Pflanzen.

Nigricomella Z. — 5, Taborau, Prater, an Zaunplanken; Tivoli, Mauer, an Waldrändern, auf Gräsern.

Aurimaculella Stt. — 6, Prater, Liesing und Rodaun an Bächen, auf *Mentha* gefangen, selten.

Cristatella Z. — 5, Prater, Tivoli, Mödling, Baden, Emmerberg, auf Berglehnen, auf niederen Pflanzen.

Imitatella HS. — 6, Tivoli-Remisen, Mödling, auf Berglehnen, selten.

Nepticulidae.

Opostega Z.

Salaciella Tr. — 5, 6, Praterauen, Hütteldorf, Höllenthal, in sumpfigen Gräben, Wiesen und an Waldrändern; kommt spät Abends zum Vorschein.

Auritella Hb. — 6, in der ehemaligen Brigittenau, in den Heustadelwasser-Auen des Praters an Wassergräben.

Crepusculella Z. — 5, Prater, Neusteinhof, auf feuchten Wiesen und an Gräben; 6, im Höllenthal.

Trifurcula Z.

Pallidella Z. — 5, bei Tivoli, Laaerberger Remisen, Mauer, Rodaun, auf pflanzenreichen Wiesen und Berglehnen.

Immundella Z. — 6, bei Tivoli und im Prater, auf trockenen Wiesen, selten. Fliegt spät Abends.

Atrifrontella Stt. — 5, in den Remisen am Laaerberg des Abends auf Gras gefangen, selten.

Nepticula Z.

Pomella Vaughan. — 5, Wien in Obstgärten, selten.

Aeneella Hein. — 5, 6, Mauer, Kalksburg, auf *Pyrus Malus* gefangen.

Ruficapitella Hw. — 5, Tivoli-Remisen auf jungen Eichen. Raupe minirt in den Blättern von *Quercus*.

Samiatella HS. — 5, Tivoli und Laaerberger Remisen, auf Ahorn- und Eichengebüsch.

Atricapitella Hw. — Wie vorige Art.

Basiquttella Hein. — 5, in den Tivoli-Remisen auf Eichengebüsch.

Anomalella Goeze. — 5, Tivoli und Laaerberger Remisen auf wilden Rosensträuchern. Raupe minirt in den Blättern von *Rosa*.

Aucupariae Frey. — 5, Perchtoldsdorf auf *Fraxinus* und *Sorbus Aucuparia*, selten.

Sanguisorbae Wk. — 5, 6, in den Remisen bei Tivoli.

Oxyacanthella Stt. — 5, 6, im Prater an *Crataegus* und Zaunplanken. Raupe in den Blättern von *Crataegus*.

Pretiosa Hein. — 4, 5, Prater, in Gebüsch an Baumstämmen, selten.

Aneofasciella HS. — 5, Tivoli auf jungen Eichen gefangen.

Splendidissima HS. — 5, Prater auf Brombeersträuchern. Raupe auf *Rubus fruticosus*.

Gratiocella Stt. — 5, 6, Prater, auf Weissdorn und Ulmenstämmen, in Rindenritzen.

Marginicolella Stt. — 4, 5, im Prater an Zaunplanken und Ulmenstämmen.

Centifoliella Z. — 5, in Gärten und bei Tivoli, auf Garten- und wilden Rosen. Raupe minirt in den Blättern von *Rosa*.

Microtheriella Stt. — 5, Bisamberg, Rodaun, Gaisberg, um *Corylus*-Sträucher gefangen.

Hübnerella HS. — 5, Tivoli in den Remisen, auf *Fraxinus*, sehr selten.

Dimidiatella HS. — 5, Tivoli-Remisen, auf *Fraxinus*.

Hermargyrella Z. — 5, Eichkogel, Richardshof, Weidling-am-Bach, auf jungen Buchen.

Argentipedella Z. — 5, 6, Weidling-am-Bach, Sievering, Mauer, auf jungen Birken.

Malella Stt. — 5, in der Wiener Gegend auf *Pyrus Malus*.

Agrimoniella HS. — 5, im Prater, auf *Acer* und *Ulmus* in den Rinderissen.

Rubivora Woke. — 5, 6, Taborau, Brigittenau und im Prater auf *Rubus fruticosus*.

Weaweri Stt. — 6, Gahns, Bodenwiese. Raupe auf *Vaccinium Vitis idaea*.

Sericopeza Z. — 5, 8, im Prater, an *Acer*, *Ulmus*, *Populus* und an Zaunplanken.

Decentella HS. — 5, im Prater an *Platanus*, selten.

Trimaculella Hw. — 5, 8, Taborau und Praterauen, an Zaunplanken und auf *Populus*.

Turbidella Z. — 5, 8, 9, häufig im Prater an Baumstämmen in den Rindenritzen.

Subbimaculella Hw. — 5, Tivoli, in den Remisen, auf *Quercus*.

Argyropeza Z. — 5, 8, im Prater, an *Populus*, häufig.

Micropterygina.

Eriocephala Cart.

Calthella L. — 4, 5, im Prater und in der ganzen Wiener Gegend auf Sumpfwiesen.

Aruncella Sc. — 5, im Prater, in Rodaun, Kaltenleutgeben, auf feuchten Wiesen, auf Binsen.

Rothenbachii Frey. — 5, Kaltenleutgeben, um *Fagus*; 6, auf der Gahns um *Abies pectinata* schwärmend.

Anderschella HS. — 5, bei der Waldmühle, in Kaltenleutgeben, am Anninger, auf *Fagus*.

Aureatella Sc. — 5, Mauer, Kaltenleutgeben, um *Abies pectinata* und *Fagus* schwärmend, selten.

Thunbergella F. — 5, 6, in der Wiener Gegend auf *Fagus*.

Sparmannella Bosc. — 5, 6, Weidling-am-Bach, in Birkenwäldchen, selten.

Fastuosella Z. — 4, 5, in Mauer und am Bisamberg auf *Quercus*, *Fagus* und *Corylus*.

Unimaculella Zett. — 5, Mauer, Kalksburg, auf blühender *Salix*, selten.

Chrysolepidella Z. — 4, 5, bei Mariabrunn, an Waldrändern, auf *Fagus* und *Quercus*.

Semipurpurella Sthp. — 4, 5, in Sievering, Weidling-am-Bach, am Eichkogel und Anninger auf *Betula*, *Fagus* und *Salix*.

Pterophorina.

Agdistis Hb.

Adactyla Hb. — 6, einmal auf der Türkenschanze einige Stücke gefangen.

Cnaemidophorus Wallgr.

Rhododactylus F. — 6, 7, überall in der Wiener Gegend, auch auf den Alpen, auf Garten- und wilden Rosen. Raupe in den Blütenknospen von *Rosa*.

Platyptilia Hb.

Ochrodactyla Hb. — 6, im Prater, in Dornbach, in der Brühl, aus Hecken gescheucht.

Gonodactyla Schiff. — 6, 7, auf Alpen am Schneeberg, in Gräben und Holzschlägen. Raupe in den Blütenstengeln von *Tussilago*.

Zetterstedtii Z. — 6, 7, im Prater, in Liesing, Rodaun, am Eichkogel, auf feuchten, lehmigen Stellen, an Bächen.

Nemoralis Z. — 8, Scheeberger Alpen, Alpeleck, Lackerboden und im Saugraben. Raupe in den Stengeln von *Senecio nemorensis*.

Tesseradactyla L. — 5, 6, Mauer, Mödling und am Gahns auf der Bodenwiese.

Amblyptilia Hb.

Acanthodactyla Hb. — 5, 6, in den Praterauen, in den Remisen bei Tivoli und in Mauer etc. Raupe an den Blüten von *Geranium*- und *Salvia*-Arten.

Cosmodactyla Hb. — 5, 9, Remisen bei Tivoli, am Laaerberg, Bisamberg, im Prater.

Oxyptilus Z.

Tristis Z. — 5, Mauer, Mödling bis Baden, auf Berglehnen.

Pilosellae Z. — 5, 6, überall in der Wiener Gegend an Berglehnen auf pflanzenreichen Stellen.

Hieracii Z. — 5, 6, überall in Remisen und an Berglehnen zwischen jungem Gebüsch. Raupe in den Herztrieben von *Hieracium umbellatum*.

Ericetorum Z. — 6, Mauer bei der Schiessstätte, auf Haidekraut, selten. Raupe nach Zeller an *Hieracium Pilosella*.

Didactylus L. — 6, in der Brühl und bei Giesshübel auf grasreichen Lehnen an Waldrändern.

Parvidactylus Hw. — 5, 6, überall in der Wiener Gegend in Remisen, auf Berglehnen und Alpenwiesen.

Mimaeseoptilus Wallgr.

Phaeodactylus Hb. — Aus Oberösterreich zum Determiniren erhalten. (Bei Bozen nicht selten. 6, die Raupe bei Bozen an *Ononis* gefunden.)

Pelidnodactylus Stein. — 5, 6, nicht selten in den Remisen bei Tivoli, am Laaer- und Bisamberg etc. in grasreichen Gebüschchen.

Serotinus Z. — 5, 6, bei Mödling, auf Berglehnen, selten.

Zophodactylus Dup. — 8, 9, bei Tivoli, Mauer bis Baden, in Remisen und auf Berglehnen.

Coprodactylus Z. — 6, 7, Schneeberger Alpen, Gahns, Bodenwiese etc., nicht selten.

Plagiodactylus Stt. — 6, 7, Alpen, Gahns, Bodenwiese, im Saugraben, am Kuhschneeberg.

Graphodactylus Tr. — 6, 7, Schneeberger Alpen, Lackerboden, Heuplacke, hohe Wand, Semmering etc.

Pterodactylus L. — 7, 8, bei Tivoli in Remisen, im Prater, in Mödling auf Berglehnen und in Gebüschchen. Raupe (nach Frey) an *Scabiosa ochroleuca*.

Stigmatodactylus Z. — 5, 6—11, Mauer bis Baden, Neue Welt, nirgends selten.

Oedematophorus Wallgr.

Lithodactylus Tr. — 7, Mauer, Tivoli, Mödling, am Bisamberg etc., in Remisen, auf grasreichen Lehnen, in Gebüschchen. Raupe auf *Inula salicina* und *J. Oculus Christi*.

Pterophorus Wallgr.

Monodactylus L. — 4—11, überall in Oesterreich, gemein.

Leioptilus Wallgr.

Scarodactylus Hb. — 7, Schneeberger Alpen, Heuplacke, Lackerboden, Kuhschneeberg, in Holzschlägen.

Lienigianus Z. — 6, 7, Schneeberger Alpen, Lackerboden, Alpeleck, im Saugraben etc., auf pflanzenreichen Stellen.

Tephrodactylus Hb. — 7, Schneeberger Alpen, auch in Rodaun, selten.

Inulae Z. — 6, am Eichkogel, auf Berglehnen. Raupe von Zeller auf *Inula* gezogen.

Carphodactylus Hb. — 5, 6, Mauer bis Baden; 7, auf den Alpen, nicht selten.

Microdactylus Hb. — 5, in Mödling, am Bisamberg; 6, 7, auf den Schneeberger Alpen, selten.

Osteodactylus Z. — 6, 7, Schneeberger Alpen, am Lackerboden, im Saugraben, auf der Brandstattwiese. Raupe an *Gentiana*-Blüthen.

Brachydactylus Tr. — 5, in Giesshübel, Mödling, am Eichkogel, Semmering an Waldrändern.

Aciptilia Hb.

Galactodactyla Hb. — 6, im Prater in Gebüschchen, am Heustadelwasser, Abends auf *Arctium Lappa* fliegend, selten.

Xanthodactyla Tr. — 7, Mödlinger Gegend: am Liechtenstein, in der Brühl, beim Richardshof. Raupe niert in Blättern von *Lavatera*. Nach der letzten Häutung verlässt sie die Mine, worauf sie die Blätter frisst und sich auf der Unterseite eines Blattes in einem Gespinnste verpuppt.

Baliodactyla Z. — 6, 7, Schneeberger Alpen, Saugraben, Lackerboden, Höllenthal, Semmering, selten.

Tetradactyla L. — 5—9, überall in der Wiener Gegend, auch auf den Alpen, nicht selten.

Ischnodactyla Tr. — 6, einige Male in der Brühl gefangen, sehr selten.

Pentadactyla L. — 6—9, überall in Oesterreich. Raupe auf *Urtica dioica*, *Parietaria*, *Scabiosa* etc., gemein.

Paludum Z. — 6, bei Moosbrunn, auf den Torfwiesen, selten.

Alucitina.

Alucita Z.

Dodecadactyla Hb. — 6, am Liechtenstein, Abends auf *Lonicera* vorkommend.

Grammodactyla Z. — 5, 6, im Prater, in Mödling, Baden, am Bisam-

berg. Raupe auf *Scabiosa ochroleuca*; von Herrn v. Hornig gezogen.

Desmodactyla Z. — 5, am Liechtenstein, bei Mödling, am Richardshof, auf trockenen Berglehnen, zwischen jungen Gebüschchen.

Hexadactyla L. — 5, 8, Tivoli-, Laaer- und Bisamberger Remisen, von Mauer bis Baden, einzeln vorkommend.

Hübneri Wallgr. — 9, auf dem Liechtenstein und am Eichkogel, spät Abends fliegend, selten.

Coleopterologische Notizen.

Von Edm. Reitter in Mödling.

XIII. *)

80. Bei Durchsicht meines Corylophiden-Materials fanden sich 3 neue Arten vor, welche ich vorläufig kurz diagnosticire:

a) *Arthrolips Simoni* n. sp. Subovalis, fuscus, tenuissime fulvo-puberulus, prothorace, elytrorum vitta basin attingente indeterminata, limbo apicali, antennis pedibusque rufo-testaceis, prothorace transverso, semirobundato, fere laevi, coleopteris haud angustiore, elytris dense subtilissime punctulatis. Long. 0.8 mm. Syrien: Haifa; von meinem Freunde Hans Simon.

b) *Peltinus Matthewsii* n. sp. *P. velato* similis, sed minor, nitidissimus, vix alutaceus, dilutior, rufo-brunneus aut testaceus, elytris obsolete parce punctulatis. Long. 0.6 mm. Syrien: Haifa. Von Simon erhalten. Herrn A. Matthews, dem Monographen der Trichopterygidier gewidmet.

c) *Peltinus alutaceus* n. sp. *P. velato* similis, minus convexus, piceo-brunneus, distincte alutaceus, vix punctulatus, prothorace antrosum, antennis pedibusque piceo-testaceis. Long. 0.8 mm.

In den Sümpfen des Narentathales in Dalmatien. Ich habe diese Art bisher als *Peltinus velatus* versendet; der letztere ist aber gewölbter, dunkler schwarz, glänzender, am Grunde glatt und nur an der Basis der Flügeldecken etwas hautartig quer gestrichelt, endlich ist er deutlicher punkulirt.

81. *Cteniopus graecus* Heyden (Deutsch. Ent. Zeitsch. 1883, 312) wurde nur nach weiblichen gelben Exemplaren beschrieben.

*) XII. Siehe Wien. Ent. Zeit. 1885, pg. 228.

„Wiener Entomologische Zeitung“ IV. (30. October 1885). Heft 9

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Mann Josef Johann

Artikel/Article: [Beiträge zur Kenntniss der Microlepidopteren-Fauna der Erzherzogthümer Oesterreich ob und unter der Enns und Salzburgs. 13. Fortstzung. 265-273](#)