

Beiträge zur Kenntniss der Hemipteren-Fauna Böhmens.

Von Lad. Duda, k. k. Gymnasial-Professor in Königgrätz (Böhmen).

(15. Fortsetzung.)

Atractotomus Fieb.

A. femoralis Fieb. Aus Böhmen von Fieber beschrieben (Crit. sp. 16).

A. rufus Fieb. Wie der Vorige (Fieb. Crit. sp. 17), mir bisher auch nicht bekannt.

A. oculatus Kbm. Nach D. T. bei Königswart auf Brennnesseln, selten (7); von Fieber als *A. albipes* (Crit. sp. 18) beschrieben. (Lebt nach Prof. Dr. Reuter auf Tannen.)

A. magnicornis Fall. Bei Neuhaus auf Fichten und Lärchenbäumen selten (6).

A. parvulus Reut. Auf Fichten, bei Wartenberg (7) ziemlich häufig, bei Teplitz und Neuhaus (8) nur einzeln und fast immer mit *Ploearia vagabunda* L.; die Männchen sind sehr selten!

Criocoris Fieb.

C. crassicornis Hahn. An Waldrändern und Feldrainen, auf *Galium* (nach Fieber); auch bei Eger bei St. Anna gestreift, 7 (D. T.).

Plagiognathus Fieb.

P. chrysanthemi Wolff (= *viridulus* Fall.). Im Sommer überall auf Wiesen und Feldrainen, auf blühender *Achillea*, *Echium*, *Verbascum* und auf Kleefeldern gemein.

P. fulvipennis Kbm. Auf *Echium* und Disteln an Feldwegen und Schutthaufen, bisher nur um Sobieslau beobachtet (7, 8).

P. arbustorum Fab. Auf trockenen, unbebauten Orten auf allerlei Schuttpflanzen, besonders Nesseln, Senecionen, *Lappa* u. a. überall gemein (6—8).

P. albipennis Fall. Nur bei Sobieslau an einem Schutthaufen gestreift (8).

Agalliaestes Fieb.

A. pulicarius Fall. Auf trockenen Grasplätzen, unter verschiedenen niederen Pflanzen, überall ziemlich gemein (6—8).

A. pullus Reut. Mit dem Vorigen bei Neuhaus (6) nicht gemein.

A. saltitans Fall. An gleichen Orten, wohl überall verbreitet.

A. evanescens Boh. An Feldrainen und Dämmen, besonders unter *Sedum acre*, bisher wenig beobachtet; bei Eger und Königswart mehrmals gestreift, 6 (D. T.).

Campylomma Reut.

C. verbasci H.-Sch. Auf blühenden *Verbascum*-Arten überall verbreitet, bei Teplitz (8), auch von *Prunus spinosa* in Menge abgeklopft.

Sthenarus Fieb.

S. Roseri H.-Sch. Auf Weidengebüschen nicht gemein, in verschiedenen Farbvarietäten; Sobieslau, Wartenberg, Neuhaus, Prag (6—8).

B. Hydrocorisae.**XIV. Naucorides.****Naucoris Geoffroy.**

N. cimicoides Lin. In Teichen und Tümpeln, überall verbreitet, doch nicht gemein.

XV. Nepides.**Nepa Lin.**

N. cinerea Lin. In stehenden, schlammigen Gewässern überall gemein.

Ranatra Fab.

R. linearis Lin. Mit der vorigen Art, aber nur einzeln.

XVI. Notonectides.**Notonecta Lin.**

N. glauca Lin. Ueberall gemein.

N. lutea Müll. Bisher nur wenig beobachtet; ich habe sie aus Wittingau und Chodau (R. v. Stein).

Plea Leach.

P. minutissima Fab. In stehenden Gewässern, wohl überall verbreitet, aber hie und da selten; um Prag und an der Elbe ziemlich häufig.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1886

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Duda Ladislav

Artikel/Article: [Beiträge zur Kenntniss der Hemipteren-Fauna Böhmens. 15. Fortsetzung. 241-242](#)