

Coleopterologische Notizen.

Von Edm. Reitter in Mödling.

XXIV. *)

176. *Carabus errans* Gory var. *pedator* m. Der *Carabus errans* aus dem nördlichen Portugal tritt häufig in einer rothschenkeligen Form auf, wie sie bei den verwandten Arten: *Stewarti* Deyr. und *quadarramus* Laf. noch nicht beobachtet wurde. Gleichzeitig ist der Kopf und Halsschild blau, an den Seiten intensiver, und die Flügeldecken haben einen schmalen blauen Marginalrand. Ich schlage vor, diese Form mit *pedator* zu bezeichnen. Alle 3 erwähnte Arten sind spezifisch verschieden; der männliche Haftapparat ist in verschiedener Weise gebildet, darunter jener des *C. quadarramus* Laf. aus Central-Spanien besonders ausgezeichnet.

177. Herr Ormay Sandor war heuer so glücklich, den von ihm im Jahre 1885 in den Transsylvanischen Alpen in einem weiblichen Stücke entdeckten grossen, prächtigen *Batrissus Ormayi* m. (Deutsch. Ent. Zeitschr. 1885, pag. 365) in einigen Exemplaren wieder aufzufinden, den er im Jahre 1886 vergebens gesucht hat. Auch diesmal fand er das Thierchen im Lotriora-Thale, beim Rothenthurmpass, am 2., 3. und 4. April unter *Lasius flavus* Fbr. Ein Exemplar wurde auch im Thale Riu-Vadului, auf der wallachischen Seite des Gebirges, angetroffen. Das bisher unbekanntes ♂ weicht sehr wenig vom ♀ ab. An den ähnlichen Fühlern hat Glied 11 an der Basis immer ein Zapfenzähnchen, die Trochanteren der Mittelbeine zeigen an der Spitze nach unten ein dornartiges Zähnchen und die Mittelschienen sind innen gegen die Spitze etwas verbreitert, die Verbreitung ist vor der Spitze ausgerandet und mit gelben Haaren bewimpert.

178. *Trogoderma nobile* Rtrr. (Verh. Zool.-Bot. Gesellsch. Wien, 1880, pag. 85) aus Cypern und Attica, sandte mir Herr Dr. Martin von Biskra (Algier) unter dem Namen *T. trizonatum* Fairm.

179. *Stenosis fulvipes* Reitt. (non Reiche) habe ich in der Wien. Ent. Ztg. 1887, pag. 77, welche am 27. Februar ausgegeben wurde, in *St. dilutipes* umgetauft. Dieselbe Art

*) XXIII. Siehe Wien. Ent. Ztg. 1887, pag. 171.

wird von Marseul in seinem Catalogue des Coléoptères de l'ancien monde, pag. 311, welcher Theil Anfangs April 1887 zur Versendung gelangte, *Reitteri* Mars. genannt.

Note diptérologique.

Par J. M. F. Bigot.

Malgré la déférence, toute légitime, que m'inspire le profond savoir de Professeur J. Mik, j'ose penser et dire, qu'il se trompe dans la critique formulé par lui (Wiener Entom. Zeit. 1887, pag. 191), au sujet de l'Espèce nouvelle? qui j'ai décrite (Ann. Soc. Ent. France, 1887, pag. 22) sous le nom de *Stratiomys nigriceps* ♀, et voici pourquoi:

1. J'ai adopté, avec Meigen, Schiner et d'autres, le vocable générique, incorrect? de *Stratiomys* au lieu de *Stratiomyia*, en vertu du droit strict de priorité.

2. La longueur relative du premier segment antennal chez mon Insect m'empêche de l'identifier avec la *Stratiomys* (sic!) *Microleon* de Meigen et importe à l'attribuer plutôt au G. *Stratiomys* (alias *Stratiomyia*) qu'au genre *Odontomyia* (propr. dictu).

3. Ma description ne parlant aucunement de la petitesse de mon individu (Kleinheit der Fliege, sic!); la réflexion émise par le Professeur J. Mik à cet égard (dass H. Bigot keine *Stratiomyia* vor sich gehabt habe), est absolument dans d'apropos.

4. La disposition et la nature de la coloration des tibias, chez mon espèce, ne sont pas identiques à celles qu'attribue Schiner aux tibias de l'*Od. Microleon* (Linn.?) = *Stratiomys* id.? Meig.

5. Enfin, ce qu'il a cru devoir avancer au sujet de la coloration (entièrement d'un noir foncé, uniforme), chez mon specimen, n'est, en somme, qu'une pure supposition personnelle.

Quincy, 23 août 1887.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1887

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Bigot Jacques Marie Frangile

Artikel/Article: [Coleopterologische Notizen. XXIV. 214-215](#)