

Carabus (Limnocarabus) stygius n. sp.

Von L. Ganglbauer in Wien.

C. clathrato proximus, multo magis elongatus et depresso,
supra niger, vix virescens, elytris triseriatim cupreofoveolatis.
Capite pone oculos valde prominulos fortius constricto, inter oculos
utrinque longitudinaliter plicatulo, fronte antice laevi, postice
punctata, sulcis frontalibus longis et profundis, palpis filiformibus,
articulis ultimis apicem versus perparum dilatatis, antennis maris
simplicibus. Gula leviter convexa, utrinque seta instructa. Pro-
thorace transverso, postice haud angustato, lateribus reflexis, antice
leviter rotundatis, pone medium sinuatis, angulis posticis brevissimis,
extrorsum porrectis, postice truncatis, basi utrinque sinuata, disco
medio subtiliter punctato, ad latera subtilissime et sat dense granu-
loso, ante basin utrinque profunde longitudinaliter impresso. Elytris
elongatis, fere parallelis, antice fere truncatis, ante apicem sinuatis,
dense et subtiliter granulosis, intervallis primariis fossulis magnis,
antice granulo instructis, interruptis, intervallis secundariis parum
elevatis, subtiliter crenulatis, postice evanescentibus, intervallis
tertiariis in granula dissolutis, serie umbilicata distinctissima,
margine laterali antice serratulo. Episternis metathoracis latitudine
multo longioribus. Strigis ventralibus distinctis. Long. 30—33 mm.
Talysch.

Dem *C. clathratus* sehr nahe stehend und von demselben
durch viel flachere, gestrecktere Gestalt, längere und schlankere
Fühler, Taster und Beine, relativ kleineren Halsschild und
längere flachere Flügeldecken verschieden. Die Grübchen der
Flügeldecken sind viel kleiner als bei *clathratus*, viel weiter
von einander entfernt und durch deutliche Kettenelemente von
einander getrennt. Die Secundärrippen sind schwächer als bei
clathratus ausgebildet.

Diese Art wurde von Herrn Hans Leder im Talysch-
gebiete gesammelt und von Herrn E. Reitter als *C. cla-
thratus* var. *Eversmanni* versendet. *C. Eversmanni* Fald. i. l.,
Motsch. Ins. Sib. 109 ist aber nach Motschulsky's Angaben:
„N'est donc qu'une très légère variété du *C. clathratus* ordi-
naire et n'en diffère que par son corselet plus transverse. On
se rencontre fréquemment sur les bords du fleuve Ichym“ nicht
auf *stygius* zu beziehen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1890

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Ganglbauer Ludwig

Artikel/Article: [Carabus \(Limnocarabus\) stygius. 117](#)