

Zur Flora des Regierungsbezirks Bromberg.

Von Lehrer Holzfuß in Grabow a. d. Oder.

In den Jahren 1892, 1894 und 1898 habe ich die Hundtagsferien in Gr. Neudorf, Kreis Bromberg, verlebt. Soweit es die Witterung gestattete, habe ich das engere Gebiet¹⁾ dortselbst durchexcursiert. Einige weniger häufigere Pflanzen, sofern sie nicht zur Vervollständigung meines Herbars dienen, sende ich hiermit für das Posener botanische Museum.

Gleichzeitig gebe ich in nachstehendem ein Verzeichnis meiner Beobachtungen.

Thalictrum flavum. Wiesen bei Minutsdorf (Kr. Inowrazlaw).

Pulsatilla patens. Wald bei Gr.-Neudorf, nicht selten.

P. pratensis. Mit voriger.

P. patens + *pratensis*. Ebendasselbst.

Arabis hirsuta. Wiesen bei Johannisthal, häufig; adl. Brühlsdorf, Jesuiter-See (Kr. Inowrazlaw).

Lepidium rudemale. An der Chaussee in Gr.-Neudorf.

Helianthemum Chamaecistus. An einer Stelle an der Chaussee in Gr.-Neudorf.

Gypsophila fastigiata. Häufig im Walde bei Gr. Neudorf.

Tunica prolifera. Bahnhof bei Kreuz (Kr. Filehne).

Dianthus Carthusianorum. Wald bei Gr.-Neudorf.

D. deltoides. Minutsdorf (Kr. Inowrazlaw).

D. arenarius. Wald bei Kl.-Neudorf.

D. Carthusianorum + *arenarius**. Bei Kl.-Neudorf.

Saponaria officinalis. Gr.-Neudorf und Johannisthal.

¹⁾ Dieses Gebiet befindet sich an der Steile, wo die drei Kreise Bromberg, Schubin und Inowrazlaw zusammenstossen. Eine Anzahl der in diesem Verzeichnis aufgeführten Pflanzen werden demnach allen drei Kreisen gemeinsam sein. Bei manchen der genannten Ortschaften ist der Kreis noch besonders in Klammern hinzugefügt. Die Netze bildet hier auf eine Strecke von mehreren Meilen die Kreisgrenze zwischen dem westlich gelegenen Schubin einerseits, Bromberg und Inowrazlaw andererseits. Der mehrfach angegebene Jesuiter-See liegt auf der Grenze der Kreise Bromberg und Inowrazlaw. Der Herausgeber.

Silene nutans var *glabra* (*infracta* W. K.). Wald bei Gr.-Neudorf.

S. chlorantha. Am Minutsdorfer Kirchhofe im Walde (Kr. Inowrazlaw).

S. Otites. An der Chaussee im Walde bei Gr.-Neudorf und im Wildwerder bei Walownice (Kr. Schubin).

*S. dichotoma**. Adl. Brühlsdorf am Kirchhofe, aus dem Schulgarten entflohen.

*Melandryum rubrum**. Im Gebüsch am Kanal bei Minutsdorf (Kr. Inowrazlaw).

Stellaria glauca. Am Kanal bei Minutsdorf.

*St. uliginosa**. Ebendasselbst.

Hypericum montanum. Walownice (Kr. Schubin).

Radiola linoides. Bei Kl.-Neudorf.

Geranium pratense. Im Chausseeegraben in Gr.-Neudorf.

G. sanguineum. Im Walde bei Gr.-Neudorf.

Cytisus nigricans. Hopfengarten. Bahnhof.

C. capitatus. Ebendasselbst.

Ononis arvensis. Adl. Brühlsdorf am Bach vor dem Jesuiter-See, an der Chaussee vor Tarkowo (in mehreren Exemplaren).

Trifolium fragiferum. Minutsdorf (Kr. Inowrazlaw).

Astragalus arenarius v. *glabrescens**.¹⁾ Gr.-Neudorf.

Ervum cassubicum. Im Walde bei Kirschgrund, häufig.

E. tetraspermum. Gr. Neudorf.

Lathyrus paluster. Wiesen bei Minutsdorf.

Filipendula Ulmaria. Chausseeegraben am Walde bei Gr.-Neudorf.

*Potentilla norvegica**. Auf einer angesäten Wiese bei Minutsdorf, selten.

P. procumbens. Im Walde bei Gr.-Neudorf.

P. arenaria (= *incana*). Wald bei Minutsdorf, Waldrand.

P. incana v. *trisecta**. Minutsdorf, Kiefernsonnung.

P. alba. Wald bei Minutsdorf, vereinzelt.

¹⁾ Einzelne der dem Prov.-Herbar eingeschickten Exemplare waren fast völlig kahl, die Blättchen dafür aber auffallend schmal lineal, fast fadenförmig. Der Herausgeber.

Sanguisorba officinalis. Gr.-Neudorf, Wald an der Chaussee.

Epilobium adnatum. Am Bach bei Johannisthal (Kr. Inowrazlaw).

Sempervivum soboliferum. Am Waldrand bei Gr.-Neudorf nach Kirschgrund zu, häufig.

Eryngium planum. Längs der Chaussee, häufig.

Cnidium venosum. Bei Gr.-Neudorf und im Wildwerder.

Peucedanum Cervaria. Wildwerder bei Walownice (Kr. Schubin).

Laserpitium prutenicum. Gr.-Neudorf, Chaussee im Walde (1898).

Viscum album. Auf Kiefern, am Wege nach Kirschgrund.

Scabiosa Columbaria var. *ochroleuca.* Im Wildwerder.

Sc. canescens. Im Walde bei Gr.-Neudorf und im Wildwerder.

Fnula hirta. Im Wildwerder.

Rudbeckia hirta. Auf einer angesäten Wiese bei Minutsdorf (Kr. Inowrazlaw).

Carlina acaulis. Im Walde bei Gr.-Neudorf. Ich habe die Pflanze mit durchschnittenen Blütenkörben gefunden und habe darum nur einmal einen Blütenkorb des Exemplares bekommen. Sollte die Pflanze eine Rolle im Aberglauben des Volkes spielen? Im Walde bei Königl. Brühlsdorf und Kirschgrund.

Serratula tinctoria. Wald bei Gr.-Neudorf.

Scorzonera purpurea. Gr.-Neudorf.

*Hieracium Pilosella.*¹⁾

H. praealtum. Wiesen bei Minutsdorf, zerstreut.

Arctostaphylos Uva ursi. Gr.-Neudorf, Wald, häufig.

Pirola uniflora. Gr.-Neudorf, an der Chaussee, an einer feuchten Stelle.

Chimophila umbellata. Gr.-Neudorf, Wald.

¹⁾ Einer der Ausläufer an den eingesandten Exemplaren, welcher mit mehreren Laubblättern versehen war, endete in einem sonst scheinbar normal gebildeten Blütenkorb. Der Herausgeber.

- Vincetoxicum officinale*. Wildwerder.
Cynoglossum officinale. Am Gasthof zu Walownice.
Veronica austriaca. Wildwerder bei Walownice. Juli 1898.
Salvia pratensis. Am Kirchhofe bei Minutsdorf.
Dracocephalum Ruyschiana. Im Wildwerder, 1894.
Brunella grandiflora. Im Wildwerder, 1898.
Teucrium Scordium. Gr.-Neudorf, am Graben nach
 Königl. Brühlsdorf und am Jesuiter-See.
Trientalis europaea. Wald bei Gr.-Neudorf (von
 meinem Bruder).
Salsola Kali. Am Bahnhofe Hopfengarten, 1894.
Thesium intermedium. Im Wildwerder, am Südrande,
 1898.
Th. ebracteatum. Bei Gr.-Neudorf.
Cephalanthera rubra. Gr.-Neudorf, Chausseeegraben
 im Walde, häufig. Juli 1894.
Epipactis rubiginosa. Desgleichen.
Carex Goodenoughii v. *juncella*** Gr.-Neudorf.
*C. limosa**. Am Rande des Jesuiter-Sees¹⁾.
C. glauca v. *erythrostachys**. Kl.-Neudorf, wenig.
C. distans. Wiesen bei Minutsdorf.
C. filiformis. Am Rande des Jesuiter-Sees.
Festuca heterophylla. Kirschgrund in einer Eichen-
 schonung.
Bromus racemosus v. *commutatus*. Minutsdorf auf
 einer angesäten Wiese.
B. inermis. Königl. Brühlsdorf an einem sandigen
 Waldwege.
Equisetum hiemale. Am Bache nach Königl. Brühlsdorf.
Lycopodium complanatum. Wald bei Gr.-Neudorf, aber
 nicht fruchtend.
Botrychium Lunaria. Gr.-Neudorf. Chaussee im Walde.
*B. rutaceum**. Gr.-Neudorf, am Wege nach Kirschgrund.²⁾
Polystichum cristatum. Wildwerder bei Walownice.

¹⁾ Die Art wäre neu für den Kreis Inowrazlaw.

²⁾ Diese Art ist bisher für die Provinz nur aus dem Kreise
 Meseritz bekannt. Der Herausgeber.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Botanischen Abteilung Naturwissenschaftlicher Verein der Provinz Posen](#)

Jahr/Year: 1899-1900

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Holzfuss

Artikel/Article: [Zur Flora des Regierungsbezirks Bromberg. 8-11](#)