

Beiträge zur bryologischen Floristik von Rajnochowitz und dessen weiterer Umgebung.

I. Teil.

Vom Gymnasialprofessor Franz Matouschek (Reichenberg in Böhmen).

Herr Pfarrer Franz Gogela in Rajnochowitz sandte mir zwei größere Moosaufsammlungen aus dem oben bezeichneten Gebiete. Da er in der Abhandlung „Flora von Rajnochowitz“ in den „Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn“, 39. Band, 1900, Seite 65—81, die Phanerogamen und Gefäßkryptogamen erschöpfend behandelt hat, so dürfte die Kenntnis der in diesem interessanten Gebiete vorkommenden Leber- und Laubmoose auch erwünscht sein und dies um so mehr, als ja die mährischen Karpaten bryologisch noch ganz unerforscht sind. Der Anfang hiemit ist dank der Bemühungen des Herrn Pfarrers Gogela möglich geworden; die weitere bryologische Durchforschung wird sich auch in Hinkunft Herr Pfarrer Gogela angedeihen lassen, so daß in Bälde ein II. Teil veröffentlicht werden kann, der natürlich nur die neuen Funde bringen wird. Verfasser selbst gedenkt das Gebiet später während der Hauptferien einer gründlichen Begehung zu unterziehen. Einen bryogeographischen Überblick über das Gebiet jetzt schon zu geben erscheint daher verfrüht zu sein. Derselbe erfolgt erst am Schlusse des letzten Beitrages.

Was das Gebiet selbst betrifft, so verweise ich auf die oben zitierte Abhandlung Gogelas. Zum Verständnisse des folgenden kritischen Verzeichnisses ist es aber nötig, folgendes anzuführen.

Rajnochowitz, in den mährischen Karpaten östlich vom Hosteinberge gelegen, und dessen weitere Umgebung gehört der

Formation des Karpatensandsteines an. Die Erhebungen gehen mit dem Javornik bis zu 865 *m*; Černava-Berg hat 840 *m*, Kotáry etwas über 700 *m*, Berg Sochová 749 *m*, Klíneč 667 *m*, Přičnice 642 *m*, Polomsko 555 *m*, Kunovská hůra (= Kunowitzer Berg) 593 *m*, Kuželek 537 *m* Höhe. Die Talsohle von Rajnochowitz, welche vom Juhyně-Bache durchflossen wird, wird mit ± 422 *m* angegeben. Die in Betracht kommenden Dörfer sind außer Rajnochowitz Pohradní Lhota, Podolí und Loučka. Selten findet sich im Gebiete Kalk; Alluvium tritt nur an den Bächen zu Tage.

Die Bestimmung und Anordnung der Laubmoose geschah durchwegs nach Limpricht's großem Werke „Die Laubmoose in Dr. L. Rabenhorst's Kryptogamenflora“, die systematische Anordnung der Lebermoose erfolgte einheitlich nach Joh. Breidlers Werke „Die Lebermoose Steiermarks“, Graz 1894.

Bezüglich der Abkürzungen merke man sich auch für die Herkunft: R. = Rajnochowitz; c. fr. = mit Kapseln, c. spor. = mit Sporogonen.

I. Musci hepatici (Lebermoose).

Fegatella conica (L.) Corda. In Gesellschaft von *Trichocolea tomentella*, *Amblystegium filicinum* und *Hypnum moluscum* am Waldbache der „Pasičky“; mit *Amblystegium filicinum* und *Mnium punctatum* am Bachrande am Fuße der Přičnice.

Marchantia polymorpha L. var. *aquatica* Nees. Alter Teich zu R., in Rasen von *Bryum pseudotriquetrum*; Kotáry im Juhyně-Tale, mit *Bryum Duvalii*.

Metzgeria conjugata Lindb. Kunovská hůra, auf Sandsteinfelsen mit *Hypnum cupressiforme* var. *filiforme*.

Aneura pinguis (L.) Dum. Wiesenbach in R.

Plagiochila asplenoides (L.) Dum. Am Javornik auf Waldboden.

— *forma maior* Nees. An Waldbachrändern zu R.; Weg nach Podolí.

— *forma heterophylla* Nees. Černava-Berg, auf einem Baumstrunke.

Jungermannia barbata Schreb. Bašta, in Rasen von *Polytrichum formosum*.

Cephalozia bicuspidata (L.) Dum. In einer laxen Form in Rasen von *Polytrichum formosum* an Waldrändern bei der Bašta.

- Cephalozia curvifolia* (Dicks.) Dum. Černava-Berg, 500 m. mit *Isotheecium myurum*.
- Blepharostoma trichophyllum* (L.) Dum. Fruchtend auf den Pasičky, mit *Plagiochila asplenoides* und auf Sandstein am Ostabhange der Sochová; steril zwischen *Polytrichum formosum* auf der Bašta.
- Lophocolea heterophylla* (Schrad.) Nees. Fruchtend am Splávek bei R., auf morschem Holze mit *Plagiotheecium silesiacum*; steril auf altem Holze im Rajnochowitzer Tale mit *Brachythecium rutabulum* und *Hypnum cupressiforme* und auf alten Weidenstöcken zu R.
- Chiloscyphus polyanthus* (L.) Corda. Auf Baumrinden bei R.
- Lepidozia reptans* (L.) Dum. Bašta, auf Rasen von *Polytrichum formosum*.
- Trichocolpa tomentella* (Ehrh.) Dum. R.-Tal: an Waldbächen und in den Wäldern „Pasičky“; Hrad. — Häufig.
- Radula complanata* (L.) Dum. Auf alten Weiden zu R.; Kunovská hůra, auf Sandstein; Javorník. — Stets fertil.
- *forma propagulifera*. Auf kalkhaltigen Felsen auf der Kunovská hůra, mit *Brachythecium velutinum*.
- Madotheca platyphylla* (L.) Dum. Klinec, auf einer Buche mit *Leucodon sciurioides*, $\pm$ 520 m; Wälder des Černava-Berges.
- Frullania dilatata* (L.) Dum. Auf alten Weiden zu R., mit *Pylaisia polyantha*; auf Linden im Tal Rosošné. — ♂ und ♀.

II. Musci frondosi (Laubmoose).

- Sphagnum acutifolium* Ehrh. ex parte. Am Fuße des Javorník auf nassem Waldboden, ♂.
- Sphagnum Girgensohnii* Russ. Ebenda.
- Sphagnum squarrosum* Pers. Ebenda.
- Mildeella bryoides* (Dicks.) Limpr. Juhyně-Ufer, auf Sandboden, mit *Pottia truncatula*, c. fr. 7. IV. 1902.
- Weisia viridula* (L.) Hedw. Klinec, $\pm$ 460 m, c. fr.
- Rhabdoweisia fugax* (Hedw.) Br. eur. Polomsko, auf Sandstein mit *Encalypta vulgaris*, c. fr.
- Dichodontium pellucidum* (L.) Schimp. Feuchtes Sandsteinloch im Tale zu R., c. fr.
- Dicranella subulata* (Hedw.) Schimp. Javorník, auf Waldboden, c. fr.

- Dicranella heteromalla* (Dill.) Schimp. Klinec, im Kiefernwald, ± 450 m; Černava; Humenec. — Stets mit Seten.
- Dicranum Bonjcani* de Not. Auf nassen Wiesen bei R., mit *Aulacomnium palustre*.
- Dicranum scoparium* (L.) Hedw. Auf verschiedenem Substrate im ganzen Gebiete gemein und fruchtend.
- Dicranum longifolium*, Ehrh. Auf Sandsteinfelsen des Javornik und des Černava-Berges.
- Leucobryum glaucum* (L.) Schimp. Sehr schön fruchtend im Walde am Fuße des Javornik, 28. IV. 1902.
- Fissidens bryoides* (L.) Hedw. In einem Hohlwege des Kuželek und auf Sandstein der Kunovská hůra, c. fr.
- Fissidens aliantoides* (L.) Hedw. Auf feuchten Wiesen teils in reinen Rasen, teils in *Hypnum stellatum* eingesprengt auf dem Javornik.
- Fissidens turfifolius* (L.) Hedw. Bei Loučka, auf kalkhaltigem Boden mit *Barbula fallax* und *Hypnum chrysophyllum*, c. fr.
- Ceratodon purpureus* (L.) Brid. Überall, fruchtend und ♂.
- Ditrichum homomallum* (Hedw.) Hpe. Javornik, auf Waldboden der Nordseite, fertil.
- Pottia truncatula* (L.) Lindb. Am Juhyně-Ufer (auf Lehmboden) gegen Pohradní Lhota, c. fr.
- Didymodon rubellus* (Hoffm.) Br. eur. Auf Sandstein der Bašta, ± 500 m, c. fr.
- Didymodon rigidulus* Hedw. Ebenda, fertil.
- Tortella tortuosa* (L.) Limpr. Auf einem aus Sandstein bestehenden Grenzsteine bei Bašta, 430 m; Klinec, auf Sandstein. — Stets mit Seten.
- Barbula unguiculata* (Huds.) Hedw. Pohradní Lhota, auf Wurzeln von *Populus nigra*, c. fr.
- Barbula fallax* Hedw. Auf kalkhaltigem Boden bei Loučka, mit *Hypnum chrysophyllum*, c. fr.; Abhang der Kunovská hůra gegen die Juhyně.
- Tortula muralis* (L.) Hedw. Auf Kalk der Kunovská hůra, auf dem Sandsteine der Eisenbahnbrücke bei R., auf einer Sandsteinmauer zu Kelč. Stets fruchtend.
- Tortula aestiva* (Brid.) P. B. Auf Sandstein der Eisenbahnbrücke zu R., mit Kapseln, 21. V. 1902.

- Tortula subulata* (L.) Hedw. Pohradní Lhota, auf *Populus nigra*; Kunovská hůra und Bašta auf Sandstein; unter Waldbäumen zu R. — Mit Seten.
- Tortula ruralis* (L.) Ehrh. Auf Sandstein im ganzen Gebiete, fruchtend und häufig.
- Schistidium apocarpum* (L.) Br. eur. Auf Sandstein gemein und reichlichst fruchtend.
- Grimmia pulvinata* (L.) Smith. Auf Sandstein zu R., am Klíneec und Javorník, fertil.
- Racomitrium canescens* (Weis.) Brid. Auf Sandstein überall, fruchtend, auch in der var. *ericoides* (Web.) Br. eur.
- Hedwigia abicans* (Web.) Lindb. Fruchtend auf Sandstein der Kunovská hůra.
- Ulota crispa* (L.) Brid. Auf Linden um R. und im Rosošné-Tale, c. fr.
- Orthotrichum anomalum* Hedw. Auf Sandstein bei R. und Polomsko, fruchtend.
- Orthotrichum affine* Schrad. R., auf alten Weiden; Klíneec, auf Buchen; auf *Salix fragilis* im Jedové-Tal; auf Linden im Rosošné-Tal. — Immer mit Kapseln.
- Orthotrichum speciosum* Nees. Tal zu R., auf Roßkastanien; Juhyně-Tal, auf *Alnus glutinosa*; auf einem Dache zu R. — Fertil.
- Orthotrichum stramineum* Hornsch. Auf *quercus pedunculata* zu Podolí, c. fr.
- Orthotrichum leiocarpum* Br. eur. Juhyně-Tal und Pohradní Lhota, auf *Populus nigra*, c. fr.
- Encalypta vulgaris* (Hedw.) Hoffm. Klíneec; Polomsko, auf Sandstein, c. fr.
- Encalypta ciliata* (Hedw.) Hoffm. Auf Sandstein am Klíneec, c. fr.
- Encalypta contorta* (Wulf.) Lindb. Zwischen *Homalothecium sericeum* auf den Sandsteinfelsen des Klíneec.
- Georgia pellucida* (L.) Rabenh. Auf vermodertem Holze am Klíneec und auf dem Berge Sochová, c. fr.
- Funaria hygrometrica* (L.) Sibth. Auf alten Feuerstellen am Klíneec, im Juhyně-Tale und auf Příčnice; am Waldesrande des Kuzelek. — Immer fertil.
- Webera cruda* (L.) Bruch. Auf Sandstein bei der Bašta, ± 500 m, c. fr.
- Webera nutans* (Schreb.) Hedw. Auf Waldboden bei der Bašta, gegen Podolí und Klíneec, auch in einer langsetigen Form; auf der Bašta auf Sandstein. — Stets mit Kapseln.

- Mniobryum albicans* (Wahlenb.) Limpr. Am Abhange der Kunovská hůra gegen Juhyně.
- Bryum pallescens* Schleich. Kopaná im Juhyně-Tale; bei einer Wiesenquelle bei der Bašta, c. fr.
- Bryum capillare* L. Kuželek und Bašta, im Walde, c. fr.
- Bryum caespitium* L. Recht häufig und fruchtend auf verschiedenem Substrate.
- Bryum argenteum* L. Mit *Pottia truncatula* am Juhyně-Ufer in Pohradní Lhota, c. fr.
- Bryum Duvalii* Voit. Kotáry im Juhyně-Tal, auf nassen Wiesen, mit *Climacium dendroides*.
- Bryum turbinatum* (Hedw.) Schurgr. Javorník, auf nassen Stellen der Südseite, mit jungen Kapseln; auf Sumpfboden am Wege nach Polomsko.
- Bryum pseudotriquetrum* (Hedw. ex p.) Schurgr. Im ganzen Gebiete gemein und oft schön fruchtend.
- var. *gracilescens* Schimp. Bei der Černava-Klause mit *Hypnum commutatum* und auf nassen Wiesen bei Kotáry im Juhyně-Tale (hier auch mit Früchten); alter Teich zu R.
- Mnium hornum* L. Auf dem Sandsteine der Bašta mit *Mnium rostratum*.
- Mnium serratum* Schrad. Auf dem Sandsteine der Bašta, c. fr.
- Mnium spinosum* (Voit) Schurgr. Jasenover Fichtenwald, c. fr.
- Mnium undulatum* (L.) Weis. Ebenda; Sochová, Hrad, Dobroniř, Přienice, im Tale von R., stets fruchtend.
- Mnium rostratum* Schrad. Sandsteinfelsen der Bašta und des Javorník; auf einem Baumstrunke am Černava-Berge, mit *Homalia trichomanoides*; stets fertil.
- Mnium cuspidatum* (L. ex pte.) Leyss. In Wäldern von Jasenov und Dobroniř, c. fr.
- Mnium affine* Bland. Sochová, Ostseite, beim Waldbache, c. fr.
- Mnium Seligeri* Jur. Hrad, am Waldbache; fruchtend, bei einer Quelle am Javorník an der Südostseite; ♂ am Fuße des Javorník und am Waldsumpfboden der Přienice.
- Mnium stellare* Reich. Kuželek, mit *Plagiothecium Roeseanum*, bei R.
- Mnium punctatum* (L.) Hedw. Ein sehr gemeines, oft fruchtendes Moos.

- Aulacomnium palustre* (L.) Schwgr. Fruchtend, am Fuße des Javorník auf der Hutweide Osičko, Kotáry im Juhyně-Tale; sehr schön ♂ am letztgenannten Orte.
- Bartramia ithyphylla* (Haller) Brid. Klinec und Bašta, auf felsigem Boden, c. fr.
- Bartramia pomiformis* (L.) Hedw. Auf Sandstein der Bašta, fruchtend.
- Philonotis fontana* (L.) Brid. Tal Bystrický und auf dem Javorník, c. fr. und ♂; alter Teich zu R., ♂; Kotáry im Juhyně-Tal.
- Catharinea undulata* (L.) Web. et M. Überall reich fruchtend und gemein.
- Cutharinaea Hausknechtii* (Jur. et Milde) Broth. Waldränder bei der Bašta, 500 m, c. fr.
- Pogonatum aloides* (Hedw.) P. B. und *P. urnigerum* (L.) P. B. Häufige, stets fruchtende Moose.
- Polytrichum formosum* Hedw. Fruchtet stets.
- Polytrichum piliferum* Schreb. In Kiefernwäldern, auf Hutweiden, auf Sandstein häufig, mit Seten.
- Polytrichum juniperinum* Willd. Ein gemeines Moos; in schönster Entwicklung (♂ und ♀) auf der Ostseite der Sochová und im Javorníker Walde.
- Polytrichum commune* L. Fruchtend und ♂ ebenda.
- Buxbaumia indusiata* Brid. Auf morschem Holze zu R., c. fr.
- Leucodon sciuroides* (L.) Schwgr. Auf verschiedenen wildwachsenden und gepflanzten Laubbäumen im Gebiete recht häufig; seltener auf Sandsteinfelsen. Eine Form mit ganz straffen aufrechten Ästen (*forma stricta mihi*) wurde auf einem alten Apfelbaume in Rajnochowitz gefunden, die *forma pulverulenta* auf einer alten Buche am Abhange des Klinec.
- Antitrichia curtipendula* (Hedw.) Brid. Javorník, auf Sandsteinfelsen.
- Neckera crispa* (L.) Hedw. Fruchtend auf dem Černava-Berge, mit *Isothecium myurum* und auf Buchen daselbst.
- Neckera complanata* (L.) Hüben. Bašta, auf Sandsteinfelsen, ± 500 m; auf Buchen des Berges Černava.
- Homalia trichomanoides* (Schreb.) Br. eur. Fruchtend auf Bäumen am Černava-Berge, auch in Gesellschaft von *Mnium rostratum*.
- Leskea nervosa* (Schwgr.) Myrin. Auf Sandsteinfelsen „Skalky“ auf dem Polomsko-Berge, mit *Orthotrichum anomalum*.
- Leskea catenulata* (Brid.) Mitten. Ebenda.

- Anomodon viticulosus* (L.) Hook. et Tayl. Auf Buchen und auf Sandstein im ganzen Gebiete häufig.
- Anomodon longifolius* (Schleich.) Bruch. Auf Sandstein des Polomsko; mit *Pterigynandrum filiforme* am Humenec; auf faulem Holze in Begleitung desselben Mooses am Javornik.
- Pterigynandrum filiforme* (Timm.) Hedw. Fruchtend auf Baumrinde am Černava-Berge; auf faulem Holze am Javornik; steril am Humenec.
- Thuidium tamariscinum* (Hedw.) Br. eur. In Rasen von *Politrichum commune* auf der Ostseite des Sochová-Berges; am Waldbache beim Hrad und auf Waldboden auf der Přienice.
- Thuidium delicatulum* (Dill.) Mitten. Auf Sandstein am Polomsko, mit *Homalothecium Philippeanum*.
- Thuidium Philiberti* (Philib.) Limpr. Auf feuchten Wiesenplätzen bei der Bašta, ± 550 m, mit *Climacium dendroides*.
- Thuidium abietinum* (Dill.) Br. eur. Auf Sandstein auf dem Polomsko und der Bašta; Hügel Želkov bei Holleschau, 400 m, mit *Camptothecium lutescens*.
- Pylaisia polyantha* (Schreb.) Br. eur. Auf verschiedenen Laubböhlzern im ganzen Gebiete häufig und immer fruchtend.
- Climacium dendroides* (Dill.) Web. et Mohr. Auf nassem Boden überall, bisher nur steril bemerkt.
- Isothecium myurum* (Poll.) Brid. Auf diversen Laubbäumen und auf Sandstein im ganzen Gebiete, meist fertil.
- *var. robustum* Br. eur. Auf Sandstein der Bašta, ± 500 m, mit *Neckera complanata* und *Bryum capillare*.
- *var. scabridum* Limpricht. Auf Sandstein im Tale von R. — Der Rücken des Blattes zeigt zwar nicht durchwegs, wohl aber recht häufig abgestumpfte Zähnehen. Neu für ganz Mähren!
- Homalothecium sericeum* (L.) Br. eur. Auf Sandsteinblöcken und Buchen im ganzen Gebiete, fruchtend nur auf Sandstein der Bašta, 550 m.
- Homalothecium Philippeanum* (Spruce) Br. eur. Fruchtend auf Sandstein des Polomsko und der Bašta, ± 530 m.
- Camptothecium lutescens* (Huds.) Br. eur. Hügel Želkov bei Holleschau, 400 m.
- Brachythecium salebrosum* (Hoffm.) Br. eur. Černava-Berg, mit *Mnium punctatum*; auf alten Weidenstöcken zu R. — Immer mit Kapseln.

- Brachythecium populeum* (Hedw.) Br. eur. Auf Sandstein im ganzen Gebiete, oft schön fruchtend.
- Brachythecium velutinum* (L.) Br. eur. Auf Waldhumus, Baumstämmen und vermodertem Holze ein stets gemeines, fruchtendes Moos.
- Brachythecium rutabulum* (L.) Br. eur. Auf denselben Substraten und auch auf Sandstein überall fruchtend.
- Brachythecium glaucosum* (Bruch.) Br. eur. Auf der Südseite des Javorník.
- Brachythecium rivulare* Br. eur. Wiesenumpf beim Hrad.
- Eurhynchium striatum* (Schreb.) Schimp. In den Wäldern des ganzen Gebietes stets fruchtend.
- Eurhynchium Swartzii* (Turn.) Curnow. Fertil auf Sandstein beim Bache auf der Ostseite der Sochová.
- Rhynchostegium rusciforme* (Neck.) Br. eur. Fruchtend auf Sandsteinen in der Kunowitzer Schlucht, auf der Černá, bei der Juhyně-Schleuse und im Jedové-Tale.
- var. *prolixum* (Dicks.) Br. eur. An letztangegebenem Orte, fruchtend.
- var. *complanatum* H. Schulze. Am Bache der Kunovská hůra.
- Plagiothecium silvaticum* (Huds.) Br. eur. Waldboden am Javorník, c. fr.
- Plagiothecium Roeseanum* (Hampe) Br. eur. Kuželek, in einem Hohlwege mit *Mnium stellare*; auf Příčnice. Immer fertil.
- Plagiothecium denticulatum* (L.) Br. eur. Auf morschem Holze und auf Waldhumus häufig, fruchtend.
- Plagiothecium silesiacum* (Sel.) Br. eur. Auf vermodertem Holze und auf Waldhumus recht häufig, reich fruchtend.
- Amblystegium filicinum* (L.) de Not. Auf nassen Wiesen, bei Quellen, an Bächen im ganzen Gebiete häufig, oft überreich fruchtend.
- Amblystegium irriguum* (Wils.) Br. eur. Auf Sandstein in der Kunowitzer Schlucht beim Waldbache, mit *Rhynchostegium rusciforme*.
- Amblystegium varium* (Hedw.) Lindb. Bei der Juhyně-Schleuse, mit *Hypnum palustre*.
- Amblystegium serpens* (L.) Br. eur. Auf Sandstein, Kalk und Waldhumus überall, fertil.
- Hypnum chrysophyllum* Brid. Auf kalkhaltigem Boden bei Loučka, mit *Barbula fallax*.

- Hypnum stellatum* Schreb. Im alten Teiche zu R.; an einer Quelle an der Südseite des Javorník. Stets mit Kapseln. — Steril auf feuchtem Holze zu R.
- Hypnum vernicosum* Lindb. [= *Drepanocladus vernicosus* (Lindb.) Warnst.] In Sümpfen zu R.; am Waldbache der Südseite des Javorník.
- Hypnum commutatum* Hedw. Auf Wiesenquellen und Waldbächen im ganzen Gebiete häufig und fruchtend.
- Hypnum falcatum* Brid. Wiesenbach des Polomsko.
- Hypnum molluscum* Hedw. An Waldbächen, auch auf Sandstein bei den Pasičky und an den Abhängen des Černava-Berges.
- Hypnum incurvatum* Schrad. Polomsko und Kunovská hůra, c. fr.
- Hypnum cupressiforme* L. Auf den verschiedensten Substraten gemein und stets mit Seten.
- *var. filiforme* Brid. Auf *Alnus glutinosa*, auf Buchen und auf Sandstein häufig, aber selten fertil.
- Hypnum palustre* Huds. Auf Sandstein und auf morschem Holze an Bächen häufig und oft schön fruchtend.
- Acrocladium cuspidatum* (L.) Lindb. Auf feuchten Stellen recht häufig und reichlichst fruchtend.
- Hylocomium splendens* (Dill.) Br. cur. Fruchtend; unter der Příčnice und an den Abhängen des R.-Tales auf Abhängen.
- Hylocomium Schreberi* (Willd.) de Not. Im Gebiete schön fruchtend häufig zu finden. — Eine gedunsene sterile Waldform beim Dorfe Podolí.
- Hylocomium triquetrum* (L.) Br. cur. Auf Waldboden um R. und auf dem Klínce. — Mit Früchten.
- Hylocomium squarrosum* (L.) Br. cur. Schön fruchtend bei R., am Klínce und bei Podolí.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums](#)

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Matouschek Franz

Artikel/Article: [Beiträge zur bryologischen Floristik von Rajnochowitz und dessen weiterer Umgebung 113-122](#)