Pflanzengeographische Beobachtungen an oberbayerischen und oberpfälzischen Hymenomyceten.[1]

Von R. Singer-Amberg.

1. Reihe.

Obb. = Oberbayern, Obpf. = Oberpfalz, 1—12 = Januar bis Dezember. Z. B. M 7 = Mitte Juli, A = Anfang, E = Ende.

Botanischer Name	Fundort	Zeit	Höhenlage	Bodenbeschaffenheit	Vegetation	Wert	Verbreitung	Bemerkungen
1. Hydnum laevigatum Swartz	Freihölser Forst (Obpf.)	E 9	ca 400 m	Sand	Föhrenwald, gesellig	Eßbar?	Zerstreut	Sporen 4/3 μ (n. Killermann 4—5 μ)
2. Hydnum squamosum Schff.	Rohnberg b. Schliersee	E 8	ca 900 m	feuchter Humus	Tannenwald	Eßbar?	Selten	Riecht oft wie Nr. 1, auch H. impricatum riecht selten
3. Hydnum caeruleum Fl. D.	Rohnberg b. Schliersee	E 7	cc 900 m	feuchter Humus (Kalk)	Tannenwald	—	Zerstreut	Nach Killermann var. von suaveolens?
4. Hydnum scrobiculatum Fr.	Hirschwald (Obpf.)	A 9	ca 400 m	Humus (Kreide)	Föhrenwald	—	Zerstreut	Nach Ricken var. von zonatum
5. Polyporus ciliatus Fr.	Rhonberg b. Schliersee	A 5	ca 850 m	Humus (Kalk)	Föhrenholzstückchen	—	Zerstreut	
6. Polyporus intermedius n. sp.	Westerberge b. Schliersee	A 5	ca 850 m	(Kalk)	Laub- und Nadelholzstümpfe	—	Selten	Beschreibung „Puk" V, Heft 11—12
7. Polyporus brumalis var. esculenta (Britz)	Halbinsel Freudenberg am Schliersee	A 4	ca 800 m	(Kalk)	Laubholzstumpf	Sehr wohlschmeckend	Selten	
8. Boletinus bovinus (L.)	Freihölser Weiher	E 9	ca 400 m	Sand	Kahle Ufer, zu Hunderten	Eßbar?	Häufig	Vgl. Annales mycologici: Boletinus durch v. Höhnel f. B. mitis erweitert.
9. Boletinus cavipes Op.	Mariahilfberg bei Amberg	E 8	ca 850 m	Humus (Kalk)	Lärchenwald	Eßbar, wohlschmeck.	Zerstreut	
9a. Boletinus cavipes Op.	Geitau (Obb.)	A 10	ca 450 m	Humus (Dogger)	Gemischter Wald	siehe Nr. 9	Zerstreut	
10. Gyrodon rubescens (Trog)	Oberleiten bei Schliersee	A 8	ca 850 m	Sumpfboden (Kalk)	Unter Erlen	?	Zerstreut	Bitter!
11. Boletus macroporus Rostk.	Ehrwald (Tirol)	E 8	ca 900-1000 m	Kalk	Nadelwald	Eßbar	Selten	
12. Boletus Satanas Lenz	Pasing b. München	E 7	ca 500 m	Humus Quartär!	Laubwald	Giftig	Selten	

[1]) In Anlehnung an das von Herrn E. Herrmann veröffentlichte Schema habe ich seltene Hymenomyceten aus meinen Beobachtungsgebieten in mehreren Reihen zusammengestellt. Bei der Namenklatur wurde das G. Beck'sche System verwendet, soweit es sich um Agaricaceae handelt. Die Reihen für deutsche Namen habe ich aufgegeben. Dafür wurde eine Rubrik für systematische Bemerkungen beigefügt.

Botanischer Name	Fundort	Zeit	Höhenlage	Bodenbeschaffenheit	Vegetation	Wert	Verbreitung	Bemerkungen
13. Strobylomyces strobilaceus Bk.	Am Chiemsee	E 8	ca 530 m	Humus	Nadelwald	Eßbar	Selten	
14. Boletopsis flavida (Fr.)	Freihölser Weiher (Obpf.)	E 9	ca 400 m	feuchter Humus	Unter Föhren	Eßbar	Selten	
15. Boletopsis flava With.	Ehrwald (Tirol)	E 8	ca 900-1000 m	Kalk	Unter Lärchen	Eßbar	Zerstreut	
16. Boletopsis larigna Britz	Ehrwald (Tirol)	E 8	ca 900-1000 m	Kalk	Unter Lärchen	Eßbar	Selten	
17. Boletopsis viscida (L.)	Geitau (Obb.)	A 8	ca 850 m	Humus (Kalk)	Lärchenwald	Eßbar, wohlschmeck.	Zerstreut	
18. Cantharellus olidus Quel.	Rohnberg b. Schliersee	A 8	ca 900 m	Humus	Nadelwald	Eßbar, sehr wohlschmeck.	Sehr selten	In Mengen, sehr gesellig.
19. Cantharellus cinereus Pers.	Pumperhölzchen b. Amberg	M 9	ca 450 m	Humus	Laubwald	Eßbar	Zerstreut	In Mengen, sehr gesellig
20. Lactaria deliciosa C. mit Hypom. later. Fr.	Schliersberg b. Schliersee	A 8	ca 850 m	Steinige, feuchte Erde (Kalk)	Laubwald	Eßbar	Selten	
21. Lactaria deliciosa L. mit Hyp. deform. Lagg.	Gräfelfing b. München	E 7	ca 500 m	Humus	Fichtenwald	Eßbar	Häufig	
22. Lactaria subdulcis Bull.	Auf dem Miesing (Obb.)	E 7	1600 bis 1800 m	Kalk	Unter Fichten und Latschen im Grase	Eßbar	Häufig	
23. Russula [2])								
24. Hygrophorus clivalis Fr.	Leitnergraben b. Schliersee	A 8	ca 850 m	Humus (Kalk)	Wiese	Eßbar	Selten	
25. Hygrophorus intermedius Pers.	Pasing b. München	A 7	ca 500 m	Humus	Laubwald	Eßbar	Selten	Ziemlich klein
26. Hygrophorus conicus f. amoenus Lasch.	Schießstätte Amberg	A 9	ca 450 m	Humus	Wiese	Eßbar	Zerstreut	syn: H. persistens Britz
27. Hygrophorus pratensis fa pallidus (Bk.)	Freihölser Forst (Obpf.)	E 9	ca 400 m	Alluv. Sand	Grasiger Straßengraben	Eßbar	Selten	

[2]) Fundorte aller seltenen, in Süddeutschland vorkommenden Täublinge finden sich in meiner demnächst erscheinenden Arbeit „Die Russulae Mitteleuropas". Ich sehe also hier von genaueren Angaben ab.

Botanischer Name	Fundort	Zeit	Höhenlage	Bodenbeschaffenheit	Vegetation	Wert	Verbreitung	Bemerkungen
28. Gomphidius roseus (Fr.)	Freihölser Forst (Obpf.)	M 9	ca 400 m	Alluv. Sand	Föhrenwaldrand	Eßbar	Zerstreut	
29. Gomphidius gracilis (Bk.)	Geitau (Obb.)	M 8	ca 850 m	Humus (Kalk)	Lärchenwald	Eßbar	Zerstreut	Schleimig beschleiert wie G. glutinosus u. nebst G. maculatus u. stillatus var. v. diesem
30. Coprinus similis (Bk.)	Mariahilfberg b. Amberg	A 9	ca 500 m	Dogger	Nadelwald	Wertlos	Selten	
31. Coprinus ovatus Schff.	Pasing b. München. Anlagen	A 11	ca 500 m	Guter, schwarzer Humus	Unter Alleebäumen (Linden)	Eßbar	Häufig	Hierher Britzelmayrs clavatus. Diese und ovatus nur var. von comatus
32. Agaricus albidus (Fr.)	Mariahilfberg b. Amberg	M 9	ca 450 m	Lehmboden (Dogger)	Föhrenwald	Eßbar	Zerstreut	= Cantharellus a.
33. Agaricus geotropus Bull.	Leitnernase b. Neuhaus (Obb.)	M 11	ca 1000 m	Kalk	Laubwald	Eßbar	Zerstreut	
33 b. Agaricus geotropus Bull.	Hirschwald (Obpf.)	M 9	ca 450 m	Kreide	Unter Buche im Gras	Eßbar	Zerstreut	
34. Agaricus detrusus Fr.	Freihölser Forst (Obpf.)	E 9		Alluv. Sand	Föhrenwald	Eßbar	Zerstreut	
35. Agaricus fucatus Fr.	Freihölser Forst (Obpf.)	M 9	ca 400 m	Alluv. Sand	Föhrenwald	Eßbar	Zerstreut	
36. Agaricus aurantius Schff. sens. Michael	ZwischenFischeralm und Stauden (Obb.)	M 8	ca 800 m	Humus (Kalk)	Fichtenwald	Ungenießbar	Zerstreut	Bitter! Ohne jedes Velum
37. Agaricus auratus Paul.	Leitnergraben b. Schliersee	M 11	ca 850 m	Humus (Kalk)	Bachufer, grasiger Boden	Eßbar	Selten	
38. Agaricus Georgii var. aromaticus (Rocq)	Zwischen Lochham und Neuaubing b. München	E 5	ca 500 m	Alter Schlag, Humus	Unter Eichen im Grase	Eßbar, wohlschmeck.	Häufig	Von var. albella verschieden arom. ist weiß, glatt, kahl, nackt, eher seidig
39. Agaricus Georgii var. graveolens Pers.	Oberhalb Leitnergraben b. Schliersee	E 4	ca 850 m	Humus (Kalkb.)	Wiese	Eßbar, wohlschmeck.	Selten	Viell. Frühlingsform des A. panaeolus
40. Naucoria erinacea (Fr.)	UnterhalbStögeralm b. Schliersee	A 9	ca 900 m	Kalk	Weide, an Astchen v. Laub- u. Nadelholz	?	Zerstreut	
41. Naucoria limulata (Fr.)	Ledersberg b. Schliersee	E 10	ca 850 m	Sumpfboden (Kalk)	Weide, unter Fichten	?	Selten	
42. Naucoria conferciens Britz	Freihölser Weiher (Obpf.)	E 9	ca 400 m	Sumpf	An verfaulten Pflanzenrest., an Ufern	Eßbar	Selten	Gesammelt für Mycotheca germanica
43. Cortinaria muricina Fr.	Hundham b. Miesbach	E 7	ca 800 m	Humus	Gemischter Wald	?	Zerstreut	

Botanischer Name	Fundort	Zeit	Höhenlage	Bodenbeschaffenheit	Vegetation	Wert	Verbreitung	Bemerkungen
44. Inocybe descissa v. aurivenia (Fr.)	Totengraben bei Valepp (Obb.)	E 7	ca 1000 m	Kalk	Nadelwald	?	Zerstreut	Hierher auch auricoma (Batsch) und glabripes (Ricken).
45. Hypholoma elaeodes (Fr.) [?]	Leitnergraben b. Schliersee	A 8	ca 800 m	Kalk	Nadelholz	Eßbar	Selten	H. glatt, etwas schmierig
46. Hypholoma elaeodes n. f. Secretaniana	Höllental-Anger-Hütte	E 8	1360 m	Kalk	Nadelholz	Eßbar	Selten	Secr. No. 357, scheinbar montan
47. Hypholoma Candolleanum (Fr.) [?]	Im Loch b. Schliersee	A 8	ca 800 m	Humus (Kalk)	Wald-Wiese	Eßbar	Zerstreut	H. erhabenrunzelig; paßt aber nur hierher
48. Pholiota radicosa (Bull.)	Ellmau b. Mittenwald	E 8	ca 1000 m	Humus (Kalk)	Auf sehr faulem, eingesenkten Laubholz	?	Zerstreut	Bitterlich, riecht wie Marzipan
49. Psalliota chrysopus G. Beck	Götterhain b. Amberg	E 6	ca 450 m	Humus (Keuper)	Fichtenwald	Eßbar	Selten	
50. Psalliota stercoraria (Fr.)	Freihölser Forst (Obpf.)	E 9	ca 400 m	Alluv.	Wilde Exkremente am Waldrand	Eßbar	Häufig	
51. Anellaria seperata (L.)	Oberleiten b. Schliersee	A 8	ca 900 m	Humus (Kalk)	Weide	Eßbar	Selten	A. scitula Mass. dürfte nicht spezifisch verschieden sein
52. Amanita caesarea (Scop)	Am Chiemsee	A 8	ca 500 m	Humus (Tert)	Nadelwald	Eßbar	Selten	
53. Amanita Eliae (Quel.)	Zwischen Pasing und Neuaubing b. München	A 7	ca 500 m	Humus (Quart.	Gemischter Wald	Eßbar, wohlschmeck.	Selten	
54. Amanita muscaria f. formosa	Am Chiemsee	E 8	ca 500 m	Humus (Quart.)	Nadelwald	?	Selten	Ist trotz Britzelmayrs Ansicht v. Nr. 55 verschieden
55. Amanita junquillea (Quel.)	Hirschwald (Obpf.)	E 7	ca 450 m	Humus (Kreide)	Nadelwald	Eßbar	Häufig	
56. Amanita aspera (Fr.)	Zwischen Pasing und Lochham b. München	A 9	ca 500 m	Humus (Quart.)	Waldweg	?	Selten	
57. Biannularia imperialis (Fr.)	Rohnberg b. Schliersee	A 8	ca 1000 m	Humus (Kalk)	Tannenwald	Eßbar	Zerstreut	
58. Lentinus cd. onchatus (Fr.)	Seefeld b. Herrsching	E 6	ca 650 m	Quart.	Eichenstumpf	?	Zerstreut	
59. Lentinus stypticus f. alba Bres. (?)	Erzberg b. Amberg	E 2	ca 450 m	Tert.	Eichenstumpf	Ungenießbar	Zerstreut	

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Zeitschrift für Pilzkunde

Jahr/Year: 1922

Band/Volume: 1_1922

Autor(en)/Author(s): Singer Rolf

Artikel/Article: Pflanzengeographische Beobachtungen an oberbayerischen und oberpfälzischen Hymenomyceten 63-66