

schreibende Art und Weise ist auch nicht zu verachten; sie hat die Aufgabe, alle die Formen, die im großen Laboratorium der Natur auftreten, festzulegen und einer künftigen, vielleicht gescheiterten Menschheit zu übermitteln.

Das sind meine Sorgen — der Leser meint wohl, wenn es keine anderen und größeren gäbe! Mit El. Fries möchte ich meinen Bericht schließen: Am Abend meines Lebens freut mich die Erinnerung an das mykologische Studium, mit dem ich mich seit 50 Jahren beschäftigte. Mögen manche abgeschreckt werden durch die Vielheit und Verschiedenheit dieser Gebilde, unendlich groß ist die Zahl derselben doch nicht. Den Botanikern, besonders jenen, die auf dem Lande leben, empfehle ich dieses Studium als eine Quelle der Freude und der Bewunderung der Weisheit, die die ganze Natur beherrscht⁴⁾.

Neubenennungen bei Ricken, Die Blätterpilze (Leipzig 1915)

Vorgelegt von S. Killermann

Tafel I Cantharellus:

Fig. 5 *lutescens* (Pers.) heißt jetzt *tubaeformis* (Fr.)

Tafel II

Fig. 1 *umbonatus* (Gmel.) jetzt *muscoides* (Wulf.) nach Kühner

Fig. 2 *aurantiacus* (Wulf.) jetzt *Clitocybe aurantiaca*

Tafel III Gomphidius:

Fig. 2 *maculatus* (Scop.) ist Subsp. *gracilis* (Berkl.)

Tafel IV Limacium:

Fig. 3 *pudorinum* (Fr.) ob nicht *leucophaeum* (Scop)?

Fig. 6 *leucophaeum* (Scop.) ist fraglich

Tafel V

Fig. 4 *glutiniferum* (Bull.) ist *pudorinum* (Fr.)

Tafel VI

Fig. 7 *melizeum* ist *aureum* (Arrh.)

Tafel VII Camarophyllus:

Fig. 4 *caprinus* (Scop.) ist *camarophyllus* (A. et Schw.)

Fig. 5 *Colemannianus* (Bloxh.) ist *lacmus* (Fr.) nach Bresadola

Tafel VIII Hygrocybe:

Fig. 1 *intermedius* (Pass.) ist *obrusseus* (Fr.) nach R. Maire

Fig. 3 *obrusseus* (Fr.) ist *conicus* var. *Rickeni* nach R. Maire

Fig. 4 *conicus* ist subsp. *nigrescens* nach Konrad

Tafel IX Lactarius:

Fig. 1 *resimus* (Fr.) ist var. von *scrobiculatus* (Scop.)

Fig. 4 *turpis* (Weinm.) jetzt *plumbeus* (Bull.)

⁴⁾ Sub vitae meae crespuculo meminisse juvat, quantas voluptates perfectiorum fungorum studium, per 50 annos continuatum, mihi paraverit.

Nullam licet rei herbariae partem in singularibus persequi neglexerim, fungi semper fuere prae ceteris dilecti. Terrent plurimos immensae specierum copiae, at Hymenomycetes non infiniti sunt

Botanicis igitur ruri degentibus, horum studium commendo tamquam perennem fontem voluptatis et admirationis sapientiae, quae universam naturam regit.

Fries Monographia Hymenomycetum Sueciae 1857.

(Neudruck 1938 herausgegeben von S. Killermann,
Dr. W. Klinckhardt, Leipzig 1938; p. XI.)

Tafel XI

Fig. 1 flexuosus (Fr.) ist vielleicht violascens (Otto)

Fig. 3 luridus (Pers.) ist uvidus (Fr.)

Tafel XII

Fig. 5 fuliginosus (Fr.) ist azonites (Bull.)

Tafel XIII

Fig. 4 chrysorrheus (Fr.) gehört zu thejogalus (Bull.)

Fig. 5 thejogalus (Bull.) ist deipieus (Quel.) nach Knauth-Neuhoff

Fig. 6 cyathula (Fr.) ist obscuratus (Lasch)

Tafel XIV

Fig. 4 mitissimus (Fr.) ist thejogalus (Bull.)

Fig. 5 aurantiacus (Fl. D. 1) ist mitissimus (Fr.) Var.

Fig. 6 seriffuus (Cand.) ist subdulcis (Bull.)

Fig. 8 obnubilus (Lasch) gehört zu camphoratus (Bull.)

Tafel XVI Russula:

Fig. 2 graminicolor (Secr.) ist zweifelhaft: aeruginea nach Jul. Schaeffer

Fig. 5 depallens (Pers.) ist wohl vesca (Fr.)

Tafel XVII Russula:

Fig. 1 Linnaei (Fr.) ist xerampelina (Schff.)

Fig. 3 (xeramp.) ist Turci (Bres.) nach J. Schaeffer

Fig. 5 (decolorans) ist roseipes (Bres.)

Tafel XVIII

Fig. 1 grisea (Pers.) ist heterophylla (Fr.) nach Romell

Fig. 2 (chamaeleontina) gehört zu lutea (Huds.)

Tafel XIX

Fig. 1 sardonias (Fr.) ist drimeia od. Queleti nach Konrad

Fig. 5 vaternosa (Fr.) ist Friesii (Bres.)

Tafel XXI Coprinus:

Fig. 4 similis (Bk.) ist domesticus (Pers.)

Fig. 6 tomentosus (Bull.) ist Var. von lagopus (Fr.)

Tafel XXII Coprinus und Bolbitius:

Fig. 1 hemerobius (Fr.) ist Var. von plicatilis (Curt.)

Fig. 3 crenatus (Lasch) ist auricomus (Pat.) nach Kühner

Fig. 5 subtilis (Fr.) ist miser (Karst.) nach Kühner

Fig. 7 conocephalus ist wohl eine Galera

Tafel XXIV Marasmius:

Fig. 2 confluens (Pers.) ist Collybia hariolorum (De Cd.)

Tafel XXV

Fig. 1 peronatus ist urens (Fr.)

Fig. 4 cohaerens ist ceratopus (Pers.)

Fig. 3 Vailantii scheint foetidus zu sein

Tafel XXVII Paxillus:

Fig. 1 inornatus jetzt Clitocybe inornatus (Sow.)

Fig. 2 extenuatus ist Clit. Alexandri nach R. Maire

Fig. 3 popinalis jetzt zu Rhodopaxillus

Fig. 4 lepista ist Rhodopaxillus mundulus (Lasch) nach R. Maire

Tafel XXVIII Paxillus:

Fig. 1 rhodoxanthus jetzt Phylloporus rhod.

Fig. 5 tricholoma (Schw.) jetzt Ripartites tricholoma (Schw.)

Fig. 6 helomorphus ist wohl auch Rip. tricholoma

Tafel XXIX Inocybe:

Fig. 2 carpta wäre plumosa (Fr.) nach Konrad-Mbl.

Tafel XXX Inocybe:

Fig. 3 Trinii ist Rickenii Kallenbach 1924 (jetzt pudica Kühner)

Tafel XXXI *Inocybe*:

- Fig. 2 *relicina* (Fr.) ist *cervicolor* (Pers.) nach Bresadola
 Fig. 3 *Bongardii* (Weinm.) ist *frumentacea* (Bull.)
 Fig. 4 *caesariata* (Fr.) ist wohl *dulcamara* (A. Schw.)
 Fig. 5 *dulcamara* ist *Pholiota ferrigena* nach R. Maire
 Fig. 6 *echinata* (Roth) ist eine *Lepiota*

Tafel XXXII *Hebeloma*:

- Fig. 1 und 2 *H. crustuliniforme* (Bull.)
 Fig. 4 *punctatum* ist *anthracophilum* (R. Maire)
 Fig. 6 *firmum* (Fr.) ist ein *Cortinarius*: *hydrocybe firma*
 Fig. 7 gehört zu *Claviceps*

Tafel XXXIII *Hebeloma*:

- Fig. 1 *radicosum* (Bull.) ist *Pholiota radicata* nach Bresadola
 Fig. 4 *Crassum* (Fr.) jetzt *Inoloma crassum*

Tafel XXXIV *Myxarium*:

- Fig. 2 *arvinaceum* jetzt *mucosum* (Bull.) var. nach Konrad-Mbl.

Tafel XXXV *Phlegmacium*:

- Fig. 6 *pluvium* ist *Phl. vibratile* (Fr.) var.

Tafel XXXVI *Phlegmacium*:

- Fig. 1 *camphoratum* ist wahrscheinlich *caerulescens* (Schff.)
 Fig. 2 *cyanopus* ist *caerulescens* var.
 Fig. 3 *purpurascens* ist *varium* (Schff.) (nach Bresadola)

Tafel XXXVII *Phlegmacium*:

- Fig. 4 *herpeticum* (Fr.) fraglich; vielleicht *scaurum* (Fr.) alt

Tafel XXXVIII *Phlegmacium*:

- Fig. 1 *sulfurinum* (Quél.) gehört zu *elegantius* (Fr.) nach Henry

Tafel XXXIX *Phlegmacium*:

- Fig. 2 und 4 *rapaceum* und *aleuriosmum* gehören zu *multiforme* (Fr.) als var.

Tafel XL *Phlegmacium*:

- Fig. 1 *varicolor* (Pers.) ist *praestans* (Cord.) nach Bresadola
 Fig. 2 *causticum* (Fr.) ist wahrscheinlich *intentum* (Fr.)

Tafel XLI *Phlegmacium*:

- Fig. 4 *crocolitum* (Quél.) gehört zu *triumphans* (Fr.)

Tafel XLII *Phlegmacium*:

- Fig. 3 *cliduchum* (Fr.) ist *olidum* (Lange) oder *turmale* (Fr.)
 Fig. 4 *percome* (Fr.) ist *nanceense* (R. Maire)

Tafel XLIII *Phlegmacium*:

- Fig. 3 *subtortum* (Pers.) ist wohl *olivaceum* oder *infractum* var.
 Fig. 4 *subsimile* (Pers.) gehört zu *infractum* (Pers.)
 Fig. 5 *obsureo-cyaneum* (Secr.) ebenso zu *infractum* (Pers.)

Tafel XLV *Inoloma*:

- Fig. 3 *tophaceum* (Fr.) ist *cotoneum* (Fr.) nach Henry

Tafel XLVI *Inoloma* — *Dermocybe*:

- Fig. 3 *Bulliardii* (Pers.) ist *pseudobolare* (R. Maire)

Tafel XLVII *Dermocybe*:

- Fig. 1 *anomala* (Fr.) soll *Lebretonii* (Quél.) sein, nach Henry
 Fig. 2 *spilomea* (Fr.) ist *anomala* (Fr.) var.
 Fig. 3 *anthracina* (Fr.) ist *phoenicea* (Bull.)

Tafel XLVIII *Telamonia*:

- Fig. 1 *incisa* (Pers.) ist *punctata* (Pers.) nach Lange
 Fig. 2 *paragaudis* (Fr.) ist *anthracina* (Fr.) nach Lange

Tafel XLIX *Telamonia*:

- Fig. 1 *scutulata* (Fr.) ist *pseudo-scutulata* (Henry)
 Fig. 4 *flexipes* (Pers.) ist *paleacea* (Weinm.)

Tafel L *Telamonia* — *Hydrocybe*:

- Fig. 1 *T. macropus* (Pers.) ist *laniger* (Fr.)
- Fig. 3 *T. glandicolor* (Fr.) ist *brunnea* (Pers.)
- Fig. 4 *T. brunnea* (Pers.) ist *bovina*
- Fig. 5 *H. angulosa* (Fr.) ist *renidens* (Fr.) nach Konrad-Mbl.
- Fig. 6 *H. colus* (Fr.) ist *Bulliardi* (Pers.) nach R. Maire

Tafel LI *Hydrocybe*:

- Fig. 1 *candelaris* (Fr.) gehört zu *duracina* (Fr.)

Tafel LII *Hydrocybe*:

- Fig. 1 *diluta* (Pers.) ist *saturata* (Lange)
- Fig. 4 *rubricosa* (Fr.) ist *saturata* (Lange) alt

Tafel LIII *Hydrocybe*:

- Fig. 1 *saturnina* (Fr.) ist *bicolor* (Cke.) nach Henry
- Fig. 7 *fasciata* (Fr.) ist *colus* (Fr.) nach R. Maire
- Fig. 8 *decipiens* (Pers.) ist *fasciata* (Fr.)

Tafel LV *Phopliota*:

- Fig. 1 *aurea* (Pers.) ist *spectabilis* (Fr.)
- Fig. 3 *sphaleromorpha* (Bull.) gehört zu *praecox* (Pers.) als Var.

Tafel LVI *Pholiota*:

- Fig. 3 *blattaria* (Fr.) ist *togularis* var. *filaris* (Fr.) nach R. Maire
- Fig. 7 *marginata* (Batsch) ist var. *minor*

Tafel LVIII *Flammula*:

- Fig. 2 *conissans* (Fr.) ist wohl auch *flavida* (Schff.)

Tafel LIX *Naucoria*:

- Fig. 6 *escharoides* (Fr.) ist *Tubaria furfuracea* (Pers.)

Tafel LX *Naucoria* — *Galera*:

- Fig. 2 *inquilina* (Fr.) scheint *Psilocybe* zu sein
- Fig. 3 *crochula* (Fr.) ist eher *N. escharoides* (Fr.)
- Fig. 7 *ravida* (Fr.) ist eine *Pholiota* sp.
- Fig. 12 *G. rubiginosa* (Pers.) ist *G. tenera* (Schff.)

Tafel LXI *Crepidotus* — *Psalliota*:

- Fig. 2 *Cr. variabilis* (Pers.) jetzt *Dochmiopus* var.
- Fig. 3 *depluens* (Batsch) ist *epibryus* (Fr.)
- Fig. 6 *Ps. campestris* (L.) ist *edulis* (Vitt) nach Julius Schaeffer

Tafel LXII *Psalliota*:

- Fig. 1 *rusiophylla* (Lasch) ist wohl *comtula* (Fr.)
- Fig. 2 *cretacea* (Fr.) scheint *silvicola* (Vitt.) zu sein
- Fig. 5 *perrara* (Schulz) gehört zu *augusta* (Fr.)

Tafel LXIV *Hypholoma*:

- Fig. 1 *cascum* (Fr.) ist *lacrymabundum* (Fr.)
- Fig. 3 *lacrym.* (Bull.) ist *velutinum* (Pers.)

Tafel LXV *Hypholoma*:

- Fig. 3 *epixanthum* (Fr.) ist *radicosum* (Lange)
- Fig. 4 *dispersum* (Fr.) ist *subericaeum* (Fr.) nach Kühner

Tafel LXVI *Psilocybe*:

- Fig. 1 *merdaria* (Fr.) ist eine *Stropharia*
- Fig. 8 *foenisezii* (Pers.) ist ein *Panaeolus* nach Kühner

Tafel LXVIII *Psathyrella*:

- Fig. 2 *gracilis* (Fr.) gehört zu *corrugis* (Pers.) nach Bresadola

Tafel LXIX *Panaeolus*:

- Fig. 7 *leucophanes* (Bk.) gehört zu *papilionaceus* (Bull.)

Tafel LXXI *Pluteus*:

- Fig. 2 *pellitus* (Pers.) ist *cervinus* (Schff.) subsp. *patricius*
- Fig. 6 *phlebophorus* (Dittm.) gehört zu *nanus* (Pers.) als subsp.

Tafel LXXII *Entoloma*:

- Fig. 3 *porphyraeum* (Fr.) ist *Inocybe phaeocephala* (Bull.) nach Bresadola

Tafel LXXXIII *Leptonia* — *Eccilia*:Fig. 3 *solstitialis* (Fr.) ist fraglichFig. 8 *cocles* (Fr.) ist eine *Nolanea* nach Bres.Tafel LXXXIV *Nolanea*:Fig. 3 *pascua* (Pers.) ist *staurospora* (Bres.)Fig. 6 *mammosa* (Fr.) ist *hirtipes* (Schum.)Tafel LXXXV *Amanita*:Fig. 3 *porphyrea* (Fr.) ist *cinerea* (Bres.)Tafel LXXXVII *Amanita*:Fig. 1 *Eliae* (Quél.) gehört zu *junquillea* (Quél.) nach VeselyTafel LXXX *Amanita*:Fig. 2 *spissa* (Fr.) ist zweifelhaft; *pseudo-rubescens* (Herrfurth) oder *spissa* var. *valida* (Fr.) nach VeselyTafel LXXXI *Amanita*:Fig. 1 *strobiliformis* (Vitt.) ist *solitaria* (Bull.) nach BresadolaTafel LXXXII *Lepiota*:Fig. 1 *lenticularis* (Lasch) jetzt *guttata* (Pers.)Fig. 2 *demisannula* (Sow.) ist *medullata* (Fr.) var.Tafel LXXXV *Lepiota*:Fig. 1 *gracilentia* (Krbh.) gehört zu *mastoidea* (Fr.) nach KühnerTafel LXXXVI *Lepiota*:Fig. 1 und 2 *Friesii* und *hispida* (Lasch) gehören zu *acutesquamosa* (Weinm.)Tafel LXL *Tricholoma*:Fig. 5 *triste* (Fr.) gehört zu *terreum* (Schff.)Tafel LILII *Tricholoma*:Fig. 1 *argyraceum* (Bull.) ist auch *scalpturatum* (Fr.) nach Konrad-Mbl.Fig. 5 *ramentaceum* (Bull.) ist *atrosquamosum* (Chev.)Tafel LILIII *Tricholoma*:Fig. 2 *virgatum* (Fr.) ist davon subsp. *sciodes* (Secr.)Fig. 3 *tigrinum* (Schff.) ist *pardinum* (Quél.)Tafel LILIV *Tricholoma*:Fig. 1 *leucocephalum* (Fr.) ist *Collybia maculata* (Sow.)Fig. 3 *chrysenterum* (Bull.) gehört zu *cerinum* (Pers.) als subsp.Fig. 5 *lascivum* (Fr.) gehört zu *album* (Schff.)Tafel ICV *Tricholoma*:Fig. 1 *panaeolum* (Fr.) ist *Rhodopaxillus nimbatus* (Batsch) nach Konr.-Mbl. oder *Lepista Rickenii* Singer (Sydowia II [1948] p. 26)Tafel ICVII *Tricholoma*:Fig. 2 *cinerascens* (Bull.) ist *infumatum* (Bres.)Fig. 4 *molybdinum* (Bull.) ist *trigonosporum* (Bres.)Tafel ICIX *Clitocybe*:Fig. 2 *tornata* (Fr.) gehört zu *cerussata* (Fr.)Fig. 3 *cerussata* (Fr.) gehört zu *nebularis* (Batsch)Fig. 4 *dealbata* (Sow.) gehört zu *rivulosa* (Pers.)Fig. 5 *catinus* (Fr.) gehört zu *infundibuliformis* (Schff.)Tafel C *Clitocybe*:Fig. 2c *laccata* (Scop.); ob nicht *pumila* (Fayod.) Schröter?Fig. 5 *rivulosa* (Pers.) ist *vermicularis* (Fr.)Tafel CII *Clitocybe*:Fig. 1 *cacabus* (Fr.) ist *cyathiformis* (Bull.)Fig. 2 *lentiginosa* (Fr.) gehört zu *inversa* (Scop.)Fig. 5 *vernica* (Fr.) gehört zu *inversa* (Scop.)Tafel CIII *Clitocybe*:Fig. 5 *vibecina* (Fr.) ist *tuba* (Fr.)Tafel CIV *Clitocybe* — *Omphalia*:Fig. 2 *fritilliformis* (Lasch) ist *fulgineipes* (Metrod) Bull. Soc. myc. Fr. 55 (1939) t. II 6Fig. 5 *hydrogramma* (Bull.) ist *Clitocybe gallinacea* (Scop.) nach Kühner

Tafel CV *Omphalia*:

- Fig. 2 *maura* (Fr.) ist eine *Mycena* nach Kühner
 Fig. 3 *striaepilea* (Fr.) ist *asterospora* (Lange)
 Fig. 4 *hepatica* (Batsch) ist *demissa* (Fr.) Karst.
 Fig. 6 *integrella* (Pers.) ist *Mycena ignobilis* (Josserand)
 Fig. 7 *litua* (Fr.) scheint *hydrogramma* (Bull.) zu sein
 Fig. 8 *bibula* (Qu.) ist *Omph. Wynniae* (Bk. et Br.)
 Fig. 10 *grisea* (Fr.) ist *Mycena (vulgaris) cinerella* (Karst.)
 Fig. 15 *plumbea* (Fr.) ist *faginea* (Cejp.)
 Fig. 17 *dumosa* (Fr.) ist *ventosa* (Fr.) nach Bresadola

Tafel CVI *Collybia*:

- Fig. 1 *radicata* (Reth.) jetzt *Mucidula radicata*
 Fig. 3 *crassipes* (Schff.) ist *semitalis* (Fr.), früher als *Tricholoma*

Tafel CVII *Collybia*:

- Fig. 1 *platyphylla* (Pers.) ist *grammocephala* (Bull.) nach Bresadola

Tafel CVIII *Collybia*:

- Fig. 3 *exsculpta* (Fr.) ist *dryophila* sbsp. *fornicularis* (Fr.)
 Fig. 6 *stipitaria* (Fr.) gehört zu *Marasmius caulicinalis* (With.)
 Fig. 9 *ozes* (Fr.) ist *putida* (Fr.)

Tafel CIX *Collybia* — *Mycena*:

- Fig. 1 und 3 *esculenta*, *conigena* (Pers.) jetzt *tenacella* (Pers.)
 Fig. 10 *dilatata* (Fr.) ist *stylobates* (Pers.) nach Kühner

Tafel CX *Mycena*:

- Fig. 4 *alcalina* (Fr.) ist *inclinata* oder *maculata* (Karst.) nach Kühner
 Fig. 5 *aurantiomarginata* (Fr.) ist *elegans* (Pers.)
 Fig. 6 *vitis* (Fr.) ist *filipes* (Bull.)
 Fig. 9 *metata* (Fr.) gehört zu *vitrea* v. *tenella* (Fr.)

Tafel CXI *Mycena* — *Pleurotus*:

- Fig. 2 *leptocephala* (Pers.) ist *alcalina* (Fr.)
 Fig. 3 *calopus* (Fr.) ist *inclinata* (Fr.)
 Fig. 4 *luteoalba* (Bolt.) ist *xantholeuca* (Kühner)
 Fig. 6 *plicosa* (Fr.) ist *avenacea* (Fr.)
 Fig. 9 *Pl. geogenias* (Cand.) jetzt *petaloides* (Bull.)

Tafel CXII *Pleurotus*:

- Fig. 3 *corticatus* (Fr.) gehört zu *dryinus* (Pers.)

Zur Literatur:

- Bresadola, *Iconographia* 26 Bdn.
 R. Maire in Konrad-Maublanc, *Icones Selectae* (um 1930)
 Kühner in Bull. Soc. myc. de France und sonstige Arbeiten
 Lange, *Studies in the Agarics of Denmark* (1915—30)
 Henry, über *Cortinarius* in Bull. Soc. myc. de France (um 1930—40)
 Knauth-Neuhoff und Jul. Schaeffer in *Pilze Mitteleuropas*, Atlas Bd. II und III
 Vesely und Cejp in *Atlas des Champignons*. Bd. I und IV (um 1936, 38)

Bestimmungstabelle für die Schirmpilze (*Lepiota*-Arten)

Von Dr. Walther Neuhoff-Rellingen.

Die Schirmpilze sind fast ausschließlich erdbewohnende, verhältnismäßig dünnfleischige Blätterpilze, meist von schlank schirmförmiger Tracht, weißsporig (in den von einzelnen Autoren ausgeschiedenen Untergattungen *Aspidella* Gilb. und *Chromophylla* Fayod auch blaßgrünlich oder bräunlich); die Lamellen werden anfangs durch einen Schleier (*velum partiale*) verdeckt, der als deutlicher, bleibender oder vergänglicher Ring

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für Pilzkunde](#)

Jahr/Year: 1950

Band/Volume: [21_7_1950](#)

Autor(en)/Author(s): Killermann Sebastian

Artikel/Article: [Neubenennungen bei Ricken, Die Blätterpilze \(Leipzig 1915\) 12-17](#)