

## Beiträge zur Revision M. Britzelmayrs „Hymenomyceten aus Südbayern“ 4

### Die Gattungen *Tephrocye*, *Lyophyllum*, *Calocybe* und *Hygrophoropsis* (*Tricholomataceae*) in der Augsburgur Umgebung

Von J. Stangl und A. Bresinsky

In diesem Beitrag werden Arten der Gattungen *Tephrocye* (7), *Lyophyllum* (9), *Calocybe* (5) und *Hygrophoropsis* (1) angeführt. Mit Ausnahme von zwei bei Britzelmayr gut dargestellten Pilzen konnten alle angeführten Arten von den Verfassern selbst beobachtet werden. Bei Britzelmayr sind die behandelten Arten teils bei *Agaricus* (Untergattung *Tricholoma*, *Clitocybe*, *Collybia* und *Pleurotus*) sowie bei *Cantharellus* angeführt, was für die Auswertung oft erhebliche Schwierigkeiten mit sich bringt.

Wichtige Abkürzungen (vgl. auch Z. f. Pilzk. 30, 95—106, 1964): Aqu. = Aquarellbeleg vorhanden, F. = Fundort, M. = Beleg im Staatsherbarium München, ! = Farbabbildung in Britzelmayr (Britz.) wird als korrekt angesehen. Durch die vierstelligen Ziffern werden die Meßtischblattgrundfelder angegeben, in denen die Sippen vorkommen (vgl. Karte in Beitrag 1).

Für die Nomenklatur ist ab Beitrag 4 die dritte Auflage von M. Moser in H. Gams, Kleine Kryptogamenflora, maßgeblich. Für die Bereitstellung der Korrekturfahnen dieses Buches danken die Verf. Herrn Prof. Dr. M. Moser.

#### *Tephrocye* Donk

72. *Tephrocye admissa* (Britz.) Mos.  
 Britz. 11, 99; 83, 446; 104, 548, 556; Haspelmoor als *Agaricus (Collybia) admissus* Britz.  
 Im Untersuchungsgebiet nicht mehr beobachtet.  
 7732
73. *Tephrocye atrata* (Fr. per Fr.) Donk  
 Britz. 143, 691 Mödishofen als *Agaricus (Collybia) atratus!*  
 Im Untersuchungsgebiet nicht beobachtet.  
 7629
74. *Tephrocye carbonaria* (Vel.) Donk — (Aqu.)  
 Britz. 30, 225 als *Agaricus (Collybia) ambustus!*  
 M: Aystetten 28. 9. 1963 leg. J. Stangl  
 7530. — 28. September bis 29. Oktober
75. *Tephrocye inolens* (Fr.) Mos. — (Aqu.)  
 (Britz. 47, 319 als *Agaricus (Collybia) inolens f. umbonatus?*)  
 M: Siebentischwald bei Augsburg, 21. 9. 1957; leg. A. Bresinsky.  
 Westerholz, 9. 10. 1965; leg. J. Stangl.  
 7629, 7631 (4 F.). — 10. Oktober bis 3. Dezember
76. *Tephrocye palustris* (Peck) Donk — (Aqu.)  
 Britz. 11, Haspelmoor, als *Agaricus (Collybia) obstans* Britz.!  
 Britz. 65, 370 als *Agaricus (Collybia) clusilis?*  
 M: Haspelmoor, 12. 8. 1959; leg. J. Angerer.  
 Haspelmoor, 1. 9. 1965; leg. J. Stangl  
 7332. — 31. August bis 27. Oktober

77. *Tephrocybe platypus* (Kühn.) Mos.  
M: Geltendorf, 12. 9. 1965; leg. J. Stangl  
7832. — September
78. *Tephrocybe rancida* (Fr.) Donk — (Aqu.)  
Britz. 11, 98 Parkanlagen, Wälder; als *Agaricus (Collybia) rancidus!*  
M: Wellenburg 5. 10. 1963; leg. J. Stangl  
Streitheim 25. 9. 1966; leg. J. Stangl  
7530 (1 F.), 7630 (1 F.). — 25. September bis 5. Oktober.
- Lyophyllum Karst.**
79. *Lyophyllum connatum* (Schum. ex Fr.) Sing.  
(Britz. 40, 276 Bergwälder als *Agaricus (Clitocybe) connatus f. micheliana!*)  
M: Burgwalden an der Straße nach Reinhardshausen; 22. 9. 1957;  
leg. A. Bresinsky  
Derchinger Forst; 30. 9. 1961; leg. J. Stangl.  
7530 (2 F), 7630 (3 F), 7631 (1 F), 7632 (1 F), 7732 (1 F), 7829 (1 F), 7832  
(1 F). — 29. August bis 7. Oktober.
80. *Lyophyllum decastes* (Fr.) Sing. — (Aqu.)  
Britz. 19, 189 Augsburg als *Agaricus (Clitocybe) tumidosus* Britz.!  
(Britz. 17, 190: *Agaricus [Clitocybe] decastes*, nicht passend)  
M: Haspelmoor, 15. 10. 1961; leg. J. Stangl det. Dr. Neuhoff.  
7530 (1 F), 7629 (1 F), 7631 (3 F), 7632 (1 F), 7732 (1 F). — 22. Juni bis  
10. November.
81. *Lyophyllum fumato-foetens* (Secr.) J. Schff.  
M: Haspelmoor 3. 10. 1962 (Tagung der D. G. f. P.) det. Dr. Haas  
7630 (1 F), 7730 (1 F). — 16. September bis 3. Oktober
82. *Lyophyllum fumosum* (Pers. ex Fr.) Kühn. u. Romagn. ex Orton  
Britz. 45, 309 u. 99, 516; Augsburg etc. als *Agaricus (Clitocybe) tumidosus*  
Britz!  
(Britz. 67, 392 als *Agaricus (Tricholoma) tigrinus?*)  
M: Wittelsbacher Park, Juli 1960; leg. J. Stangl  
7330 (1 F), 7530 (1 F), 7631 (4 F), 7831 (1 F). — 16. Mai bis 2. Dezember.
83. *Lyophyllum immundum* (Bk.) Kühn. — (Aqu.)  
Britz. 154, 726 als *Agaricus (Clitocybe) fumosus* Pers.!  
Britz. schreibt auf Seite 10: Unter den Baumanlagen der Schießstätte am Rosenau-  
berg, Herbst. Die Baumanlagen am Rosenauberg gehören heute zum Wittels-  
bacher-Park, in dem alljährlich *Lyophyllum immundum* zu finden ist. Auf Seite  
384 schreibt Britz.: Herbst, Waldrand bei Straßberg; auch bei Straßberg haben  
wir *Lyophyllum immundum* schon gefunden.  
Britz. 113, 575 Buchloe als *Agaricus (Tricholoma) gravabilis* Britz.  
Britz. 113, 576 u. 120, 627 Herbst Heiden, Buchloe als *Agaricus (Tricholoma)*  
*enudatus* Britz.

(Britz. 58, 346, 73, 413, 76, 423 als *Agaricus* [*Tricholoma*] *immundus*?)  
 (Britz. 92, 483 u. 112, 574 als *Agaricus* [*Tricholoma*] *subimmundus* Britz.?)  
 Bemerkung: Die Abbildungen von *Agaricus immundus* u. *Agaricus subimmundus* stimmen mit der Art recht gut überein, aber die Sporenmaße (8—10×4 µ, 6—7×3 µ) passen nicht.  
 M: Wittelsbacher-Park, 9. 8. 1962; leg. J. Stangl  
 7330 (1 F), 7630 (1 F), 7730 (1 F). — 5. Juni bis 2. November.

84. *Lyophyllum infumatum* (Bres.) Kühn.  
 (Britz. 44, 306 u. 78, 432 Bergwälder als *Agaricus* [*Tricholoma*] *adscriptus* Britz!)  
 (Britz. 24, 165 u. 161, 752. Bergwälder als *Agaricus* [*Tricholoma*] *deliberatus* Britz?)  
 M: Mertingen (Gemeindewald) 30. 7. 66 leg. J. Stangl  
 7330 (1 F). — Juli 1966
85. *Lyophyllum ozes* (Fr.) Sing.  
 Britz. 47, als *Agaricus* (*Collybia*) *ozes*!  
 M: Siebenbrunn bei Augsburg, 8. 9. 1957; leg. A. Bresinsky.  
 7631 (2 F). — 8. September bis 10. Oktober.
86. *Lyophyllum patulum* (Fr.) Neuhoff (= *Clitocybe decastes* ss. Bres.)  
 Britz. 114, 578 Augsburg, Herbst, Wälder; als *Agaricus* (*Tricholoma*) *patulus*!  
 Augsburg, Siebentischwald; 4. 10. 1962 während der Tagung der D. G. f. P.  
 leg. Bach, det. Dr. Neuhoff. (Briefliche Mitteilung von Herrn Dr. Neuhoff.)  
 7631 (1 F). — Oktober
87. *Lyophyllum ulmarium* (Bull. ex Fr.) Kühn. — (Aqu.)  
 Britz. 127, 653 u. 165, 764 bei Gablingen an italienischen Pappeln; bei Langweis  
 an Pappelstümpfen; Herbst. Als *Agaricus* (*Pleurotus*) *ulmarium* Bull.!  
 M: Siebentischwald, 2. 12. 1961; leg. J. Stangl.  
 7631 (4 F). — 20. August bis 3. Dezember (alle Funde an Ulmen).

#### *Calocybe* Kühn. ex Donk

88. *Calocybe carnea* (Bull. ex Fr.) Kühn. — (Aqu.)  
 Britz. 134, 666 Langweid bei Augsburg, als *Agaricus* (*Tricholoma*) *convexoplanus* Britz!  
 M: Wellenburg, 26. 8. 1963; leg. J. Stangl  
 7630. — August
89. *Calocybe chrysenderon* (Bull. ex Fr.) Sing. — (Aqu.)  
 (Britz. 160, 748 als *Agaricus* [*Tricholoma*] *chrysenderon*?)  
 M: Siebentischwald, 1959; leg. A. Bresinsky.  
 Siebentischwald, 7. 9. 1960; leg. J. Stangl.  
 7330 (1 F), 7630 (1 F), 7631 (1 F), 7831 (1 F). — 18. August bis 10. Oktober
90. *Calocybe gambosa* (Fr.) Donk — (Aqu.)  
 Britz. 4, 1 u. 86, 453 Augsburg etc. als *Agaricus* (*Tricholoma*) *allescheri* Britz!  
 M: Bergheim, 8. 5. 1960; leg. J. Stangl.  
 7330 (1 F), 7529 (1 F), 7531 (1 F), 7532 (1 F), 7630 (5 F), 7631 (6 F), 7632  
 (1 F), 7729 (1 F), 7730 (2 F), 7731 (1 F), 7831 (1 F). — 24. April bis 7. Juli.

91. *Calocybe ionides* (Bull. ex Fr.) Donk. — (Aqu.)  
 Britz. 92, 487 Augsburg als *Agaricus (Tricholoma) lilacinus!*  
 Britz. 93, 492 Wälder um Augsburg, als *Agaricus (Tricholoma) ionides f. minimus?*  
 Britz. 115, 583 Wälder um Augsburg, als *Agaricus (Tricholoma) ionides f. lamellis roseis?*  
 M: Siebentischwald, 17. 6. 1963; leg. J. Stangl  
 7631 (4 F). — 14. Juni bis 21. Juli
92. *Calocybe persicolor* (Fr.) Sing. — (Aqu.)  
 Britz. 77, 427 Haspelmoor als *Agaricus (Tricholoma) pravus!*  
 (Britz. 134, 667 als *Agaricus [Tricholoma] persicolor*  
 Britz. 26, 159 Augsburg?  
 M: Mertingen (Gemeindewald), 17. 6. 1965; leg. J. Stangl  
 7330 (1 F), 7631 (1 F). — 17. Juni bis 31. Juli.

#### *Hygrophoropsis* (Schroet. in Cohn) R. Mre.

93. *Hygrophoropsis aurantiaca* (Wulf. ex Fr.) R. Mre. — (Aqu.)  
 Britz. 528, 3 Wälder um Augsburg als *Cantharellus aurantiacus!*  
 Britz. 528, 2 An alten Baumstümpfen in den Wäldern um Augsburg, als  
*Cantharellus Friesii*  
 M: Augsburg, 1959; leg. J. Stangl.  
 Welden, 10. 12. 1965; leg. J. Stangl  
 verbreitet in: 7330, 7430, 7432, 7433, 7529, 7530, 7531, 7532, 7629, 7630, 7631,  
 7632, 7729, 7730, 7731, 7732, 7829, 7830, 7831, 7832, — 28. Juni bis  
 8. Dezember.

## Beiträge zur Revision M. Britzelmays „Hymenomyceten aus Südbayern“ 5

### Die Gattungen *Tricholomopsis* und *Collybia* (Tricholomataceae) in der Augsburger Umgebung

Von J. Stangl und A. Bresinsky

In diesem Beitrag werden Arten der Gattung *Collybia* (15) und der Gattung *Tricholomopsis* (1) aufgeführt. Alle genannten Arten wurden von den Verfassern im Untersuchungsgebiet selbst beobachtet.

#### *Tricholomopsis* Sing.

94. *Tricholomopsis rutilans* (Schff. ex Fr.) Sing. — (Aqu.)  
 Britz. 28, 144 Augsburg-Langweid als *Agaricus (Tricholoma) rutilans!*  
 Britz. 27, 145 Augsburg-Steppach, Dinkelscherben, Krumbad als  
*Agaricus (Tricholoma) variegatus*  
 M: Siebentischwald, 1. 9. 1966; leg. J. Stangl.  
 Verbreitet in: 7330, 7430, 7432, 7433, 7529, 7530, 7531, 7532, 7629, 7630,  
 7631, 7632, 7729, 7730, 7731, 7732, 7829, 7830, 7831, 7832. — 6. Juli  
 bis 18. November.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für Pilzkunde](#)

Jahr/Year: 1967

Band/Volume: [33\\_1967](#)

Autor(en)/Author(s): Stangl Johann, Bresinsky Andreas

Artikel/Article: [Beiträge zur Revision M. Britzelmayrs „Hymenomyceten aus Südbayern“ 4 Die Gattungen Tephrocybe, Lyophyllum, Calocybe und Gyrophoropsis \(Tricholomataceae\) in der Augsburgener Umgebung 26-29](#)