

PILZFUNDE WÄHREND DER TAGUNG DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR PILZKUNDE IN MÜNCHEN

VOM 9. 9. BIS 13. 9. 1966.*

Örtliche Tagungsorganisation: Dr. A. B r e s i n s k y
und Verein für Volkstümliche Pilzkunde München (Vorsitzender: A. N e u n e r)

zusammengestellt von J. S t a n g l

Abkürzungen:

A = Augsburg und Umgebung
E = Zwischen Eching und Perchting (8033)
Ga = Garmisch, Exkursion am 1. 9. (8532)
G = Garchinger Heide und Echinger Lohe, besammelt von F. Einhellinger (7735)
I = Isartal, Exkursion am 10. 9. (7935)
IN = Isartal, besammelt von Neuner und Egner (7935)
K = Kochelbergalm und Farchant (8432 und 8532)
O = Zwischen Otterfing und Sauerlach, besammelt von J. Gregor und Mitgliedern des Pilzvereins München (8035)
P = Pullach (7935)
S = Seefeld am Pilsensee, Exkursion am 12. 9. (7933)
V = Völlenbach (8232)

Die Zahlen in Klammern geben die Nummern der Gradabteilungsblätter an, in denen der besammelte Ort liegt.

Agaricales

Geordnet nach der Flora von M. M o s e r, Blätter- und Bauchpilze, 2. Aufl. 1955. Da die Nomenklatur an dieses Buch angelehnt wurde, erübrigt sich die Zitierung von Autorennamen.

Strobilomyces floccopus: A, I

Porphyrellus pseudoscaber: Ga, O

Gyroporus castaneus: Ga

Boletinus cavipes: Ga, S

Suillus aeruginascens: S; - *bovinus*: A; K; - *grevillei*: A; - *luteus*: München; - *tridentinus*: Ga, S; - *variegatus*: A, I, IN

Leccinum aurantiacum: Ga, I, P; - *carpini*: Ga; - *scabrum*: IN, S; - *testaceoscabrum*: A

Boletus calopus: A. S; - *edulis*: A, Ga, I, IN; - *erythropus*: A

Tylopilus felleus: P

* Es wird um Verständnis dafür gebeten, daß folgende Liste der Pilzfunde während der Münchener Tagung 1966 erst jetzt veröffentlicht wird. Die längere Abwesenheit des 2. Schriftleiters dieser Zeitschrift hat diese Verzögerung bedingt.

Xerocomus badius: A, IN, S; - *chrysenteron*: E, Ga, I, IN, S, V; - *subtomentosus*: A

Paxillus atrotomentosus: A, S; - *filamentosus*: Ga; - *involutus*: A, I; - *panuoides*: A

Gomphidius glutinosus: A, Ga, K, I, S; - *roseus*: K; - *rutilus*: A

Hygrophorus agathosmus: A, Ga, (weiße Form: K); - *caprinus*: Ga; - *chrysaspis* (= *cossus*): A, Ga, I, IN, K, S; - *chrysodon*: E, I; - *discoideus*: E, Ga, I; - *eburneus*: S; - *erubescens*: E, Ga, IN, S, (Jachenau); - *olivaceo-albus*: A; - *poetarum*: E, I, S; - *pudorinus*: Ga

Camarophyllus lacmus: Ga, - *niveus*: A, G; - *pratensis*: Ga, K

Hygrocybe chlorophana: Ga; - *coccinea*: Ga; - *nigrescens*: Ga; - *nitiosa*: Ga, G; - *punicea*: Ga, K; - *miniata*: G; - cf. *splendidissima*: G

Asterophora lycoperdoides: S; - *parasitica*: N

Lyophyllum rancidum: IN (bei Schäftlarn)

Clitocybe clavipes: S, P; - *geotropa*: Ga, S; - *hydrogramma*: G; - *odora*: S; - *nebularis*: A, Ga, I, S, - *vernica*: A, I; - *gilva*: S

Laccaria amethystina: A, Ga, I, IN, S, V; - *laccata*: A, E, Ga, I

Tricholomopsis rutilans: A, K

Collybia butyracea var. *asema*: A, I, S; - *confluens*: Ga, I, S; - *distorta*: A; - *dryophila*: A; - *hariolorum*: A, I; - *maculata*: E, Ga, I, S; - *peronata*: A, Ga, G, I, IN, P

Armillariella mellea: Ga

Tricholoma acerbum: Fabrikgrundstück bei Pullach Lkr. München (durch A. Neuner); - *aurantium*: I; - *flavobrunneum*: S; - *fucatum*: I; - *inamoenum*: A, E, Ga, I, S; *irinum*: I; - *lascivum*: G, I; - *scalpturatum*: A; *saponaceum*: Ga, I, IN, S, V; - *sejunctum*: I, S; - *sulphureum*: A, E, I, IN, S; - *ustale*: A, Ga, I, IN, S; - *vaccinum*: A, Ga, S; - *virgatum*: I, IN, S

Cantharellula cyathiformis: Ga, O

Leucopaxillus giganteus: Jachenau

Melanoleuca melaleuca: Ga, G, S, Jachenau

Lentinellus cochleatus: O; - var. *inolens*: G

Panellus stipticus: A

Schizophyllum commune: I

Oudemansiella mucida: Ga, I, IN; - *platyphylla*: A, E, I, IN; - *radicata*: E, I, IN, S

Flammulina velutipes: A

Marasmius alliaceus: I; - *brassicolens*: IN; - *cohaerens*: Ga; *lupuletorum*: Allacher Lohe; - *perforans*: V; - *rotula*: I; - *wynnei*: Ga, E, I

Xeromphalina campanella: A

Mycena crocata: I, IN; - *epipterygia*: O; - *fibula*: I; - *galericulata*: O, S - *luteoalcalina*: S; - *pelianthina*: S; - *pura*: A, E, Ga, I, IN, S, V; - *rosella*: O;

Lepista densifolia: Ga; - *glaucoana*: Ga, I, P, S; - *nuda*: A, Ga, I, IN, S; - *panaeola*: G; - *personata*: G, I

Rhodocybe nitellina: S, I, IN, P

Clitopilopsis popinalis: G

Clitopilus prunulus: I, S, Jachenau

Rhodophyllus ardosiacus: G; - *excentricus*: G; - *griseocyaneus*: G; - *incanus*: G; - *nidosus*: I; - *nitidus*: V; - *rhodopoli*: E; - *sericellus*: G;

Pluteus cervinus: A, I; *cinereus*: I; - *lutescens*: A

Amanita citrina: A, I; - *inaurata*: Ga, K; - *muscaria*: A, Ga, P, S; - *phalloides*: I; - *porphyrea*: A, I; - *rubescens*: A, I, IN, S; - *spissa*: A; - *strobiliformis*: Anger Lohe; - *vaginata*: A, Ga, K, IN; - *virosa*: A

Limacella glioderma: S, I

Macrolepiota mastoidea: G, S; - *procera*: A, S; - *rhacodes*: A, Ga, S; - *rhacodes* var. *hortensis*: G

Lepiota adulterina: IN; - *acutesquamosa*: Ga, S, I; - *clypeolaria*: A, Ga, I, S - *cristata*: A, Ga, S

Drosella fracidia: A, I

Agaricus abruptibulbus: S; - *augustus*: K; - *haemorrhoidarius*: Ga, S; - *macrosporus*: G; - *meleagris*: G; - *silvaticus*: A; - *xanthoderma*: G

Cystoderma amiantinum: Ga, I, K; - *carcharias*: Ga, I, K, S; - *granulosum*: G

Crepidotus mollis: I, O

Ripartites tricholoma: G

Rozites caperata: Jachenau

Hebeloma crustuliniforme: Ga; - *edurum*: A, Ga, I, V; - *longicaudum*: V; - *radicosum*: I, IN, S; *sinapizans*: Ga, G, I, IN, S

Inocybe bongardii: I; - *casimiri*: A, I; - *corydalina*: I, S; - *cervicolor*: A; - *dulcamara*: A; - *fastigiata*: A, E, S; - *fibrosa*: I, S; - *geophylla*: E, Ga, I, S; - *patouillardi*: A; - *petiginosa*: I, S; - *piriodora*: A, S; - *terrigena*: Ga, S

Galerina marginata: E, Ga, S

Gymnopilus penetrans: I, S, V

Dermocybe cinnamomeo-lutea: A, Ga; - *croceifolia*: A, S; - *cinnabarina*: E; - *sanguinea*: A, Ga, I, S, V; - *semisanguinea*: A, O; - *purpureo-badia*: Aschbach b. Aibling (Neuner)

Cortinarius cotoneus: Ga; - *gentilis*: A, Ga; - *limoneus*: O; - *trophaceus*: V; - *venetus*: IN, V, S; - *violaceus*: S

Hydrocybe armillata: A; - *bivela*: Ga, K, V; - *bulliardii*: IN; - *junghuhnii*: G; *paleacea*: V; - *paragaudis*: A

Myxarium collinitum: A; - *croceocoeruleum*: S; - *delibutum*: A, Ga, I; - *vibratile*: A, IN

Phlegmacium allutum: Ga; - *amoenolens*: I; - *anomalum*: Ga, G; - *balteatocumatile*: Ga; - *bolare*: I, V; - *calochroum*: S; - *camphoratum*: Ga, I; - *cephalixum*: I, V; - *caerulescens*: S; - *elegantius*: Ga, S; - *glaucopus*: Ga, IN, V; *infractum*: Ga, IN, V, S, - *largum*: S; - *odorifer*: K, Ga, I, IN, V; - *percome*: K, Ga, I, N, V; - *praestans*: Ga, S; - *russeoides*: S; - *spilomeum*: Ga; - *subtriumphans*: Jachenau, Ga, I, S; - *traganum*: I, V; *variecolor*: E, Ga, I, IN, S, V; - *varium*: I, IN, S, V; - *vitellinum*: I, IN, V

Leucocortinarius bulbiger: I

Agrocybe erebia: A, I

Pholiota astragalina: IN (Schäftlarn); - *aurivella*: A; - *flammans*: O; - *squarrosa*: A

Kuehneromyces mutabilis: A, IN, I, S

Nematoloma capnoides: A, S; - *elongatum*: Schluifelder Moor; - *fasciculare*: A, S; - *radicosum*: A, S; - *sublateritium*: A, E, S

Stropharia aeruginea: I; - *hornemannii*: Ga am Eibsee; Lochen nördlich Dietramszell.

Psathyrella lacrymabunda: Jachenau, zw. Sauerlach u. Arget

Coprinus comatus: I; - *picaceus*: I; - *micaceus*: G

Russula alutacea: E; - *claroflava*: A; - *cyanoxantha*: E, K, Ga; - *decolorans*: A; - *delica*: V; - *densifolia*: Ga, I, S; - *emetica*: Ga, S; - *fellea*: A, I, S; - *foetens*: S; - *fragilis*: A; - *integra*: I; - *laurocerasi*: O; - *lepida*: S; *mairei*: A; - *nigricans*: A, I, IN, V; - *ochroleuca*: A, I, V; - *olivacea*: S; - *paludosa*: A; - *pulchella*: A; - *queletii*: K, Ga, V; - *turci*: A, V; - *vesca*: A, I; - *violacea*: S; - *viscida*: E; - *xerampelina*: A, Ga, I, S, P;

Lactarius acris: I, S; - *badiosanguineus*: Ga; - *blennius*: A, E, Ga, I, IN, K, S; - *camphoratus*: I, V; - *fuliginosus*: Ga; - *glyciosmus*: A; - *helvus*: A, V; *lignyotus*: A, Ga, V; - *mitissimus*: E, S; - *necator*: A; - *pallidus*: IN, K, S; - *pergamenus*: IN; - *picinus*: I, S; - *pterosporus*: I, IN; - *piperatus*: I, O; - *rufus*: A, I, V; - *quietus*: A, G; - *scrobiculatus*: Ga, S, V; - *semisanguifluus*: A, Ga, IN, S; - *subdulcis*: A, S; - *subsalmoneus*: K; - *theiogalus*: A, V; - *tithymalinus*: I; - *torminosus*: I; - *trivialis*: A, I; - *uvidus*: Ga, I, IN, S; - *vellereus*: E, IN, I, S; - *vietus*: I; - *volemus*: A, S

Gasteromycetales

Geordnet nach der Flora von M. Moser, Blätter- und Bauchpilze, 2. Auflage 1955.

Bovista tomentosa: G

Rhizopogon rubescens: ; *Tulostoma brumale*: Speichersee bei Ismaning.

Scleroderma aurantium Vaill. ex Pers.

Cyathus striatus (Huds.) Wild.: O

Calvatia uteriformis (Bull.): G

Lycoperdon perlatum: I; V; - *excipuliforme*: A, S; - *pyriforme*: G; - *echinatum*: I, IN

Geastrum pseudostriatum: ; - *rufescens* (= *fimbriatum*): S

Aphylophorales

In alphabetischer Reihenfolge. Nomenklatur für die Porlinge nach Jahn 1963.

Porlinge:

Albatrellus confluens: A, Jachenau: - *ovinus*: Ga

Bjerkandera adusta: A, E; - *fumosa*: A

Corirolellus serialis: A

Fomes fomentarius: I, IN

Fomitopsis annosa: A, S; - *pinicola*: A, K, Ga

Ganoderma applanatum: I, IN; - *lucidum*: G

Gloeophyllum abietinum: A; - *sepiarium*: A, S; - *trabeum*: A

Hapalopilus nidulans: I

Inonotus radiatus: A; - *radiatus* var. *nodulosus*: A

Osmoporus odoratus: A, I

Oxyporus populinus: A

Phellinus conchatus: A; - *contiguus*: A; - *ferruginosus*: A; - *igniarius*: A; - *pomaceus*: A; - *punctatus*: A; - *ribis* fo. *evonymi*: A

Piptoporus betulinus: Ga, IN, I, S

Polyporus brumalis: I

Polystictus tomentosus: Kapuziner Hölzl bei Nymphenburg

Trametes confragosa: I; - *extenuata*: A, G; - *hirsuta*: S; - *gibbosa*: A; - *versicolor*: A, E, I, S

Tyromyces caesius: A, S; - *ptychogaster*: A; - *stipticus*: A

Übrige Aphyllophorales:

Cantharellus cibarius: A, Ga, I, S; - *friesii*: O; - *lutescens*: Ga, I, S, V; - *tubaeformis*: I, IN, S, V

Clavariadelphus pistillaris: Ga, IN, S; - *truncatus*: Ga, IN

Clavulina cinerea: V

Clavulinopsis fusiformis: Ga

Craterellus cinereus: Anger Lohe; - *cornucopioides*: E, I, S

Hydnellum aurantiacum: I; - *nigrum*: IN; - *suaveolens*: V

Hydnum repandum: A, K, I, IN, S, V

Pterula multifida:

Ramaria aurea: Ga; - *nigrescens*: G; - *ochraceovirens*: A; - *botrytis*: A

Sarcodon imbricatum: Ga, I, IN, S

Sparassis crispa: A

Thelephora palmata: A, O; - *terrestris*: O, A

Trogia crispa

Tremellales

Auricularia mesenterica: Ga

Guepinia helvelloides: A

Pseudohydnum gelatinosum: IN

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für Pilzkunde](#)

Jahr/Year: 1969

Band/Volume: [35_1969](#)

Autor(en)/Author(s): Stangl Johann

Artikel/Article: [PILZFUNDE WÄHREND DER TAGUNG DER DEUTSCHEN
GESELLSCHAFT FÜR PILZKUNDE IN MÜNCHEN VOM 9. 9. BIS 13. 9. 1966. 105-
109](#)