

Zeitschrift für Pilzkunde

Organ der Deutschen Gesellschaft für Pilzkunde e. V.

Bestimmung der Schaeffer'schen Pilzabbildungen.

Von Prof. Dr. S. Killermann-Regensburg.

Taf.	jetziger Name	Name bei Schaeff.	bei Persoon
1.	<i>Stropharia a ruginosa</i> (Curt.) Quél.	Ag. viridulus Grüngelblicher Blätterschw.	Ag. aerug. Curt.
2.	<i>Hygrophorus conicus</i> (Scop.) Fr.	„ conicus Kegelförmiger Blätterschw.	Fig. 6 coccineus 9 tristis; sonst conicus
3.	<i>Cortinarius violaceo-cinereus</i> (Pers.) Fr.	„ violaceus violettfarbiger Blätterschw.	A. violacea-cinereus
4.	<i>Cortinarius cinnamomeus</i> (L.) Fr.	„ croceus Safrangelber Blätterschw.	Ag. cinnamomeus L.
5.	<i>Lactarius volemus</i> Fr.	„ lactifluus Brödling (Brätling)	Ag. lactifluus L.
6.	<i>Coprinus truncorum</i> (Sch.) Fr.	„ truncorum Gelblicher Kappenschw.	Ebenso
7.	„ ovatus (Sch.) Fr.	„ ovatus Eiförmiger Mistschw.	„
8.	„ clavatus Fr.	„ cylindricus Walzenf. Mistschw.	„
9.	<i>Pholiota mutabilis</i> (Sch.) Quél.	„ mutabilis Stockschwamm	Ag. caudicinus
10.	<i>Pluteus cervinus</i> (Sch.) Quél.	„ cervinus Rehfarbiger Blätterschw.	Ag. pluteus Batsch
11.	<i>Lactarius deliciosus</i> (L.) Fr.	„ deliciosus L. Eßbarer Hirschling, Reizker	Ebenso
12.	„ torminosus (Sch.) Fr.	„ torminosus Birkenreizker	„
13.	<i>Clitocybe laccata</i> (Scop.) Quél.	„ laccatus Lackroter Blätterschw.	„
14.	<i>Tricholoma terreum</i> Schaeff. ¹ (nach Bres. in litt.)	„ multiformis Vielgestaltiger Blätterschw.	„
15.	Fig. 1—3 <i>Russula aurata</i> (With.) Fr. Fig. 4—6 <i>Russula rubra</i> Fr. 2, 5, 6 R. <i>sardonia</i> Fr. ² (nach Romell).	„ emeticus Speitäubling	Fig. 1—3 <i>esculenta</i> Fig. 5—6 <i>emetica</i>
16.	Fig. 1—3 <i>Russ. fallax</i> (Sch.) Fr. Fig. 4 <i>Russula nauseosa</i> (P.) Fr. Fig. 5—6 <i>Russula sardonia</i> Fr.	„ „	Fig. 1—3 <i>rosea</i> Fig. 4 <i>ochroleuca</i>
17.	<i>Coprinus fuscescens</i> Schaeff.	„ fuscescens Bräunl. Wasserschwamm	Ebenso
18. u. 19.	<i>Lepiota excoriata</i> (Sch.) Quél.	„ excoriatus Abgeschälter Blätterschw.	„
20.	<i>Amanita citrina</i> Schaeff.	„ citrinus Gelber Fliegenschw.	„
21.	<i>Tricholoma variegatum</i> (Scop.) Gill.	„ granulatus Chagrinartiger Blätterschw.	„
22. u. 23.	<i>Lepiota procera</i> (Scop.) Quél.	„ procerus Hochstieliger Blätterschw.	„
24.	<i>Cortinarius fulmineus</i> Fr.	„ sericeus Seidenartiger Eischw.	Ag. fulgens
25.	<i>Tricholoma imbricatum</i> (Fr.) Quél.	„ vaccinus Kuhfarbiger Blätterschw.	Ebenso

¹) Mir scheint, dass die Fig. 5—10 eher *conglobatum* Vitt., den essbaren „Erdsimmerling“, wie er hier genannt wird, darstellen; diese Art hätte mehr Anrecht als *terreum* Schaeff. bezeichnet zu werden. ²) Die schwierige Frage von der echten *sardonia* Fr. kann ich hier nicht klären.

Taf.	jetziger Name	Name bei Schaeff.	bei Persoon
26.	<i>Inocybe fastigiata</i> (Sch.) Quél.	Ag. fastigiatus Zugespitzter Blätterschw.	Ebenso
27.	<i>Amanita muscaria</i> (L.) Pers.	„ muscarius L. Gemeiner Fliegenschw.	„
28.	„ <i>muscaria</i> f. <i>puella</i> Batsch.	„ muscarii var. Warzenloser Fliegenschw.	„
29. u. 30.	<i>Lentinus lepideus</i> Fr.	„ squamosus Schuppiger Holzschw.	„
31.	<i>Mycena epipterygia</i> Fr.	„ plicatus Gefälteter Blätterschw.	„
32.	<i>Mycena alcalina</i> (Fr.) Quél.	„ brunneus Bräunlicher gefält. Blschw.	„
33.	<i>Psalliota campestris</i> L.	„ campestris Scop. Gem. Champignon, Ehegärtl. Ruckemucke	„
34.	<i>Cortin. caerulescens</i> (Sch.) Fr.	„ caerulescens Bläulichter Blätterschw.	„
35.	<i>Flammula flavida</i> (Pers.) Quél.	„ flavidus Weißgelblicher Blätterschw.	„
36.	<i>Gomphidius glutinosus</i> (Sch.) Fr.	„ glutinosus Klebrichter Blätterschw.	Ag. viscidus L.
37.	<i>Armillaria aurantia</i> (Sch.) Quél.	„ aurantius Pomeranzenfarbiger Blschw.	Ebenso
38.	<i>Trich. albobrunneum</i> (Pers.) Quél.	„ striatus Gestrichelter Blätterschw.	„
39.	<i>Hygrophorus eburneus</i> (Bull.) Fr.	„ lacteus Milchfarbiger Blätterschw.	„
40.	? <i>Cortin. damascenus</i> Fr.	„ punctatus Getüpfelter Blätterschw.	„
41.	<i>Trich. equestre</i> (L.) Quél.	„ aureus Goldgelber Blätterschw.	Ag. flavovirens
42.	<i>Cort. varius</i> (Sch.) Fr.	„ varius Vielfarbiger Blätterschw.	Ebenso
43. u. 44.	<i>Panus flabelliformis</i> (Sch.) Bres. (f. pol. et in litt.)	„ flabelliformis Wedelförmiger Holzschw.	Ag. inconstans
45.	? <i>Collybia succinea</i> (Fr.) Quél.	„ melleus Honiggelber Blätterschw.	Ebenso
46. u. 47.	<i>Coprinus comatus</i> (P.) Fr.	„ porcellaneus Porzellanartiger Mistschw.	Ag. comatus
48.	<i>Pluteus leoninus</i> (Sch.) Quél.	„ leoninus Löwenförmiger Blätterschw.	Ebenso
49.	Fig. 1—3 u. 5. <i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.) Quél. Fig. 4, 6 u. 7. <i>Hypholoma sublateritium</i> (Sch.) Quél.	„ lateritius Ziegelfarbiger Blätterschw.	„
50.	<i>Tricholoma albellum</i> (Fr.) Quél. od. <i>Trich. Georgii</i> Fr. (nach Bres.).	„ pallidus Blaßgelblicher Blätterschw.	„
51.	<i>Pholiota praecox</i> Pers. f. <i>minor</i> (nach Bres.).	„ cereolus Wachsgelbl. Blätterschw.	„
52.	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.) Quél.	„ galericulatus Kappenförmiger Blätterschw.	„
53.	<i>Cortin. glaucopus</i> (Sch.) Fr.	„ glaucopus Blaustieliger Blätterschw.	„
54.	„ <i>ochroleucus</i> (Sch.) Fr.	„ ochroleucus Blaßbräunl. Blätterschw.	„
55.	<i>Gomphidius viscidus</i> (L.) Fr. ²	„ rutilus Rötlicher Trichterschw.	„
56.	<i>Cortinarius hircinus</i> Fr. (nach R. Maire Bull. Soc. Myc. XXVII p. 435).	„ amethystinus Hellvioletter Blätterschw.	„
57.	? <i>Lenzites betulina</i> (L.) Fr.	„ quercinus Eichenschwamm, Rehling	„
58.	<i>Hygrophorus Russula</i> (Sch.) R. Maire.	„ Russula Lackroter Täubling	„

²) Weder von Schaeff. noch von Pers. wurde *Gomph. viscidus* L. erkannt.

Taf.	jetziger Name	Name bei Schaeff.	bei Persoon
59.	Fig. 1—3 <i>Mycena acicula</i> (Sch.) Quél. (nach Sacc.) Fig. 5 <i>Collybia esculenta</i> (Wulf.) Quél.	Ag. clavus Nagelförmiger Blätterschw.	Ebenso
60.	Fig. 1—3 <i>Psathyra obtusata</i> Fr. Fig. 4—6 <i>Psilocybe spadicea</i> (Schaeff.) Fr.	„ spadiceus Hellbrauner Blätterschw.	„
61.	<i>Pholiota squarrosa</i> (Müll.) Quél.	„ floccosus Flockiger Blätterschw.	„
62.	<i>Tricholoma imbricatum</i> Fr. (nach Bres. in litt.) ? <i>Trich. incertum</i> Sch. (nach Juillard). Wohl eher <i>Armillaria mellea</i> Vahl ³ var. <i>tabescens</i> (Scop.) Rea.	„ incertus Ungewisser Blätterschw.	„
63.	? <i>Galera hypnorum</i> Batsch	„ campanulatus Glockenf. kleiner Blschw.	Ag. hypni
64.	? <i>Trich. terreum</i> Schaeff. eher <i>Trich. conglobatum</i> Vitt. (sog. Erdsimmerling).	„ terreus Erdfarbiger Blätterschw.	Ebenso
65.	<i>Cantharellus aurantiacus</i> Fr. (nach mir). <i>Clitocybe inversa</i> Scop. (nach Sacc.).	„ incurvus Gekrümmter Blätterschw.	„
66.	Fig. 1—3 <i>Coprinus spec.</i> Fig. 4—6 <i>Copr. micaceus</i> (Bull.) Fr.	„ lignorum Holzwasserschwamm	„
67.	u. 68. <i>Copr. atramentarius</i> (Bull.) Fr.	„ fugax Vergängl. Mistschw.	plicatus Ligthf.
69.	<i>Trich. luridum</i> (Sch.) Quél.	„ luridus Graugelblicher Blätterschw.	Ebenso
70.	<i>Galera tenera</i> (Sch.) Fr.	„ tener Zarter Mooschwamm	„
71. u. 72.	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch.) Fr.	„ lateralis Schiefstieliger Blätterschw.	Ag. invol.
73.	<i>Lactarius rufus</i> (Scop.) Fr. ? Fig. 1—2 <i>Lact. subdulcis</i> Fr.	„ rubescens Rötl. Hirschling, Wiesenreizker	Ebenso
74.	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) Quél.	„ obscurus Dunkelbrauner Blätterschw.	„
75.	? Fig. 1—3 <i>Russula veternosa</i> Fr. <i>Clitocybe opipara</i> (Fr.) Gill.	„ roseus Rosenf. Täubling	„
76.	<i>Lenzites sepiaria</i> Fr.	„ hirsutus Haariger Holzschwamm	Merulius sepiarius
77.	<i>Marasmius oreades</i> (Bull.) Fr.	„ caryophyllus Nägeleinschw.	Ebenso
78.	<i>Clitopilus prunulus</i> Scop.	„ albellus Weißer Musseron	„
79.	<i>Pholiota tuberculosa</i> (Sch.) Gill.	„ tuberosus Zügeligter Holzschw.	„
80.	„ <i>squarrosa</i> Müll. v. <i>reflexa</i> (F.) Karst.	„ pilosus Faseriger Blätterschw.	„
81.	? <i>Cort. armeniacus</i> Schaeff. excl. Fig. 4 (nach Bres.)	„ armeniacus Aprikosenfarbiger Blätterschw.	„
82.	<i>Cantharellus cibarius</i> Fr.	„ cantarellus Gem. gelber Pfifferling, Rehgeiß	„
83.	<i>Lact. piperatus</i> (Scop.) Fr.	„ amarus Bitterer („händiger“) Täubl., Pfefferschw.	Ag. piperatus
84.	? <i>Coprinus soboliferus</i> (nach mir).	„ giganteus Riesenmäßiger Blätterschw.	Ebenso
85. u. 86.	<i>Amanitopsis vaginata</i> (Bull.) Roze.	„ plumbeus Bleifarbener Eischw.	„
87. u. 88.	<i>Collybia fusipes</i> (B.) Quél.	„ crassipes Dickstielliger Blätterschw.	Ag. fusipes Bull.
89.	<i>Trich. tigrinum</i> (Sch.) Quél.	„ tigrinus Getiegener Blätterschw.	Ebenso

³ Ex. ganz wie bei Schaeff.; frisch wie ringloser Hallimasch, gefunden in einem Sumpf bei Irlbach, Juli 1920.

Taf.	jetziger Name	Name bei Schaeff.	bei Persoon
90.	<i>Amanita pantherina</i> (DC.) Krb.	Ag. maculatus Fleckigter brauner wilder Fliegenschw.	Ag. verrucosus
91.	„ <i>rubescens</i> Pers.	„ pustulatus Kleiner gesprenkelter rötlich- grauer w. Fliegenschw.	Ebenso
92.	<i>Russula meliolens</i> Quél. (nach R. Maire).	„ ruber Roter Täubling	„
93.	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.) Fr.	„ cyanoxanthus Blauer Täubling	„
94.	Fig. 1 <i>Russula furcata</i> (P.) Fr. Fig. 2—6 <i>Russ. virescens</i> (Sch.) Fr. od. <i>aeruginosa</i> P. (nach Rom.)	„ virescens Gräuling, grüner Brätl. usw.	„
95.	<i>Amanitopsis vaginata</i> var. <i>fulva</i> Schaeff.	„ fulvus Lichtbrauner Eischw.	„
96.	<i>Psalliota pratensis</i> Schaeff.	„ pratensis Wilder Champignon, Ehegärtel	„
97.	<i>Cortin. nitidus</i> (Sch.) Fr.	„ nitidus Glänzender Blätterschw.	„
98.	<i>Volvaria bombycina</i> (Pers.) Quél.	„ bombycinus Wolligter Eischw.	„
99.	<i>Marasmius alliatus</i> Seb.	„ alliatus Knoblauchschw.	„
100.	<i>Coprinus cinereus</i> (Sch.) Fr.	„ cinereus grauer Mistschwamm	„
101. u. 102.	<i>Polyp. squamosus</i> (Huds.) Fr.	Bol. juglandis Nußbaumpilz	squamosus Huds.
103.	<i>Boletus versipellis</i> Fr.	„ rufus Roter Kuhpilz, rotköpfiger Pilzling	Ebenso
104.	„ <i>scaber</i> Fr.	„ bovinus Schwarzköpfiger od. Kuh- Pilzling	Ebenso
105.	„ <i>olivaceus</i> Schaeff.	„ olivaceus Olivenfarbiger Kuhpilz	Ebenso
106.	<i>Trametes odorata</i> (Wulf.) Fr.	„ annulatus Geringelter Baumpilz	odoratus
107.	<i>Bol. luridus</i> Schaeff. ⁴	„ luridus Schwarzgelber Kuhpilz	Ebenso
108.	Fig. 1 <i>Bol. edulis</i> Bull. var. <i>reticu- latus</i> .	„ reticulatus Gegitterter Kuhpilz	„
109. u. 110.	<i>Polyp. confluens</i> (A. et. S.) Fr. (jung und alt).	„ aurantius Gelbe Hirschzunge	„
111.	<i>Polyp. umbellatus</i> (Pers.) Fr.	„ ramosissimus Eichhaase	„
112.	<i>Bol. subtomentosus</i> L.	„ crassipes Dickstieliger Kuhpilz	„
113.	<i>Bol. cristatus</i> (P.) Fr.	„ flabelliformis Wedelförmiger P.	„
114.	<i>Bol. luteus</i> L.	„ luteus Doppelter Schaafteilerl	annularius Bull.
115.	<i>Bol. variegatus</i> Sw.	„ aureus Goldgelber Kuhpilz	Ebenso
116—120.	<i>Fistulina hepatica</i> Fr.	„ hepaticus Leberpilz, Blätterschw., rote Hirschzunge	„
121. u. 122.	<i>Polyp. ovinus</i> (Sch.) P.	„ ovinus Weißer Schaafteilerl	„
123.	<i>Bol. granulatus</i> L.	„ flavorufus Gelbroter Kuhpilz	„
124.	<i>Polyp. albidus</i> Schaeff. (nach Bres.)	„ albidus Weißer Baumpilz	„
125.	<i>Polystictus perennis</i> (L.) Fr.	„ coriaceus Lederartiger P.	perennis L.

⁴) Stellt den Urtyp dar; kommt auch im Jura häufig vor. Vgl. meine Abhandlungen über den Hexenpilz etc. in den Münchener Kryptog. Forschungen Nr. 4 (1919) S. 336 f.

Taf.	jetziger Name	Name bei Schaeff.	bei Persoon
126.	? Bol. subtomentosus L. forma.	Bol. ferrugineus	Ebenso
127.	? Polyp. frondosus (Schränk) Fr.	Rostfarbiger Kuhpilz „ ramosissimus Eichhaase	frondosus
128. u. 129.	Polyp. intybaceus (Bauh.) Fr.	„ ramosissimus Eichhaase	„
130.	Bol. appendiculatus Schaeff. ⁵	„ appendiculatus Dickstieliger Kuhpilz mit dem unten zugespitzten bewurzel- ten Stiel	„
131. u. 132.	Pol. sulfureus (Bull.) Fr.	„ caudicinus Buschiger Baumpilz	Ebenso
133.	Bol. subtomentosus L. (nach E. Martin).	„ cupreus Kupferfarbiger Kuhpilz	Ebenso
134. u. 135.	Bol. edulis Bull.	„ bulbosus Steinpilz.	Ebenso
136.	? Polyporus rheades Pers.	„ versicolor Bunter Holzpilz	lutescens
137.	Fomes fomentarius (L.) Gill.	„ unguilatus	Ebenso
138.	Fomes unguilatus Schaeff.		Ebenso
139.	Hydnum cyathiforme Schaeff.	Hydnum cyathiforme Becherförmiger Stachelschw.	tomentosum L.
140.	„ imbricatum L.	„ imbricatum L.	Ebenso
141.	„ repandum L.	„ Braune Hirschzunge rufescens	repandum L.
142.	„ coralloides Scop.	„ Rötlicher Stachelschw. coralloides	Ebenso
143.	„ auriscalpium L.	„ Korallenfg. oder ästiger Stachelschw. auriscalpium L.	„
144. u. 145.	Tremellodon gelatinosum (Scop.) Pers.	„ Ohrlöffelfg. Stachelschw. gelatinosum	„
146.	Hyd. compactum Pers. Fig. 4 f. hybridum Pers.	„ Gallerlicher Stachelschw. floriforme	Fig. 1—6 compactum Fig. 4 hybridum
147.	Fig. 2—6 Hyd. velutinum Fr. 1 Irpex pendulus (A. et. S.) Fr. ⁶ od. Polyp. heteroclitus Bolt.	„ Blumenfg. Stachelschw. Fig. 2—6 floriforme H. Blumenfg. St. Fig. 1, 7, 8 crispum Kraußer Holzstachelschw.	Hyd. hybridum „ crispum
148.	Peziza aurantia Vahl od. Pers.	Elvella coccinea Hochroter Faltenschw.	Peziza aurantia
149.	Spathularia clavata (Sch.) Sacc.	„ clavata Keulenfg. Faltenschw.	Spathularia flava
150.	? Otidea alutacea (Pers.) Bres. od. concinna Pers.	„ scutellata Gelber becherf. Stachelschw.	Peziza flavescens
151.	Lachnea hemisphaerica (Wigg.) Gill.	„ albida Weißlicher Faltenschw.	Peziza hemisphae- rica Hoff.
152.	Macropodia hyperocrateri- formis (Sch.) Sacc. od. bulbosa Hedw. (nach Rehm).	„ hyperocrateriformis Präsentiertellerfg. Stachel- schwamm	Ebenso
153.	Rhizina inflata (Sch.) Quel.	„ inflata Blasenfg. Faltenschw.	Helvella acaulis
154.	Helvella lacunosa Afz. v. major Sacc.	„ nigricans Schwärzlicher Pfaffenhut	Helvella mitra
155.	Peziza mespiliformis Walbr. (nach Sacc.)	„ ochracea Brauner becherfg. Fschw.	Ebenso
156.	Otidea auricula (Sch.) Rehm.	„ auricula Ohrfg. Faltenschw.	P. leporina
157.	Craterellus lutescens (P.) Fr. od. tubaeformis Fr.	„ tubaeformis Trompetenfg. Faltenschw.	Merulius tub.
158.	Bulgaria inquinans (P.) Fr.	„ pulla Schwarzbr. becherfg. Fschw.	Pez. inquinans

⁵) Die seltene Art hier bei Kruckenberg und im bayer. Wald beobachtet.⁶) Die Art von mir, wie auch von Persoon nicht gefunden; Polyp. rufescens käme hier vor.

Taf.	jetziger Name	Name bei Schaeff.	bei Persoon
159.	Gyromitra infula Schaeff.	Elvella infula Lichtbrauner Bischofshut, Stockmaurache	Ebenso
160 u. 161.	Gyromitra esculenta (P.) Fr. Fig. 161, I u. II Gyr. inflata.	„ mitra Dunkelbr. Bischofshut, Stockmaurache	Helv. esculenta
162.	Helv. lacunosa Afz. f. minor Sacc.	„ monacella Erdfarbener Bischofshut	Ebenso
163.	Sparassis crispa (Wulf.) Fr.	„ ramosa Ästiger Faltenschw.	Ebenso
164.	Craterellus clavatus (P.) Fr.	„ carnea Fleischfarbiger Faltenschw.	Merulius carnea
165.	Crat. cornucopioides (L.) P.	„ cornucopiae Braunes Füllhorn	Pez. cornucopioides
166.	„ „ „	„ punctata Getüpfeltes Füllhorn	„
167.	Helv. macropus (nach Sacc.).	„ hispida Rauher präsentierterfg. F.	Pez. stipitata Huds.
168.	Tremella mesenterica Retz.	„ mesenterica Gekrösefg. F.	Trem. mesenteriformis Jacqu. Ebenso
169.	Clavaria pistillaris L. (nach Bres. in litt.).	Clavaria pistillaris Herkuleskeule	
170.	Clavaria albidula Schaeff. (nach Bres. in litt.).	„ albidula Weißl. Korallenschwamm	„
171.	Clavaria ligula Fr.	„ ligula Dünn gelber Keulenschw.	„
172.	„ Schaefferi Sacc. ⁷	„ purpurea Purpurfarb. Korallenschw.	„
173.	„ muscoides L.	„ corniculata Gehörnter gelber Korschw.	„
174.	Calocera viscosa (P.) Fr.	„ flammea Feuerfarb. Korallenschw.	Clav. viscosa
175.	Clav. flavula Schaeff.	„ flavula Gelber K., vulgo gelber Geißbart, Händelschwamm	Ebenso
176.	„ botrytis Pers.	„ acroporphyrea Weißl. K. mit purpurfarbi- gen Spitzen	Clav. botrytis
177.	„ condensata Fr. od. rufescens (Bres. in litt.)	„ rubella Rötlicher K., vulgo der rote Geißbart	Ebenso
178.	Cyathus hirsutus (Sch.) Duf.	Peziza hirsuta Rauher brauner Becherschw.	Cyathus striatus Willd.
179.	Crucibulum vulgare Tul.	„ crucibuliformis Gelber schmelztiegelf. B.	Ebenso
180.	Cyathus vernicosus (Bull.) DC.	„ sericea Grauer seidenartiger B.	Cyathus olla
181.	Crucib. vulgare Tul.	„ ollaris Topfförmiger B.	Cyathus bicolor
182.	Geaster rufescens Pers.	Lycoperdum stellatum, Sternbovist Gestirnter Staubschwamm,	Geastrum rufescens
183.	„ coronatus (Sch.) Lloyd	„ coronatum Kronfg. Sternbovist	Geastrum quadri- fidum
184.	Lycop. papillatum Schaeff.	„ papillatum Warziger weißl. Staubschw.	Ebenso
185.	„ piriforme Schaeff.	„ piriforme Birnf. St.	„
186.	? Calvatia caelata (Bull.) Morg.	„ echinatum Stacheliger weißer St.	„
187.	Calvatia saccata (Vahl) Morg.	„ excipuliforme Destillierkolbenfg. St.	„

⁷) Diese Art hier bei Hauzenstein von mir beobachtet.

Taf.	jetziger Name	Name bei Schaeff.	bei Persoon
188. Fig. 1—5, 10 u. 14?	<i>Gautieria morchellaeformis</i> Vitt. ⁸	<i>Lycoperdon spadiceum</i> Brauner Staubschw.	Ebenso
Fig. 6 u. 7	<i>Scleroderma verrucosum</i> (B.) P.		
Fig. 8 u. 13?	<i>Pisolithus arenarius</i> A. et S.		
Fig. 9, 11 u. 12	<i>Hydnотria carnea</i> Corda ⁹		
189.	<i>Calv. caelata</i> (Bull.) Morg.	„ <i>gemmatum</i> Gesteinleter St.	<i>Lyc. bovista</i>
190.	„ „ „ „	„ <i>areolatum</i> Gefleckter weißl. St.	„
191.	<i>Calv. maxima</i> (Sch.) Morg.	„ <i>maximum</i> Größter gem. Staubschw., Bovist, Wolfsfuzz vulgo Stoiber Bavaris et Austriacis	Ebenso
192.	<i>Fuligo septica</i> Gmel. (besser Bolt.)	<i>Mucor ovatus</i> Eifg. unechter Staubschw.	<i>Fuligo flava</i>
193.	<i>Lycogala epidendrum</i> Buxb.	„ <i>fragiformis</i> Hellroter unechter Staubschw.	<i>Lyc. epidendrum</i> L.
194.	<i>Fuligo septica</i>	„ <i>butyraceus</i> Butterartiger unechter St.	<i>Ful. but.</i>
195.	„ „	„ <i>carneus</i> Fleischfarbiger unechter St.	<i>Ful. rufa</i>
196—198.	<i>Ithyphallus impudicus</i> (L.) Fischer.	<i>Phallus impudicus</i> L. Stinkschw., Hirschbrunst, Giftmorchel	Ebenso
199.	<i>Morchella esculenta</i> (L.) Pers.	„ <i>esculentus</i> L. Gem. spitzige Maurache	„
200.	<i>Russuliopsis laccata</i> oder <i>Panus pycnoticus</i> Klotz.	— —	<i>Ag. carnosus</i> Boll.
201.	<i>Coprinus micaceus</i> (Bull.) Fr.	<i>Ag. rufocandidus</i> Fleischfarb. Mistschwamm	<i>Ag. tortus</i> Batsch.
202.	<i>Panaeolus acuminatus</i> (Sch.) Quél.	„ <i>acuminatus</i> Kugelfg. Mooschwamm	Ebenso
203.	<i>Naucoria semiorbicularis</i> Bull.	„ <i>pusillus</i> Kleiner goldgelber Blschw.	„
204.	<i>Russula olivacea</i> (Sch.) Fr.	„ <i>olivaceus</i> Brauner olivenfb. Täubling	„
205.	<i>Psilocybe cernua</i> (Vahl) Quél.	„ <i>farinulentus</i> Mehliger Wasserschw.	„
206.	<i>Cantharellus aurantiacus</i> Fr.	„ <i>aleatorolophoides</i> Dunkelgelber Pfifferling, Rehgeiß, Rehling	„
207.	<i>Omphalia umbilicata</i> (Sch.) Gill.	„ <i>umbilicatus</i> Weißlicher nabliger Bl.	„
208.	<i>Panus stipticus</i> (Bull.) Fr.	„ <i>semipetiolatus</i> Kleiner gestielter Holzwchw.	<i>Ag. stypticus</i>
209.	<i>Pholiota filamentosa</i> (Sch.) Karst.	„ <i>filamentosus</i> Pomeranzenfarbiger Holzwchw.	Ebenso
210.	? <i>Panaeolus remotus</i> (Sch.) Gill.	„ <i>helvolus</i> Fahlgelber Mistschw.	„
211.	<i>Psathyra gyroflexa</i> (Fr.) Quél.	„ <i>pallescent</i> Bleicher gefälteter kleiner Kappenschwamm	<i>Ag. disseminatus</i>
212.	<i>Clitoc. infundibuliformis</i> Schaeff.	„ <i>infundibuliformis</i> Gestrichelter gelber Trichterschwamm	Ebenso
213.	<i>Crepidotus mollis</i> Schaeff.	„ <i>mollis</i> Weicher Holzwchwamm	„

⁸) Der kartoffelähnliche Pilz mit dem Myzelstrunk und der braunen lakunösen Gleba (Fig. 5) gleicht am ehesten m. E. dieser *Gautieria*; ich habe freilich diese hier noch nicht mit Sicherheit gefunden, wohl aber die verwandte Art *graveolens*.

⁹) Diese seltene Art kommt hier vor im Schweighausener Forst (Jura, nördlich von Regsb.). Der Habitus ist nicht schlecht von Schaeffer getroffen; die feinere Durchführung selbstverständlich mangelhaft. Wir haben hier somit die ersten deutschen Hypogaeen-Darstellungen.

Taf.	jetziger Name	Name bei Schaeff.	bei Persoon
214. u. 215.	Russ. <i>xerampelina</i> (Sch.) Fr.	Ag. <i>xerampelinus</i> Purpurbrauner Täubling	Ebenso
216.	<i>Coprinus fimetarius</i> Fr. ?	„ <i>margaritaceus</i> Perlfarbiger Mistschw.	„
217.	<i>Pholiota praecox</i> (P.) Quél.	„ <i>candicans</i> Weißlicher Wiesenschw.	Ag. <i>praecox</i>
218.	<i>Cortinarius prasinus</i> (Sch.) Fr.	„ <i>prasinus</i> Grasgrünl. Blätterschw.	Ebenso
219.	<i>Trich. rutilans</i> (Sch.) Quél.	„ <i>rutilans</i> Feuerfarbiger unechter Tbl.	„
220.	<i>Collybia collina</i> (Scop.) Quél.	„ <i>collinus</i> Weißlicher Herbstwiesenschw.	„
221.	<i>Hebeloma fastibile</i> (Fr.) Quél.	„ <i>gilbus</i> Fahlgelber unechter Tbl.	„
222.	<i>Mycena acicula</i> (Sch.) Quél.	„ <i>acicula</i> Stecknadelfg. Blschw.	„
223.	<i>Russuliopsis laccata</i> f. <i>monstrosa</i> (nach Bres.)	„ <i>fasciatus</i> Kleiner Mooschw. mit gerieftem Stiel	„
224.	<i>Pleurotus tremulus</i> (Sch.) Quél.	„ <i>tremulus</i> Sulziger Holzschw.	„
225.	<i>Pleurotus corticatus</i> (Fr.) Quél.	„ <i>candidus</i> Weißlicher Tbl.	„
226.	<i>Naucoria escharoides</i> (Fr.) Quél.	„ <i>pulverulentus</i> Bräunlicher weißgestäubter Mooschwamm	„
227.	<i>Lactarius scrobiculatus</i> (Scop.) Fr.	„ <i>scrobiculatus</i> Rauher Hirschling, Herbstling, mit maserigem hohlen St.	„
228.	<i>Lactarius cilicioides</i> Fr.	„ <i>crinitus</i> Bleicher Hirschling, Herbstling,	„
229.	<i>Nolanea pascua</i> (P.) Quél.	„ <i>pyramidatus</i> zugespitzter brauner Mschw.	Ag. <i>pascuus</i>
230.	<i>Omphalia campanella</i> (Batsch.) Quél.	„ <i>fragilis</i> Zerbrechl., kleiner Holzschw.	Ag. <i>campanella</i>
231.	<i>Daedalea quercina</i> (L.) Pers. var.	„ <i>dubius</i> Unbest. harter Holzschw.	Ebenso
232.	<i>Hygrophorus niveus</i> (Scop.) Fr.	„ <i>niveus</i> Weißer B'schw. mit herablaufenden Blättern	„
233.	<i>Pleurotus dryinus</i> (P.) Quél.	„ <i>dimidiatus</i> Halbrunder Holzschw.	Ag. <i>dryinus</i>
234.	? <i>Psilocybe atrorufa</i> Sch.	„ <i>atorufus</i> Braunroter Mooschw.	Ebenso
235.	<i>Lact. flexuosus</i> Fr. var. <i>roseo-zonatus</i>	„ <i>fuscus</i> Brauner Hirschl., Wiesenreizker	„
236.	<i>Coll. tenacella</i> (P.) Quél.	„ <i>griseus</i> Kleiner grauer Mooschw.	„
237.	<i>Psathyra spadiceo-grisea</i> (Sch.) Quél.	„ <i>spadiceogriseus</i> Fahlgrauer Holzschw.	„
238.	? <i>Hygrophorus penarius</i> Fr.	„ <i>nitens</i> Glänzender weißer Tbl.	„
239.	<i>Marasmius perforans</i> Fr.	„ <i>androsaceus</i> Kleiner weißer Mooschw. mit schwarzem Stiel	„
240.	<i>Trich. guttatum</i> (Sch.) Gill.	„ <i>guttatus</i> Gesprenkelter unechter Eischw.	„
241.	<i>Amanita porphyrea</i> Fr.	„ <i>bulbosus</i> Weißer glatter unechter Eischwamm mit hohlem knolligen Stiel	„
242.	<i>Psall. silvatica</i> Sch.	„ <i>silvaticus</i> Wilder bräunl. Champignon, Ehegärtl	„

Taf.	jetziger Name	Name bei Schaeff.	bei Persoon
243.	? <i>Canth. carbonareus</i> A. et S. (nach Quél.) od. <i>Canth. tubaeif. f. zonatus</i> Fr.	Ag. degener Verunstalteter Blätterschw.	Ebenso
244.	<i>Amanitopsis vaginata</i> (Bull.) Roze.	„ <i>hyalinus</i> Meergrüner Eischw.	„
245.	<i>Amanitopsis vaginata f. fulva</i> Sch.	„ <i>badius</i> Kaffeebrauner Eischw.	„
246.	Fig. 3, 8, 9 <i>Pleurotus atro-caeruleus</i> (Fr.) Gill.	„ <i>alneus</i> Erlenschwamm	Ag. <i>serotinus</i>
247.	? <i>Amanita caesarea</i> Scop. (sehr schlecht) ¹⁰	„ <i>caesareus</i> Kaiserling, Herrenpilz	Ebenso
248. u. 249.	<i>Lentinus suffrutescens</i> (Brot.) Fr.	„ <i>tubaeiformis</i> Trompetenförmiger Holzschw.	„
250.	<i>Coll. pulla</i> (Sch.) Gill. od. <i>Myc.</i> <i>excisa</i> Lasch (nach Quél. Ass. fr. XXX p. 495).	„ <i>pullus</i> Schwarzbrauner Blätterschw.	„
251.	<i>Hebel. truncatum</i> Schaeff.	„ <i>truncatus</i> Abgestutzter Blätterschw.	„
252.	<i>Lentinus cyathiformis</i> (Sch.) Bres. f. trid. 106.	„ <i>cyathiformis</i> Becherf. Holzschw., giftiger Tannenpfifferling	„
253.	<i>Pluteus chrysophaeus</i> (Sch.) Quél., fragliche Art.	„ <i>chrysophaeus</i> dunkelgoldgelber Holzschw.	„
254.	<i>Russula nitida</i> (Pers.) Fr.	„ <i>purpureus</i> Purpurfarbiger Täubling	„
255.	<i>Naucoria spec.</i> (nach Bres. in litt.)	„ <i>ochraceus</i> Ockerbrauner Blätterschw.	„
256.	<i>Trich. album</i> (Sch.) Quél.	„ <i>albus</i> Ganz weißer Blätterschw.	„
257.	Fig. 1—3 <i>Stroph. calceata</i> (Fr.) Karst. nach Sacc.	„ <i>lacer</i> Zerspaltener Blätterschw.	„
258.	<i>Am. muscaria</i> (L.) Pers. var.	„ <i>caesareus</i> Kaiserling, Herrenpilz	„
259.	<i>Coll. oedematopoda</i> (Sch.) Sacc.	„ <i>oedematopus</i> Dickstieler Stockschw.	„
260.	<i>Cortin. subnotatus</i> (P.) Fr.	„ <i>monstrosus</i> Verunstalteter Blätterschw.	„
261.	<i>Am. rubescens</i> Pers.	„ <i>myodes</i> Rötl. wilder Fliegenschw.	„
262.	<i>Fomes pinicola</i> (Fr.) Quél.	Bol. <i>fulvus</i> Goldgelber Feuerschw.	„
263.	<i>Ganoderma valesiacum</i> Boud. jung (nach Bres. 1923)	„ <i>variegatus</i> Schattierter Baumpilz	„
264.	? kranker <i>Polyporus</i>	„ <i>deformis</i> Großer ungestalter Holzp.	„
265. u. 266.	<i>Polyp. umbellatus</i> (P.) Fr.	„ <i>ramosissimi</i> var. Eichhaase	„
267.	<i>Polyp. Schweinitzii</i> Fr. (nach mir)	„ <i>mesentericus</i> Gekrösefg. Holzp.	„
268.	<i>Polyst. versicolor</i> (L.) Fr.	„ <i>atrorufus</i> Schwarzbrauner geringelter Baump.	„
269.	<i>Polyst. zonatus</i> (Nees) Fr.	„ <i>multicolor</i> Vielfarbiger Baump.	„
270.	<i>Fomes pinicola</i> (Fr.) Quél.	„ <i>semiovatus</i> Halbrunder Zunderpilz	Bol. <i>ellipticus</i>
271.	<i>Hyd. scabrosum</i> Fr. oder <i>ferrugineum</i> Fr.	Hyd. <i>striatum</i> Gestrichelter Stachelschw.	Ebenso
272.	<i>Hyd. melaleucum</i> Fr.	„ <i>pullum</i> Schwärzlicher Stachelschw.	„
273.	<i>Hyd. squamosum</i> Schaeff.	„ <i>squamosum</i> Schuppiger Stachelschw.	„

¹⁰ Die Art kommt hier nicht vor und scheint Schaeff. nicht zu Gesicht gekommen zu sein. Stiel ohne Volva; Sporenstaub braun.

Taf.	jetziger Name	Name bei Schaeff.	bei Persoon
274.	? <i>Otidea cochleata</i> L. var. ¹¹ od. <i>umbrina</i> (Pers.) Bres.	<i>Elvella ochroleuca</i> Lichtbrauner becherfg. Faltenschw.	<i>Pez. umbrina</i>
275.	? <i>Crat. cornucopioides</i> (L.) Pers.	„ <i>tubulosa</i> Röhrenf. Faltenschw.	Ebenso
276.	<i>Crat. clavatus</i> (P.) Fr.	„ <i>purpurascens</i> Purpurf. Faltenschw.	„
277.	? <i>Polyst. perennis</i> (L.) Fr.	„ <i>infundibuliformis</i> Trichterf. Faltenschw.	„
278.	<i>Craterellus crispus</i> Fr. (nach R. Maire Ann. Myc. VII [1909] p. 430)	„ <i>floriformis</i> Blumenf. Faltenschw.	„
279.	<i>Nyctalis asterophora</i> Fr.	„ <i>clavus</i> Nagelf. Faltenschw.	„
280.	? <i>Otidea concinna</i> (P.) Sacc. ¹²	„ <i>pyxidata</i> Gelber büchsenf. Faltenschw.	<i>Pez. pyxid.</i>
281.	? <i>Polyp. brumalis</i> (P.) Fr.	„ <i>pileus</i> Hutförmiger Faltenschw.	Ebenso
282.	<i>Helvella crispa</i> (Scop.) Fr. var. <i>alba</i>	„ <i>pallida</i> Fahler Pfaffenhut	<i>leucophaea</i>
283.	<i>Helvella monachella</i> (Scop.) Fr.	„ <i>spadicea</i> Brauner Pfaffenhut	Ebenso
284.	<i>Lachnea scutellata</i> (L.) Gill.	„ <i>ciliata</i> Hochroter haariger schalenf. Faltenschw.	<i>Pez. scutellata</i>
285.	<i>Clav. aurea</i> Schaeff.	<i>Clavaria flavescens</i> Gelbl. Korallenschw. mit dickem, fast knollig. Körper.	Ebenso
286.	<i>Clav. pallida</i> Schaeff. (nach Bres. in litt.)	„ <i>pallida</i> Bleicher Kor. schw.	„
287.	<i>Clav. aurea</i> Schaeff.	„ <i>aurea</i> Goldgelber Kor. schw.	„
288.	<i>Clav. rufescens</i> Schaeff.	„ <i>rufescens</i> Rotbräunl. Kor. schw. mit rötl. Spitzen	„
289.	? <i>Calocera viscosa</i> (P.) Fr. f. <i>abnormal</i>	„ <i>cornuta</i> Gehörnter goldgelber K.	„
290.	<i>Clav. pistillaris</i> L.	„ <i>gemmata</i> Knotiger weißgelber Keul- schw., Herkuleskeule	„
291.	? <i>Clav. cinerea</i> Bull.	„ <i>laciniata</i> Gespaltener Keulpilz	„
292. u. 295.	<i>Calvatia saccata</i> (Vahl) Morg.	<i>Lyc. excipulif.</i> Destillierkolbf. Staubschw.	„
293.	<i>Lycoperdon pyriforme</i> Sch.	„ <i>pyriforme</i>	„
294.	<i>Lycoperdon polymorphum</i> Vitt.	„ <i>furfuraceum</i> Fleckiger Staubschw.	„
296.	<i>Ceratomyxa mucida</i> od. <i>Trichia varia</i> Pers.	<i>Mucor granulatus</i> Körniger unechter Staubschw.	„
297.	<i>Comatrichia typhina</i> (Roth.) R.	„ <i>stemonitis</i> Bestielter unechter Staubschw.	<i>Stem. typhina</i>
298.—300.	<i>Morchella esculenta</i> (L.) P.	<i>Phallus escul.</i> (wie 194)	Ebenso
301.	<i>Hygrophorus psittacinus</i> (Sch.) Fr.	<i>Ag. psittacinus</i> Hochgrüner, goldgelber Blschw.	„
302.	<i>Hygrophorus coccineus</i> (Sch.) Fr.	„ <i>coccineus</i> Hochroter, gelber Blschw.	„
303.	<i>Mycena pura</i> (P.) Quéf. oder	„ <i>rubellus</i> Blau- oder purpurfarbiger Blschw.	„
304.	<i>Cort. quadricolor</i> (Scop.) Fr. oder <i>Cort. helvelloides</i> Fr.	„ <i>carneus</i> Isabellfg. Blätterschw.	„
305. u. 306.	<i>Cit. aggregata</i> (Sch.) Gill.	„ <i>aggregatus</i> Zusammengehäufte Blschw.	„

¹¹⁾ Käme im B. Wald (Eisenstein) vor; legi Aug. 1913.¹²⁾ Etwas ähnlich der Abb. bei Bres. trid 102,1.

Taf.	jetziger Name	Name bei Schaeff.	bei Persoon
307.	? Hygr. pratensis (P.) Fr.	Ag. clavaeformis Keulenfg. Blätterschw.	Ebenso
308.	Psathyrella disseminata (P.) Quél.	„ minutulus Ganz kleiner Mooschw.	„
309.	? Mycena hiemalis Osb.	„ umbelliferus Parosolfg. Mooschw.	„
310. u. 311.	Psallio(a) arvensis Schaeff.	„ arvensis Großer weißer glatter Champignon	Ag. edulis
312.	Hygr. limacinus (Scop.) Fr.	„ limacinus Brauner schleimiger Blschw.	Ebenso
313.	Hygr. leporinus Fr.	„ miniatus Gelbroter Blätterschw.	„
314.	? Polyporus borealis (W.) Fr. jung.	Bol. albus Weißl. haariger Baumpilz	„
315.	Boletus calopus Fr. (od. pachypus)	„ terreus Erdfarbiger Kuhpilz	„
316. u. 317.	Polyp. lobatus (Huds.) Fr.	„ cristatus Goldgelber buschiger Holzpilz	„
318.	Hydnum repandum L.	Hyd. flavidum Gelbl. Stachelschw.	„
319.	Lachnea hemisphaerica (Wigg.) G. ¹³	Elv. foliacea Blättriger Faltenschw.	„
320.	Helvella elastica Bull.	„ fuliginosa Schwarzgrauer Bischofshut	„
321.	Helv. ephippium Lév.	„ villosa Zottiger Faltenschw.	„
322.	Helv. pallescens Schaeff.	„ pallescens Fahler Bischofshut	„
323.	Coryne sarcoides (Jacqu.) Tul.	„ purpurea Purpurfg. Faltenschw.	Fig. 1, 3—6 Acro- spermum dubium
324.	„ „	Ebenso	Fig. 2 und 7 Pez. tremelloidea
325.	Thelephora caryophyllea (Sch.) Pers.	„ caryophyllea Nelkenf. Faltenschw.	Ebenso
326.	? Clavaria anomala Fr. ¹⁴	Clav. digitellus Gelbl. Keulschw.	„
327.	? Geoglossum hirsutum Pers.	„ ophioglossoides Schwarzer Keulschw.	„
328.	Xylaria hypoxylon (L.) Grev.	„ hypoxylon Schwärzl. Holzkeulschw. mit weißen Spitzen	„
329.	Daldinia concentrica Bolt. ¹⁵	Lycop. atrum Kohl-schwarzer Staubschw.	Sphaeria concentrica
330.	Mutinus caninus ¹⁶ (Huds.) Fr.	Phallus caninus Kleine Giftmorchel	Ebenso
	Clathrus cancellatus Tourn. ¹⁷	Tabula in titulo Tomi IV expressa: Clathrus cancellatus Gitterschwamm	„

¹³ So gefunden im Spitalwald bei Regensburg X. 1919. S. auch Taf. 151.¹⁴ Noch nicht von mir beobachtet, auch Bresadola unbekannt.¹⁵ Sehr selten; einmal im Lohwald bei Mintraching (Donaubene) gefunden.¹⁶ Bisher von mir hier noch nicht wieder entdeckt.¹⁷ Hier nicht vorkommend.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für Pilzkunde](#)

Jahr/Year: 1924

Band/Volume: [3_1924](#)

Autor(en)/Author(s): Killermann Sebastian

Artikel/Article: [Bestimmung der Schaeffer'schen Pilzabbildungen 25-35](#)