Fragen aus dem Leserkreis:

Frage 26: In der neuen Auflage von Singers „Agaricales in modern Taxonomy" finde ich *Oudemansiella platyphylla* in der Gattung *Tricholomopsis* aufgeführt. Was sind die Gründe dafür?

Frage 27: Ich habe bei *Agrocybe* versucht, die zellige Huthaut im Mikroskop zu beobachten, und hatte damit Schwierigkeiten. Haben nicht alle Agrocyben zellige Huthaut?
Wie macht man am besten Präparate von zelligen Huthautstrukturen?

Antworten

Zu Frage 25: Stellung von *Naucoria vervacti* ss. Ricken.

a) *Naucoria vervacti* ss. Ricken steckt in der Kl. Kryptogamenflora unter *A. semiorbicularis.*

b) *A. pediades* und *A. semiorbicularis* unterscheiden sich:
A. pediades: H. trocken, ockerfalb, ockerblaß, St. leicht seidig bis schwach filzig, dann kahl werdend. Sp. 9–15 (17)/7–10,5 µm, Basidien 4sporig.

A. semiorbicularis: H. leicht schmierig, blaß gelbbraun, ocker, weißlich-ocker. St. weißlich ocker, blaß ocker, faserig, faserig-bereift. Ges. mehlartig, Ger. fehlend bis schwach mehlartig. Sp. 11–19/7,5–12 µm, Bas. immer 2sporig.

Die Sporenmaße sind in der Kl. Kryptogamenflora für beide Arten zu klein, d. h. nur im unteren Bereich angegeben.

M. Moser

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Zeitschrift für Pilzkunde

Jahr/Year: 1975

Band/Volume: 41_1975

Autor(en)/Author(s): Moser Meinhard Michael

Artikel/Article: Fragen aus dem Leserkreis: 202