MTB-Rasterkarte der BRD und angrenzender Länder:

■ gut, ○ mäßig, □ nicht oder kaum begangene Flächen. Stand der Meldungen vom 20.7.1976.

Zur Kartierung von Großpilzen in und außerhalb der BRD

– Zwischenbericht und 3. Aufruf zur Mitarbeit –

Von German J. Krieglsteiner

1. Zur Situation

Zwar ist die taxonomisch-nomenklatorische Bestandsaufnahme der Makromyzetten Europas längst nicht abgeschlossen, zumal die Abgrenzung und systematische Einordnung der Sippen weit schwieriger erscheint als bei den Gefäßpflanzen, doch haben wir in den letzten 20 Jahren (vor allem dank der Monographen) beachtliche Fortschritte zu verzeichnen. Floristisch ist die BRD, zumindest was die Blätter- und Röhrenpilze, die Porlinge und einige weitere Taxa anlangt, schon recht gut erfaßt; die Chorologie (= die Kenntnis der geografischen Verbreitung), wie die Soziologie und Ökologie der Pilze ein noch recht junger Zweig der Mykologie, ist dagegen bis heute nur wenig über vereinzelte, oft lückenhafte und meist nur regionale Darstellungen hinausgekommen. Schuld daran ist die immer noch unzureichende pilzfloristische Erfassung weiter Teilgebiete der BRD und angrenzender Länder, weil die Sippenkenntnis auf eine zu kleine Zahl engagierter Amateure und geschulter Mykologen beschränkt ist. Dies sollte sich ändern!; denn hier bietet sich für die Mitglieder der DGfP ein lohnendes Arbeitsfeld an, das nur zu bewältigen ist, wenn Spezialisten, Fachmykologen und Amateure, Mykophile sich in Arbeitsgemeinschaften zusammenfinden.

Um den Kenntnisstand in der Pilzgeografie zu erhöhen, gründete man 1960 während des europäischen Mykologenkongresses in Prag ein Komitee, das die Kartierung ausgewählter Großpilze in Europa organisieren und fördern sollte. Man wählte zunächst 100 auffällige, z. T. leicht kenntliche Arten aus und rief in den mykologischen Publikationsorganen (innerhalb der BRD z. B. in der Zeitschrift f. Pilzkunde und in den Westfälischen Pilzbriefen) zur Mitarbeit an dem in vier Abschnitte unterteilten Programm auf. Nachdem schon 1966 Hansen und Lange einen ersten Bericht vorgelegt hatten, erschien 1971 für das Gebiet der BRD eine richtungweisende ausführliche Arbeit von Bresinsky und Dichtel, in welcher die möglichen Kartierungsmethoden vorgestellt und diskutiert sowie von 73 der 100 Arten sogenannte „Grundfeld-Karten“ veröffentlicht wurden. Von 50 Arten brachte L. Lange 1974 bereits die ersten Europa-Karten heraus; freilich fehlen dort leider so wichtige Länder wie die Sowjetunion, Spanien und Italien.

1973 erfolgte (in unserer Zeitschrift) ein „Aufruf zur Mitarbeit am 2. Kartierungsvorhaben von Großpilzen in der BRD“. Dies Programm war von A bis F in Abschnitte gegliedert; u. a. sollten weitere 43 Arten auf Meßtischblattbasis „feinkartiert“ werden, vor allem jedoch wurden bei einigen Arten (Hallimasch, Echter Zunderschwamm, Eiszitterling, Grünspanbecherlinge) genauere Beobachtungen verlangt, so zur Wirtswahl, zur Variabilität der Fruchtkörper, zur Phänologie, zur Myzelverbreitung im Vergleich zum Auftreten von Fruchtkörpern. – Die ersten Karten wurden in Beiheft 1 zur Zeitschrift f. Pilzkunde im März 1976 veröffentlicht.

2. Neuer Aufruf zur Mitarbeit

Um etwaige Konfusionen und vor allem Informationsrückstände zu vermeiden (zum einen gab es ab 1973 Arten, die auf Grundfeldern, andere, die auf Meßtischblattbasis zu kartieren waren; zum anderen sind viele in den letzten Jahren neu zur DGF gestoßene potentielle Mitarbeiter nicht informiert), haben wir im Mai 1976 für den Bereich der BRD und angrenzende Teile Mitteleuropas (vgl. Karte S. 146) die Programme I und II vereinigt und neue Meldelisten drucken lassen, in denen alle bisherigen 143 (sowie 7 „neue“) Arten alphabetisch aufgeführt und durchnummeriert sind.

Bezugsraster ist ab jetzt nicht mehr das Grundfeld, sondern (wie bei der botanischen Kartierung) die Topografische Karte 1 : 25 000, also das Gradabteilungsblatt oder Meßtischblatt, abgekürzt MTB! Die Feldgröße der MTB beträgt etwa 12 x 11 km, also rund 132 qkm; die BRD umfaßt (mit von politischen Grenzen geschnittenen Teilfeldern) etwa 2300 solche MTB, die von unserer Kartengrundlage erfaßte Landfläche ist etwa doppelt so groß. Jedes Kartenblatt innerhalb der BRD besitzt eine vierstellige Kenn-Nummer.

3. Die vollständige Artenliste

001 <i>Agaricus xantheroderma</i>	041 <i>Cyphella digitalis</i>	081 <i>Lactarius lignyotus</i>
002 <i>Agrocybe aegerita</i>	042 <i>Cystoderma carcharias</i>	082 <i>Lactarius necator</i>
003 <i>Agrocybe erobia</i>	043 <i>Dictyophora duplicata</i>	083 <i>Lactarius picinus</i>
004 <i>Amanita caesarea</i>	044 <i>Endoptychum agaricoides</i>	084 <i>Lactarius repraesentaneus</i>
005 <i>Amanita citrina</i>	045 <i>Fistulina hepatica</i>	085 <i>Lactarius scrobiculatus</i>
006 <i>Amanita echinocephala</i>	046 <i>Fomes fomentarius</i>	086 <i>Lentinellus cochleatus</i>
007 <i>Amanita ovoidea</i>	047 <i>Fomitopsis annosa</i>	087 <i>Lyophyllum palustre</i>
008 <i>Amanita phalloides</i>	048 <i>Fomitopsis rosea</i>	088 <i>Marasmius alliaceus</i>
009 <i>Amanita porphyrea</i>	049 <i>Galerina paludosa</i>	089 <i>Marasmius epidryas</i>
010 <i>Amanita regalis</i>	050 <i>Ganoderma applanatum</i>	090 <i>Melanoleuca evenosa</i>
011 <i>Amanita strobiliformis</i>	051 <i>Ganoderma lucidum</i>	091 <i>Melanophyllum echinatum</i>
012 <i>Anellaria semiovata</i>	052 <i>Geastrum melanocephalum</i>	092 <i>Micromphale foetidum</i>
013 <i>Anthurus aseroeiformis</i>	053 <i>Geastrum triplex</i>	093 <i>Montagnites candollei</i>
014 <i>Armillaria luteovirens</i>	054 <i>Geopetalum carbonarium</i>	094 <i>Mycena belliae</i>
015 <i>Armillariella ectypa</i>	055 <i>Gerronema chrysophylla</i>	095 <i>Mycena crocata</i>
016 <i>Armillariella mellea</i>	056 <i>Gerronema fibula</i>	096 <i>Mycena pelianthina</i>
017 <i>Armillariella tabescens</i>	057 <i>Gerronema strombodes</i>	097 <i>Mycenastrum corium</i>
018 <i>Astraeus hygrometricus</i>	058 <i>Gerronema swartzii</i>	098 <i>Myriostoma coliforme</i>
019 <i>Auriscalpium vulgare</i>	059 <i>Gomphidius maculatus</i>	099 <i>Omphalotus olearius</i>
020 <i>Boletinus cavipes</i>	060 <i>Gomphidius roseus</i>	100 <i>Oudemansiella mucida</i>
021 <i>Boletus aereus</i>	061 <i>Gomphus clavatus</i>	101 <i>Oxyporus populinus</i>
022 <i>Boletus appendiculatus</i>	062 <i>Grifola gigantea</i>	102 <i>Phaeolepiota aurea</i>
023 <i>Boletus fechtneri</i>	063 <i>Grifola umbellata</i>	103 <i>Phallus hadrianus</i>
024 <i>Bondarzewia montana</i>	064 <i>Gyroporus castaneus</i>	104 <i>Phallus impudicus</i>
025 <i>Bulgaria inquinans</i>	065 <i>Haasiella venustissima</i>	105 <i>Phellinus hartigii</i>
026 <i>Calvatia cretacea</i>	066 <i>Hapalopilus nidulans</i>	106 <i>Phlebia radiata</i>
027 <i>Calvatia gigantea</i>	067 <i>Hebeloma radicosum</i>	107 <i>Pholiota destruens</i>
028 <i>Catathelasma imperiale</i>	068 <i>Hirneola auricula-judae</i>	108 <i>Pholiota heteroclita</i>
029 <i>Choiromyces venosus</i>	069 <i>Hydnellum suaveolens</i>	109 <i>Phylloporus rhodoxanthus</i>
030 <i>Chlorosplenium spec.</i>	070 <i>Hygrocybe coccinea</i>	110 <i>Piptoporus betulinus</i>
031 <i>Clathrus ruber</i>	071 <i>Hygrocybe psittacina</i>	111 <i>Pisolithus tinctorius</i>
032 <i>Clavariadelphus pistillaris</i>	072 <i>Hygrocybe punicea</i>	112 <i>Pleurocybella porrigens</i>
033 <i>Clavariadelphus truncatus</i>	073 <i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	113 <i>Pleurotus eryngii</i>
034 <i>Climacodon septentrionalis</i>	074 <i>Hygrophoropsis olida</i>	114 <i>Pluteus leoninus</i>
035 <i>Clitocybula lacerata</i>	075 <i>Hygrophorus marzuolus</i>	115 <i>Podofomes trogii</i>
036 <i>Clitopilus prunulus</i>	076 <i>Hymenochaete mougeotii</i>	116 <i>Polyporus alveolaris</i>
037 <i>Coprinus comatus</i>	077 <i>Inocybe jurana</i>	117 <i>Poria punctata</i>
038 <i>Coprinus picaceus</i>	078 <i>Inocybe patouillardii</i>	118 <i>Porphyrellus pseudoscaber</i>
039 <i>Cortinarius violaceus</i>	079 <i>Kuehneromyces mutabilis</i>	119 <i>Psathyrella ammophila</i>
040 <i>Cyathus olla</i>	080 <i>Laccaria amethystina</i>	120 <i>Pseudohydnum gelatinosum</i>

121 Pseudoplectania vogesiaca	131 Russula mustelina	141 Stropharia hornemannii
122 Ptychoverpa bohemica	132 Sarcodontia setosa	142 Suillus bovinus
123 Pulveroboletus cramesinus	133 Sarcoscypha coccinea	143 Suillus flavidus
124 Pycnoporus cinnabarinus	134 Sarcosoma globosum	144 Tremiscus helvelloides
125 Ramaria ochraceovirens	135 Schizophyllum commune	145 Tricholomopsis decora
126 Rhizina undulata	136 Sclerotinia tuberosa	146 Tricholoma sulphureum
127 Rozites caperata	137 Sistotrema confluens	147 Tylopilus felleus
128 Russula flava	138 Stereum frustulosum	148 Verpa conica
129 Russula lepida	139 Strobilomyces floccopus	149 Volvariella bombycina
130 Russula virescens	140 Stropharia aurantiaca	150 Xerocomus parasiticus

4. Informationen zur Artenliste

Es wurden die im 1. und 2. Aufruf verwendeten wissenschaftlichen Namen beibehalten, auch wenn diese inzwischen nicht mehr offiziell gültig sind (daher z. B. *Calvatia gigantea* statt *Langermannia g.*, *Lyophyllum palustre* statt *Tephrocybe p.*); Autorenzitate und deutsche (volkstümliche) Pilznamen sind aus Platzgründen weggelassen worden. Manche Benennungen umfassen Sammelarten (so *Chlorosplenium*; *Cortinarius violaceus* umfaßt hier auch *C. hercynicus*; *Porphyrellus pseudoscaber* beinhaltet 2 Sippen u. a.); bei solchen Taxa sind differenzierte morphologische und/oder ökologisch-soziologische Begleitdaten stets erwünscht. (Vergleiche auch die Rubrik Fragen – Antworten in unserer ZfP-Heft B!)

5. Zur Meldetechnik

Wir haben 2500 Meldelisten drucken lassen und den bisherigen Mitarbeitern jeweils mehrere Blätter zugesandt mit der Bitte, soweit noch nicht geschehen, die bisherigen Angaben auf MTB-Bezugsraster umzuschreiben. Wir selbst haben eine große Zahl von Informationen aus Herbarien und der Literatur auf MTB-Raster übertragen.

Die Mitarbeiter sollten von ihren Beobachtungsgebieten Meßtischblätter vorliegen haben (im Buchhandel erhältlich); wer MTB-Karten im Maßstab 1 : 50 000 besitzt, kann auch diese verwenden: man zieht ein Achsenkreuz ein. Der untere linke Quadrant entspricht genau der L-Nummer! Beispiel: Die Topografische Karte 1 : 50 000 von Schwäbisch Gmünd hat die Nummer L 7124. Nach Einzug des Achsenkreuzes entsprechen die vier Quadranten den MTB-Flächen

links oben: 7024	rechts oben: 7025
links unten: 7124	rechts unten: 7125

In ähnlicher Weise könnten notfalls auch in den Karten 1 : 100 000 MTB-Flächen ausgeschieden werden; doch sind die so gewonnenen 16 Felder recht klein und erlauben wenig genaue Begleitdaten. Auch aus geografischen Koordinaten läßt sich die Meßtischblatt-Nummer ermitteln (vgl. Zeitschrift f. Pilzkunde, Bd. 37, 1971, S. 135!).

Wie Karte S. 146 zeigt, reichen die bisherigen Meldungen bei weitem nicht aus, ein einigermaßen befriedigendes Bild von der Verbreitung der Arten zu ermitteln. Deshalb sollten sich alle Mitglieder der DGfP an der Aktion beteiligen!

Zunächst sollte sich jeder bemühen, rasch so viele der 150 Kartierungspilze wie möglich kennen und sicher ansprechen zu lernen. Es wird angeregt, in Pilzvereinen, Arbeitsgemeinschaften, in Schulen, Volkshochschulen und Hochschulen in geeigneter Weise (etwa mittels Lichtbildervorträgen) auf das Programm hinzuweisen und um Mitarbeit zu bitten.

Alle bisher notierten Funde sollten möglichst rasch an uns weitergemeldet werden, wobei jeweils für den Bereich eines MTB eine Liste auszufüllen ist, in der eindeutige Funde durch Unterstreichen des Pilznamen zu kennzeichnen sind. Im Verlauf der nächsten Jahre (etwa bis 1980) sollten sich die Mitarbeiter verstärkt um die chorologische Erfassung bemühen, wobei mindestens einmal jährlich (am besten vor dem 15. Dezember) Ergänzungslisten erbeten sind.

Über die reine Feststellung der Sippen hinaus erbitten wir auf Beiblättern weitere Angaben: Häufigkeit (Zahl der Fundstellen, etwa nach folgendem Schema: + = eine, 1 = 2–5, 2 = 6–15, 3 = 16–50, 4 = bis 100, 5 = über 100 Fundstellen im MTB), Vergesellschaftung (so z. B. *Suillus bovinus* und *Gomphidius roseus*), Höhenangaben (vor allem am Trauf der Gebirge), Vegetationskomplexe oder wenigstens wichtige Begleitbäume u. a., Substrate, Böden und Untergrund, klimatische Besonderheiten usw. (vgl. auch Rückseite des Meldeblattes). Jeder Mitarbeiter bzw. jede Arbeitsgruppe kann so ein adäquates Forschungsprogramm zurechtlegen, je nach möglichem Zeitaufwand und beabsichtigter Beobachtungsintensität.

Für seltenere und kritische Arten sollte Belegmaterial gesammelt werden. Als solches gilt im allgemeinen: Exsikkat (E), Sporenabwurfpräparat (S), Zeichnung und Beschreibung (Z, B, möglichst mit Mikromerkmalen!), Schwarzweiß- oder Farbfoto (SF, FF), Dia (D). Es erspart Rückfragen, wenn grundsätzlich angegeben wird, welche Arten belegt sind. Bei bestimmten Arten (vgl. Meldeblatt) wird um Zusendung oder gar Überlassung von Belegen gebeten. Vor allem regen wir an, Schwarzweißfotos (für die Veröffentlichung in ZfP) und Farbdias (für unsere Diathek) zur Verfügung stellen zu wollen.

6. Veröffentlichung der Ergebnisse

Die einlaufenden Meldungen werden erfaßt und ausgewertet. In ZfP-B werden ab 1977 Verbreitungskarten sowie Begleittexte veröffentlicht. Zum jetzigen Zeitpunkt erscheint der Abdruck von Karten noch nicht sinnvoll, da weite Gebiete noch kaum bearbeitet sind. Um die Problematik auffällig zu demonstrieren, haben wir die bis zum 20.7.1976 vorliegenden Karten von 10 verbreiteten Arten übereinander projiziert, um so eine Karte der gut, mäßig und nicht oder kaum begangenen MTB-Felder zu erstellen, die trotz gewisser Abstriche dem tatsächlichen Ist-Stand entsprechen dürfte. Es handelt sich um die Arten 008 *Amanita phalloides*, Grüner Knollenblätterpilz; 016 *Armillariella mellea*, Hallimasch; 050 *Ganoderma applanatum*, Flacher Lackporling; 073 *Hygrophoropsis aurantiaca*, Falscher Pfifferling; 079 *Kuehneromyces mutabilis*, Stockschwämmchen; 080 *Laccaria amethystina*, Blauer Lacktrichterlin; 082 *Lactarius necator*, Olivbrauner Milchling; 104 *Phallus impudicus*, Stinkmorchel; 120 *Pseudohydnum gelatinosum*, Eiszitterling; 135 *Schizophyllum commune*, Spaltblättling. Die in der Karte schwarz ausgezogenen Flächen weisen Gebiete aus, in denen mindestens 6 dieser 10 Arten gemeldet sind, in durch Ringe gekennzeichneten MTB wurden 2–5 dieser Arten festgestellt. Es zeigt sich deutlich, daß u. a. große Flächen Niedersachsens, Hessens, die linksrheinischen Landschaften (außer Saarland), aber auch zusammenhängende Gebiete in Süddeutschland noch längst nicht entsprechend begangen sind. Der Sinn dieser Karte sei darin zu suchen, daß von nun ab verstärkt solche „weiße Flecken“ aufgesucht und bearbeitet werden sollten!!

Wir bitten daher nochmals eindringlich um Mitarbeit! Meldelisten sind beim Schatzmeister und beim Schriftführer der DGfP zu erhalten und werden auch während der diesjährigen Tagungen ausgegeben.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für Pilzkunde](#)

Jahr/Year: 1976

Band/Volume: [42_1976](#)

Autor(en)/Author(s): Krieglsteiner German J.

Artikel/Article: [Zur Kartierung von Großpilzen in und außerhalb der BRD - Zwischenbericht und 3. Aufruf zur Mitarbeit - 147-150](#)