
Neue Literatur und Besprechungen.

Literatur.

Unter dieser Rubrik und unter „Besprechungen“ können wir nur Arbeiten aufnehmen, die an Herrn *Kallenbach*, Darmstadt, Frankfurter Straße 57, eingesandt werden. Die Herren Autoren werden im Interesse des raschen Bekanntwerdens ihrer Publikationen jeweils um baldigste Zusendung gebeten!

Josserand, Quelques exemples de variations chez des spores d'Agaricinés. Bull. Soc. Myc. Fr. XLIII. 1925. p. 142—144.

Killermann, Über zwei seltene Polyporaceen in Bayern (*Polyporus xoilopus* Rostk. und Wynnei Bk. et Br.). Hedwigia. LXVII. 1927. p. 125—130.

Konrad et Maublanc, Icones selectae Fungorum. Fasc. 3. 50 Taf. mit Text. Paris 1927.

Krause, Ernst H. L., Fungorum Rostochiensium tabulae X. Unsicher bestimmte, deren richtige Namen ich mir mitzuteilen bitte. Rostock 1927. 12 pp. 10 Bunttafeln (handgemalt).

Krause, Enzyklop. d. mikroskop. Technik. Bd. 2. Fibrinfärbung. Myxomyceten. 1926.

Laubert, Berchtesgadener Schmarotzerpilze. Zentralbl. f. Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten. 70. 1927. p. 45—50.

Maire, R., Etudes mycologiques. Fasc. 2. Bull. Soc. Myc. Fr. XL. 1926. p. 293—317. 7 Taf. Fasc. 3. l. c. XLII. p. 40—42.

—, Une Agaricacée peu connue (*Rhodopaxillus fallax* Quél.-Maire). Bull. Soc. Linn. Nr. 3. 1927.

Martin, Considérations sur le genre *Inocybe*. Bull. Soc. Bot. Genève 1925. p. 308—318.

Meslin, Sur un *Cordyceps* récolté dans la Forêt de Cerisy. Bull. Soc. Linn. Normandie. IX. 1926. p. 75—77.

Mycologia (F. J. Seaver). XIX. Lancaster 1927. Nr. 2—5. Inhalt: Studies on Bermuda Fungi — *Poria leporina* (Seaver, Whetzel, Westcott); The Rusts of South America. Based on the Holway Collections (Jackson); Fungi of Santo Domingo (Toro); A tentative Scheme for the Treatment of the Genera of the Pezizaceae (Seaver); An Empusa Disease of *Drosophila* (Goldstein); Notes on the parasitic Fungi of Illinois (Tehon and Daniels); Contributions to our knowledge of Oregon Fungi (Zeller); Mycological Survey of Porto Rico and the Virgin Islands (Fitzpatrick); Curtis Gates Lloyd (Fitzpatrick); Note on *Myxotheca Hypocreoides* and its Synonymy (Thaxter); Cultural Life Histories of *Diaporthe* (Wehmeyer); *Oedocephalum Fimetarium* and *Peziza vesiculosa* var. *saccata* in Mushroom Beds (Stewart); Two unusual water molds belonging to the Family Lagenidiaceae (Martin); A Pink-colored form of *Polyporus sulphureus* and its probable relationship to Root-rot of Oaks (Rosen); Critical remarks on certain species of *Sclerotinia* and *Monilia* associated with diseases of fruits (Roberts and Dunegan); New species of Lichens from Porto Rico — *Graphidaceae* (Fink); The perfect stage of *Hendersonia Mali* (Hesler); New tropical Fungi (Stevens); Basidia and spores of the *Nidulariaceae* (Martin); Studies of the Fungous Flora of Virgin Soils (Paine); Notes on some Rusts of Colombia (Kern an Chardon); On the occurrence of biflagellate Swarm Cells in certain Myxomycetes (Gilbert); *Lophodermium infectans* Mayr a synonym of *Hypoderma robustum* Tubeuf (Boyce); Miscellaneous Collections of North American Rusts (Hunt); Whye the digerences in published Spore-sizes? (Kauffmann); Notes and Brief-articles.

Newton, Dorothy, The distribution of spores of diverse sex on the hymenium of *Coprinus lagopus*. Annals of Botany. XL. Nr. CLX. Okt. 1926. p. 891—917.

Peltureau, Notes sur les Bolets. Bull. Soc. Linn. Lyon. 1927. p. 11—16.

- Reinhardt, M. O., Mykologische Mitteilungen. Ber. Deutsch. Bot. Ges. XLV. 1927. p. 131—138.
- Romell, Basidiomycetes from Juan Fernandez, collected by C. Skottsberg. The natural History of Juan Fernandez and Easter Islands, vol. II.
- Seyfert, Über Schnallenbildung im Paarkernmyzel der Brandpilze. Zeitschrift für Botanik. 19. 1927. p. 577—601. 22 Abb.
- Schinz, Der Pilzmarkt der Städte Zürich und Winterthur der Jahre 1924 und 1925 im Lichte der städtischen Kontrolle. Vierteljahrsschr. d. Naturforsch. Ges. in Zürich. LXXI. 1926. 32 pp. und 1 Bunttafel.
- Schweiz. Zeitschr. f. Pilzk., 1926. Hefte 6—12. Aus dem Inhalt: Der gelbfleckige Champignon (A. Thellung); Bestimmen der Pilze (Flury); *Lepiota naucina* (Knapp); *Boletus Pierrhuguesii* (Knapp); *Russula adusta* Pers. et *densifolia* Secr. (Konrad); der falsche Eierschwamm (Rinner); der Champignon und seine Zucht; *Boletus chrysenteron* subsp. *versicolor* Rostk. (Konrad); *Morchella crassipes* (Süß); Wie schützt man sich vor Pilzvergiftungen? (Knapp); *Inocybe sambucina* (Knapp); *Encore l'Entolome livide* (Konrad); Pilzausstellungen und Exkursionen (Zaugg); Photographieren von Pilzen (Schreier); Hutpilze und Waldbäume (Fischer); Der größte Täubling, *Russula olivacea* (Knapp); *Lepidella echinocephala* (Süß); *Boletus radicans* et *pulverulentus* (Thellung); Sporenfarbe von *Lepiota naucina* (Romell); Bedeutung des Vorkommens des Elfenbein-Röhrlings unter der Arve (Thellung); Wert der Wulstlinge (Thellung); Sur la toxicité de quelques *Inocybes* (Wiki); Übersicht und Vergleich zweier unserer größten Pilzmärkte der Schweiz (Süß); Die Totentrompete (Thellung).

Erklärung zu Tafel 5: (vergl. Z. f. P., 1928, Heft 4, S. 58 ff).

Frühlingspilze.

- Fig. 1: Weißfüßige Lorchel (*Helvella albipes* Fuckel), Eberstadt b. Darmstadt 11. 5./25, ca. $\frac{1}{3}$ nat. Größe.
- Fig. 2: Speise-Morchel (*Morchella esculenta*), Stockstadt a. Rhein 20. 4./27, ca. $\frac{1}{3}$ nat. Größe.
- Fig. 3: Hohe Morchel (*Morchella elata* Fr.), Eberstadt, auf einer Düne im Kiefernwald 18./4. 27, ca. $\frac{4}{10}$ nat. Gr., ähnlich ist die Spitzmorchel.
- Fig. 4: Glatter Becherling (*Acetabula leucomelas* Pers.), Eberstadt 28. 4./25, ca. $\frac{1}{3}$ nat. Gr.; die 3 linken Pilze sind aus dem Boden genommen, der rechte Pilz eingesenkt zwischen die Kiefernadeln.
- Fig. 5: Breitester Becherling (*Discina perlata* Fr.), Eberstadt 28. 4./25, ca. $\frac{1}{2}$ nat. Gr.
- Fig. 6: Speise-Lorchel (*Helvella esculenta*), Eberstadt 16. 4./27, ca. $\frac{1}{3}$ nat. Gr.
- Fig. 7: Aderiger Becherling (*Discina venosa* Pers.), Stockstadt 22. 4./27, ca. $\frac{1}{4}$ nat. Gr.
- Fig. 8: Stern-Becherling (*Plicaria coronaria*), Eberstadt 13. 5./25, ca. $\frac{1}{3}$ nat. Gr.; an den Stellen wo sich der Fruchtkörper sternförmig öffnet, sieht man deutlich eine Schichtung des Fleisches; die innere Schicht enthält die Sporenschläuche (Fruchtschicht).
- Fig. 9: Zinnoberroter Becherling (*Sarcoscypha coccinea*) auf faulendem Ästchen, leg. Huber-Wiener-Neustadt 22. 3./27, ca. $\frac{2}{5}$ nat. Gr.
- Fig. 10: Kegelwarziger Drüsling (*Exidia glandulosa* Fr.), Darmstadt 17. 6./27, ca. $\frac{1}{2}$ nat. Gr., an Eichenast; dieser Gallertpilz ist kein eigentlicher Frühlingspilz, sondern das ganze Jahr über anzutreffen; die schönsten Fruchtkörper findet man jedoch im Frühjahr und im Herbst; die charakteristischen Wärcchen sind stellenweise gut sichtbar.
- (Sämtliche Aufnahmen von F. Kallenbach, Darmstadt, mit Zeiß-Tessar.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für Pilzkunde](#)

Jahr/Year: 1928

Band/Volume: [7_1928](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Neue Literatur und Besprechungen 95-96](#)