

II. Sachregister.

	Seite.		Seite.
Actaeonina ovata n. sp. . .	383	Basalte, aus der Gegend v.	
— transatlantica n. sp. . .	383	Cassel	48
Actinocamax quadratus . .	919	Belchen, Eruptivgänge im	
Apatit in Basalt der Gegend		Granit des	858
von Cassel	62	— Granitstock des Elsässer	839
Alaria acute-carinata n. sp.	413	Beneckeia Buchi v. ALB. .	896
Amphibolgranit, Biotit füh-		— cognata n. sp.	898
render, des Belchen . .	844	Beyrichia Damesi n. sp. .	502
Amphibolitisation von Dia-		— erratica n. var. acuta .	499
basgesteinen im Contact-		— hieroglyphica n. sp. . .	501
bereich von Graniten . .	257	— Reuteri n. sp.	504
Ancylus (Ancylatrum) sub-		— Stensloffii n. sp. . . .	505
tilis sp. n.	357	Bimsstein des Cabo de Gata	688
Andalusit aus der Harzbur-		Biotit im Belchengranit . .	850
ger Forst	534	Biotit-Andesit des Cabo de	
Andesite des Cabo de Gata	706	Gata	706
Anomia Koeneni n. sp. . .	417	Biotitaugit-Granit des Elsäs-	
— n. sp.	394	ser Belchen	853
Argentinische Cordillere, Geo-		Bollia rotundata n. sp. . .	497
logie des Ostabhanges . .	369	— semicircularis n. sp. . .	497
Argentinien, Eocän der Cor-		— sinuata n. sp.	498
dillere von	378. 419	Bothriolepis	909
— Jura, mittlerer, der Cor-		Brachydeirus bidorsatus v.	
dillere von	373. 397	KÖEN.	906
— Lias d. Cordillere v. 370.	379	Buntsandstein an der Bahn	
— Neocom der Cordillere		von Stuttgart nach Schil-	
von	377. 417. 418	tach	247
— Tithon der Cordillere von	374	Bursulella rostrata n. sp. .	512
	398	Bythocypris cornuta n. sp. .	510
Astarte aequilatera n. sp. .	415		
Atrypa desquamata Sow.		Cabo de Gata, Eruptivge-	
var. nov. alticola . . .	680	steine des	688
Augit in Basalt der Gegend		— geolog. Bau des	323
von Cassel	48. 54	Calianassa prisca n. sp. . .	208
— im Belchengranit 851. 855. 856		— suprajurensis ÉT. . . .	209
Azeca Boettgeri n. sp. . .	364	Callipteris conferta mit Frass-	
		gängen	978
Bänderung im Gabbro vom		Cambrische Geschiebe bei	
Radauthal	533	Groningen	792

	Seite.		Seite.
Cassel, Basalte aus der Gegend von	43	Diluvium von Rügen, Lageverhältnisse des . . .	723
Ceratites antedecens BEYR. aus Württemberg	734	Dimorphismus der Magnesia	231
Cercomya angustissima n. sp.	414	Dioritischer Granit des Elsässer Belchen	858
Cerithium Bodenbenderi n. sp.	382	Dislocationsmetamorphismus	915
Chistolithschiefer im Oberlausitzer Flachlande . . .	526	Dreyssensia VAN BEN. . .	923
Chlorosaphir aus dem Siebengebirge	821	Druckerscheinungen im Wellenkalk von Arnstadt . .	980
Clausilia (Charpentieria) Gobanzi n. sp.	366	Echiniden, reguläre, Verbreitung der, in der norddeutschen Kreide	236
— (Pseudidyla) Standfesti n. sp.	367	Eisenglanz in Basalt der Gegend von Cassel	62
Coccosteus	903.	Elephas antiquus, Milchzähne von	820
Codiaceen, fossile	295	Encrinus aculeatus BEYR. .	739
Coleia macrophthalma n. sp.	177	Entomis sigma var. n. ornata	509
Concretionen aus Sandsteinen und Sanden	790	Eocän im nordwestl. Ungarn, Brackwasserfauna des	801
Congeria PARTSCH	923	— von St. Britz, Steiermark	952
— chonioides COSMANN . . .	957	Erdrinde, Beweglichkeit der	226
— curvirostris COSMANN . . .	956	Eruptivgesteine, Analysen v.	15
— stiriaca ROLLE	946	— Eintheilung und chemische Beschaffenheit . . .	1
Constitutions- und Krystallwasser	267	— von Cabo de Gata . . .	339
Contacterscheinungen am Glimmerschiefer d. Schneekoppe	730	Eryma anisodactylus n. sp.	207
Contacthöfe der Granite des Harzes	752	— crassimanus n. sp. . . .	205
Corallineen, fossile	295	— elegans var. nov. gracilis	199
Cricodus	902	— — major	198
Culm, Discordanz zwischen Waldenburg. Schichten u.	277	— fossata n. sp.	205
— von Hainichen-Chemnitz	282	— maeandrina n. sp. . . .	204
Cyrtocrinus nov. gen.	602	— numismalis QU.	198
— granulatus n. sp.	611	— ventrosa var. nov. subhercynica	202
— nutans GOLDF. sp.	605	Encrinus aculeatus v. MEYER	890
— Thersites n. sp.	610	— Wagneri BEN.	879
Dacite des Cabo de Gata . .	696	Eryon aff. arctiformis v. SCHLOTH.	183
Decapoden d. norddeutschen Jura	171	— Hartmanni v. MEYER . .	183
Devon der Ostalpen	672	Eugeniocrinus MILLER . . .	641
Diabasartige Gesteine des Elsässer Belchen	862	— alpinus Oost.	649
Diabasgesteine, Amphibolitisation durch Contact mit Graniten	257	— caryophyllatus SCHLOTH. sp.	643
Diabasschiefer d. Taunus	750.	— Dumortieri LOR.	647
Dictyodora Liebeana	551	— Zitteli n. sp.	646
Diluvialgeschiebe, silurische, Ostracoden aus	488	Excursionen im Anschluss an die allgemeine Versammlung in Freiberg i. S.	830
		Exipulites Neesii GÖPP. . .	978
		Feldspäthe, Mischungsgesetz der	254

	Seite.		Seite.
Fische, natürliche Systematik der	154	Hauchecorneit	977
— tertiäre Otolithen von	77	Helix (Campylea) Standfesti n. sp.	360
Flussspath v. Oberhof, Thüringer Wanld	980	Holopocriniden	557
— von Rabenstein bei Sarnt-heim, Tirol	554	Holopus Rangii D'ORB.	621
Gabbro, gebändert, aus dem Radauthal	533	— spileccensis SCHLÜT. sp.	620
— mit Quarzeinschluss aus dem Radauthal	554	Homomya Bodenbenderi n. sp.	385
Gänge, Erz führende, von Cabo de Gata	344	Hoplites calistoides n. sp.	402
Geologie in Beziehung zur Landwirthschaft	811	— mendozanus n. sp.	399
Geschiebe, cambrische und silurische, bei Groningen	792	— protractus n. sp.	401
Girvanella problematica NICH. u. ETH.	301	Hornblende im Belchengranit	849
Glas in Basalten der Gegend von Cassel	63	Hornblendeandesit des Cabo de Gata	706
Glimmer in Basalt der Gegend von Cassel	62	Hornblende - Porphyrit im Oberlausitzer Flachlande	526
Glimmerandesite des Cabo de Gata	709	Hornblendesericit - Schiefer K. KOCH's	914
Glimmersyenitporphyr des Elsässer Belchen	862	Hymettos-Marmor, Korallen aus	525
Glyphea ambigua v. FRITSCH	188	Hypersthen-Augit-Andesite	720
— Bronni RÆM.	192	Ilmenit in Basalt der Gegend von Cassel	61
— leionoton n. sp.	194	Isochilina erratica n. sp.	491
— liasina v. MEYER	190	Jura, norddeutscher, Decapoden des	171
— Meyeri RÆM.	193	Kalkalgen, fossile	295. 971
— Münsteri VOLTZ	191	Kloedenia Kiesowi n. sp.	506
— pustulosa v. MEYER	193	Kreide Norddeutschlands, Verbreitung der regulären Echiniden in der	236
— Udressieri v. MEYER	190	Krystallwasser und Constitutionswasser	267
Gold vom Cerro Colorado, Mexico	822	Lauenburg, Cardium führenden Sande bei	976
Gomphostrobus bifidus E. GEIN. sp.	979	— Torflager von	976
Granite, Contactwirkungen von, auf Diabasgesteine	257	Leptochirus sp.	209
Granitporphyre des Elsässer Belchen	858	Limburgite der Gegend von Cassel	68
Granitstock des Elsässer Belchen	839	Limnaeus, untermiocäne Arten	354
Grauwacke der Südvogesen	867	Liparitische Gesteine d. Cabo de Gata	688. 693
— eruptive Lager in der	871	Liparitpechstein d. Cabo de Gata	693
Griechenland, Fossilreste aus	524	Lithiotis problematica GÜMBEL	531
Groningen, Geschiebe bei	792	Lithothamnium, Arten von	302. 071
Gymnocrinus LOR. emend. JAEK.	630	— Tetraspongien von	332. 972
— Moussoni DESOR sp.	639	— amphiroaeformis n. sp.	314

	Seite.		Seite.
Lithothamnium Aschersoni		Neogen in Griechenland . .	421
— SCHWAGER	316	Nephelin in Basalt der Ge-	
— cenomanicum n. sp. . . .	313	gend von Cassel	58
— gosaviense n. sp.	314	Nephelinbasalt der Gegend	
— mamillosum GÜMB. . . .	315	von Cassel	74
— nummuliticum GÜMB. . . .	316	Neritina locrensis n. sp. . .	474
— racemus ARESCH.	320	Nevadite des Cabo de Gata	709
— ramosissimum REUSS . . .	320	Nothosaurus latissimus GÜ-	
— Rosenbergi K. MART. . . .	317	RICH	967
— suganum n. sp.	319	Oberschlesien, mariner Hori-	
— torulosum GÜMB.	318	zont der Steinkohle von . .	974
— tuberosum GÜMB.	317	Oceanniveau, Constanz des . .	228
— turoicum n. sp.	313	Octonaria elliptica n. sp. . .	508
Lucina argentina n. sp. . . .	415	Olivin in Basalt der Gegend	
		von Cassel	44
Macroura des norddeutschen		Orhomalus astartinus ÉT. . .	218
Jura	173	— macrochirus ÉT.	215
Magnesia, Dimorphismus der	231	Orphnea sp. (Glyphea) . . .	198
Magnetit in Basalt der Ge-		Orthis Goescheni n. sp. . . .	680
gend von Cassel	59	Orthoklas im Belchengranit	847
Marmor von Mecklinghausen	548		855
Mecklinghausen, Marmor von	548	Ostalpen, Devon der	672
Mecochirus cf. locusta QU. .	188	Ostrakoden aus Silurgeschie-	
— n. sp.	184. 187	ben	488
— socialis v. MEYER sp. . . .	185	Otolithen tertiärer Fische . .	77
Melanopsis carinato-costata	468	Otolithus (Agonus) primas n.	
— Conemenosiana	469	sp.	131
— Eleis n. sp.	465	— (Arius) crassus K.	80
— pseudocostata n. nom. . .	465	— — danicus n. sp.	81
— stamnana	469	— — germanicus n. sp. . . .	81
Melanosteiren	466	— — Vangionis n. sp.	81
Melilith in Basalt der Ge-		— (Berycidarum) austria-	
gend von Cassel	59	cus n. sp.	122
Mennige pseudomorph		— — debilis n. sp.	122
nach Weissblei von Lead-		— — geron n. sp.	120
ville	821	— — mediterraneus n. sp. . .	122
Mexico, Mineralien aus . . .	821	— — neglectus n. sp.	123
Millericrinus mespiliformis,		— — parvulus n. sp.	121
anomal	741	— — rhenanus n. sp.	120
Mineralchemie	267	— (Clupea) testis n. sp. . . .	82
— Aufgaben und Ziele der	819	— (Corvina) gibberulus K. . .	111
Minette des Elsässer Belchen	862	— (Deutex) nobilis n. sp. . .	124
Minirlarvengänge an Callip-		— (Fierasfer) nuntius n. sp. .	99
teris	978	— — posterus n. sp.	100
Mittelloligocäner . Grünsand		— (Gadidarum) ponderosus	
v. Magdeburg, feste Sand-		K.	90
steinbänke in	522	— (Gadus) elegans K.	93
Mucronaten-Kreide bei Kö-		— — simplex n. sp.	91
nigslutter	919	— — spectabilis n. sp.	94
Muschelkalk, unterer, von		— — tenuis n. sp.	92
Jena, Versteinerungen aus	879	— — venustus n. sp.	91
Mytilus membranaceus DKR.	945	— (Gobiidarum) dispar n. sp.	133

	Seite.		Seite.
Otolithus (Gobius) franco-		Otolithus (Sciaena) amplus	
furtanus n. sp.	132	n. sp.	110
— — vicinalis n. sp. . . .	133	— holsaticus n. sp. . . .	107
— (Hoplosthetus) ingens		— — irregularis K. . . .	109
n. sp.	117	— — Kirchbergensis n. sp.	109
— — laciniatus K.	117	— — meridionalis n. sp. .	109
— — Lawleyi n. sp.	115	— — obtusus n. sp. . . .	110
— — Nettelbladi n. sp. . . .	116	— — speciosus n. sp. . . .	108
— — ostiolatus n. sp. . . .	116	— (Sciaenidarum) insignis	
— — pisanus n. sp.	115	K.	112
— (Macruridarum) singula-		— — ovatus K.	111
ris n. sp.	98	— (Scombridarum) thynnoi-	
— (Macrurus) praecursor		des n. sp.	130
n. sp.	96	— (Serranus) distinctus n.	
— (Merlangus) cognatus n. sp.	89	sp.	125
— — spatulatus n. sp. . . .	89	— — Noetlingi n. sp. . . .	124
— — vulgaris var. suffol-		— (Solea) approximatus n.	
kensis	90	sp.	106
— (Merluccius) attenuatus		— — guestfalicus n. sp. . .	106
n. sp.	84	— — lenticularis K. . . .	106
— — balticus K.	83	— (Sparidarum) gregarius	
— — emarginatus K.	84	n. sp.	128
— — miocenicus n. sp. . . .	85	— (Trachinus) mutabilis n.	
— — obtusus n. sp.	85	nom.	112
— (Monocentris) hospes K.	119	— — seelandicus n. sp. . .	113
— — integer K.	119	— — verus n. sp.	113
— — subrotundus K.	118	— (Trigla) adjunctus n. sp.	131
— (Morrhua) faba K.	95	— — ellipticus K.	130
— — latus K.	95	— (inc. sedis) conchaefor-	
— — söllingenensis n. sp.	94	mis K.	135
— (Ophidiidarum) Boett-		— — fallax n. sp.	139
geri n. sp.	100	— — hassovicus n. sp. . . .	138
— — difformis K.	101	— — lunaburgensis n. sp.	137
— — Hilgendorfi n. sp. . . .	103	— — minor K.	135
— — hybridus n. sp.	105	— — robustus n. sp. . . .	136
— — marchicus n. sp.	104	— — umbonatus K.	134
— — obotritus n. sp.	100	Oxynticerus leptodiscus n.	
— — occultus n. sp.	105	sp.	380
— — saxonicus n. sp.	105		
— (Percidarum) aequalis			
n. sp.	127	Palaeastacus	207
— — frequens n. sp.	126	Pecten Bodenbenderi . . .	391
— — moguntinus n. sp. . . .	128	Pelecyporus	906
— — plebejus n. sp.	126	Penaeus sp. ind. (norddeut-	
— — varians K.	125	scher Jura)	173
— (Peristedion) personatus		Perisphinctes Kokeni n. sp.	406
n. sp.	132	Perlite des Cabo de Gata . .	690
— (Platessa) sector K. . . .	105	Perna Taramellii G. БѢНМ.	756
— (Pleuronectidarum) acu-		Photographien von geolog.	
minatus n. sp.	107	Interesse aus Böhmen . . .	800
— (Raniceps) latusulcatus K.	86	— — aus dem Rheinlande . .	820
— — tuberculosus K.	88	Phyllocrinus, Gruppierung der	
— (? Rhombus) rhenanus		Arten von	655
n. sp.	107	— granulatus D'ORB. . . .	654

	Seite.		Seite.
Phyllocrinus Hoheneggeri		Sclerocrinus n. gen.	623. 669
ZITT.	653	— cidaris QU. sp.	626
— intermedius n. sp.	654	— compressus GOLDF. sp.	626
Pikermi, Alter der Schichten von	455	— strambergensis n. sp.	626
Placodermen, devonische	902	Serpula varicosa n. sp.	397
Plagioklas im Basalt der Gegend von Cassel	54. 55	Schneekoppe, Contacterscheinungen am Glimmerschiefer der	730
— im Belchengranit	848. 855	Schwarzwald, Tektonik des	252
Plagioklasbasalte der Gegend von Cassel	69	Silber von Leadville	822
Plauenscher Grund, Flora d. Rothliegenden im	778	— -krystall von Kongsberg	821
— Rothliegendes des	767. 778	— -pseudomorphosen nach Kalkspath aus Mexico	821
Plicatocrinus	554	Silurische Geschiebe bei Groningen	792
Pontisch-caspische Fauna	941	Sphaerocodium Bornemanni n. sp.	299
Primitia elongata n. sp.	494	Sphenopteris furcata BRONGX.	757
— striata n. sp.	496	— Hoeninghausi BRONGX.	290
Productella forojuliensis n. sp.	677	Steinkohlenformation, Discordanz innerhalb der	277
— Herminea n. sp.	677	— Lagerungsverhältnisse d. oberschlesischen	283. 545
Prosopon sp.	218	Stramberg, Crinoiden von	557
Proterobas d. Elsässer Belchen	863	Strepula limbata n. sp.	499
Psammosteus	911	— simplex n. sp.	499
Pseudoglyphea arietina n. sp.	196	Süsswasserkalk, untermiocäner, von Reun, Steiermark	346
Quarzeinschlüsse in Basalt der Gegend von Cassel	65	Taunus, Diabasschiefer des	750
Quarzgänge im Belchengranit	852	Tellur aus Mexiko	821
Quarzporphyr-Effusiv-Decke im Saar-Nahe-Gebiet	736	Tertiär, Fischotolithen aus	77
Quarzporphyrgänge an der Unter-Nahe	535	Tetancrinus n. gen.	628
Rechnungsablage	832	— aberrans LOR. sp.	628
Reun in Steiermark, Fauna des untermiocänen Süsswasserkalkes von	346	Tetracrinus	554. 658
Rothliegendes, des Plauenschen Grundes	767	Thlipsura personata n. sp.	509
— Flora des, im Plauenschen Grunde	778	— simplex n. sp.	508
Rothpletzia	749	— tetragona n. sp.	508
Rudisten, Zusammenhang mit Ascidien	747	Tichogonia eocenica MÜN.-CHALM.	953
Rügen, Diluvialablagerungen von	723	— euchroma OPPENH.	954
Rutschflächen im Buntsandstein von Marburg	791	Titanit im Belchengranit	851
Saar-Nahe-Gebiet, Effusivdecke v. Quarzporphyr im Sandin in Basalt d. Gegend von Cassel	736	Tormocrinus veronensis n. sp. n. gen.	657
	57	Trias am Nordfuss des mittl. Thüringer Waldes	263
		Turbo Bodenbenderi n. sp.	413
		Ungarn, nordwestl., eocäne Brackwasserfauna des	801

	Seite.		Seite.
Untermiocäner Süßwasser-		Vulcancentren, niederrhei-	
kalk v. Reun, Steiermark	346	nische	822
Uralit im Biotitaugit-Granit			
des Belchen	856	Waldenburger Becken, Dis-	
Valvata (Aegaea) Philippsoni		cordanz zwischen Culm u.	
n. sp.	473	Waldenburger Schichten	
— — vivipariformis n. sp.	462	im	277
Verwitterungserscheinungen		Württemberg, geognostische	
in Basalt der Gegend von		Profile längs der Eisen-	
Cassel	64	bahnen in	244
Vivipara (Tulotoma) Lace-		Zinnober, parallelstenglig-	
daemoniorum n. sp. . . .	461	gangförmig, von Almadén	821

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: [43](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft

Artikel/Article: [Sachregister 995-1001](#)