

II. Sachregister.

	Seite.		Seite.
Acanthoceras Mantelli Sow.		Astarte cf. thalassina DUMORT.	36
sp.	506	Autochtonie von Carbon-	
— rhotomagense BRNGT. sp.	507	Kohlenflötzen u. des Senf-	
Acme eocaena n. sp. . . .	120	tenberger Braunkohlen-	
Actaeon albens D'ORB. . .	251	flötzes	609
— marullensis D'ORB. . .	251	Avicula sp.	267. 728
Adamaua, geologische Ver-		— cf. cenomanensis D'ORB.	479
hältnisse von	743	— Cornueliana D'ORB. . .	267
Algäuschiefer, Verhältniss		— gryphaeoides Sow. . .	478
der Bündnerischen zu den		— cf. subplicata D'ORB. .	479
Glarner Alpen	39		
Aliso Almae	200	Bayreuth, über neue Saurier-	
Amphibol- und Pyroxenge-		Funde aus dem Muschel-	
steine, feldspathhaltige .	404	kalke von	331
Ancyloceras Ewaldi DAMES	276	Becksia plicosa	204
— gigas Sow. sp.	275	Belemniten, Vertheilung der	
— variable n. sp.	276	in der unteren Kreide des	
Antigorio-Gneiss	389	nordwestlichen Deutsch-	
Aphrocallistes gracilis . .	209	lands	373
— variopora	207	Belemnites brunsvicensis v.	
*Aperostoma bolcense n. sp.	125	STROMB.	250
— laevigatum SANDB. . . .	124	— paxillosus SCHLOTH. . .	34
— Mazzinorum OPP.	127	Binnenconchylien des Vicien-	
— obtusicastra SANDB. . .	126	tiner Roncà-Complexes .	160
Aporrhais acuta (D'ORB.)		Binnenschnecken, neue, aus	
PICT et CAMP.	255	dem Vicentiner Eocän .	57
Arca carinata Sow.	482	Bohrmuscheln, über den ver-	
— Galliennei D'ORB. . . .	482	suchten Nachweis des In-	
— nana LEYM. sp.	483	terglacial durch	740
Arpadites sp.	734	Bolca, Colle Battaja bei . .	73
Arsen, krystallisirtes, natür-		— Purga di	73
liches, aus Japan	223	Brüx, Katastrophe von . .	610
Astarte disparilis D'ORB. .	260	Buchensteiner Schichten des	
— cf. Eryx ORB.	35	Grignagebirges	700
— cf. Gueuxi ORB.	35	Buliminus sp.	100
— Heberti TERQ. et PIETTE	36	Bulimulus eocaenus OPPENH.	102
— numismalis D'ORB. . . .	259	Bulla sp.	251
— sinuata D'ORB.	261	Bündner Schiefer, Alter der	1
— substriata LEYM.	260		

	Seite.		Seite.
Bündner Schiefer, die liasischen oder Algäu-Schiefer	32	Coenothyris vulgaris	
— Schiefer, die paläozoischen oder eigentlichen	27	SCHLOTH. sp.	724
— Unterlage der, im Norden	17	Coptochilus (Ischyrostoma)	
— desgl., im Süden . . .	9	imbricatus SANDB. . . .	131
Buntsandstein des Grignagbirges	681	Curbula laevis n. sp. . . .	257
		— striatula Sow.	257
		— cf. truncata Sow. . . .	485
		Crassatella subhercynica	
		n. sp.	261
Caïqua-Schicht, über eine, das Hangende und Liegende d. Paffrather Strignocephalen-Kalkes . . .	645	Cucullaea sp.	486
Callodictyon intricatum . .	205	— sp. indet.	266
Cardinia Listeri Sow. . . .	35	— gersdorfensis n. sp. . .	265
Cardita cf. Cottaldina D'ORB.	485	— Raulini LEYM.	265
— neocomiensis D'ORB. . .	259	Cyathopoma eocaenum OPPENH.	128
Cardium Cottaldinum D'ORB.	263	Cyclostoma (Colobostylus)	
— Epaldi n. sp.	263	Marcellanus OPPENH. . .	123
— exaltatum n. sp.	483	Cyclotopsis exarata SANDB.	121
— ventricosum D'ORB. . . .	484	Cypriocardia cf. Escheri GIEB.	728
Cassianella sp.	728	Cyprina spec.	262
Ceratites cf. Beyrichi E. v. M.	732	— Deshayesiana DE LORIO	262
— brembanus E. v. M. . . .	732	— quadrata DORB.	486
— subnodosus E. v. M. . . .	731		
— trinodosus E. v. M. . . .	731	Dentalium valangiense PICT.	
— cf. vindelicus E. v. M. . .	732	et CAMP.	256
Cerithium Clementinum		Dentellocaraculus OPPENH. .	89
D'ORB.	255	Dictyoraphium haldemense .	202
— cf. Derignyanum PICT.		— subtile	203
u. ROUX	501	Dinarites sp.	734
— neocomiense D'ORB. . . .	254	Diplopora pauciforata GÜMB.	
— pseudophillipsii n. sp. . .	255	sp.	716
Chondropoma styx OPPENH.	122	Discina cf. discoides SCHLOTH.	
Cinulia ? avellana BRNGT. sp.	500	sp.	724
Clausilia (Disjunctaria) indifferens SANDB.	107	Disjunctaria BÖTTGER . . .	104
— — lapillorum n. sp. . . .	109		
— — Meneguzzoi n. sp. . . .	108	Elasmostoma acutimargo (A.	
— — oligogyra BÖTTGER . . .	105	Röm.) DE FROMENTEL . . .	274
— (Emarginaria) exsecrata		Elephas antiquus	216
OPPENH.	109	— trogontherii	218
— (Euclausta) cinerum		Emarginula Guerangeri	
n. sp.	111	D'ORB.	502
— — nerinea OPPENH.	110	Emscher, über eine Spongie	
— (Oospira) pugnellensis		aus dem	199
OPPENH.	116	Entrochus dubius BEYR. . .	717
— (Phaedusa) inexplata		— cf. Encrinus liliiformis	
OPPENH.	115	LAM.	716
— — Mazzinorum n. sp. . . .	114	— silesiacus BEYR.	717
— — Satyrus n. sp.	112	Eocän, Vicentiner, Binnenschnecken aus dem . . .	57
— — silenus OPPENH.	112	Esinokalk des Grignagbirges	708
Coelostele eocaena n. sp. . .	119	Euomphalus sp.	729
		Eustylus cf. Zitteli KITTL .	730

	Seite.		Seite.
<i>Exogyra</i> cf. <i>canaliculata</i>		Interglacial, über den ver-	
Sow. sp.	465	suchten Nachweis des,	
— <i>conica</i> Sow. sp.	466	durch Bohrmuscheln . . .	740
— — var. <i>recurvata</i>	466	<i>Janira aequicostata</i> LAM. sp.	472
— cf. <i>haliotidea</i> Sow. sp. . .	465	— <i>atava</i> (A. Röm.) D'ORB.	269
— <i>spiralis</i> GOLDF.	270	— <i>Johannis Boehmi</i> n. sp.	473
— <i>subplicata</i> A. Röm. . . .	270	— <i>quinquecostata</i> Sow. sp.	471
Facieswechsel im Palaeozoi-		Kalksteine bei Finero . . .	413
cum des polnischen Mittel-		Keuper, Aufschlüsse im von	
gebirges	608	Lüneburg	559
Finero, geognostische Skizze		<i>Kingena lima</i> DEFR. sp. . .	456
der Umgegend von	377	Kreide, die untere des sub-	
Frictionerscheinungen, neues		hercynen Quadersandstein-	
Vorkommen von glacialen,		gebirges	227
auf Granit in der Lausitz	211	Lava, Schwefelgehalt der fri-	
Friedrichroda, Tambach und		schen als Ursache des me-	
Kabarz in Thüringen,		tallischen Glanzes	356
Thierfährten bei	570	<i>Lima</i> sp.	268. 726
Gehrener Schichten	600	— <i>Cottaldina</i> D'ORB. . . .	267
<i>Gervillia mytiloides</i> SCHLOTH.		— <i>globosa</i> Sow. sp.	473
sp.	727	— <i>silesiaca</i> n. sp.	725
Glimmersyenit, der von Roth-		— <i>subcarinata</i> BRIART u.	
schönberg bei Deutschen-		CORN.	474
bora i. Königreich Sachsen	534	— <i>subhercynica</i> EWALD . .	268
Goldlauterer Schichten . . .	604	— <i>subpunctata</i> D'ORB. . .	727
<i>Goniogyra</i> ? sp.	731	— — var. <i>incrassata</i> . . .	727
Grigna-Gebirge, Beitrag zur		— cf. <i>tecta</i> GOLDF.	474
Kenntniss des Aufbaues		<i>Limnaeus</i> sp.	136
und der Schichtenfolge im	665	<i>Loxonema</i> (<i>Polygirina</i>) cf.	
<i>Gryphaea cymbium</i> LAM. . .	34	<i>gracilior</i> SCHAUR. sp. . .	730
<i>Helix</i> (<i>Chlorea</i>) <i>Proserpina</i>		— <i>tenuis</i> MÜNST. sp. . . .	730
OPPENH.	96	<i>Lucina subhercynica</i> n. sp..	262
— (<i>Dentellocaracolus</i>) <i>Antigone</i>		Lüneburg, Aufschlüsse im	
OPPENH.	95	Keuper von	569
— — <i>damnata</i> BRONGN. . .	91	Manebacher Schichten . . .	602
— (<i>Helicella</i>) <i>planorbita-</i>		Marmara-Meer, Reise an der	
<i>nus</i> DE GREG.	99	Südküste des	567
— (<i>Prothelidomus</i>) <i>acro-</i>		<i>Mazzinia lirata</i> n. g. n. sp..	132
<i>chordon</i> OPPENH.	97	Menschenzahn, Fund eines	
— — <i>Oppenheimi</i> DE GREG.	96	im Altdiluvium von Tau-	
— <i>nummulitica</i> v. SCHAUR.	97	bach	616
— <i>vicentina</i> v. SCHAUR. . .	98	<i>Melania Bittneri</i> n. sp. . .	139
Hessisches Mitteloligocän,		<i>Melanopsis vicentina</i> OPPENH.	137
Fauna des	595	Mitteloligocän, Fauna d. hes-	
<i>Ichnium acrodactylum</i> . . .	575	sischen	595
— <i>sphaerodactylum</i>	575	<i>Modiola</i> sp.	487
<i>Ichthyosaurus</i> im Tithon Ar-		Muschelkak, Auftreten am	
gentiniens	558	Golf von Ismid	567
<i>Inoceramus orbicularis</i> MSTR.	481	— des Grignagebirges . . .	688
— <i>striatus</i> (MANT.) GOLDF.	480	<i>Myophoria</i> cf. <i>elegans</i> DNKR.	728

	Seite.		Seite.
Mytilus sp.	487	Panopaea Ewaldi n. sp.	281
— Cornuelianus D'ORB.	266	— neocomiensis D'ORB.	256
— simplex (DESH.) D'ORB.	266	— subhercynica n. sp.	280
Nanina Eurydice OPPENH.	99	— Zechi n. sp.	280
Natica sp.	279	Partula vicentina OPPENH.	104
Naticopsis sp.	730	Pecten (Chlamys) elongatus	
Nautilus sp.	734	LAM.	468
— Deslongchampsianus		— (Syncyclonema) orbicu-	
D'ORB.	503	laris Sow.	469
— — — über, aus der obe-		— Cottaldinus D'ORB.	269
ren Kreide	735	— discites SCHLOTH. sp.	725
Neritina bericensis n. sp.	141	— Robinaldinus D'ORB.	269
— roncana n. sp.	142	Pegmatitische Gesteine bei	
Nordthüringen, Tiefbohrun-		Finero	412
gen auf Kalisalz im süd-		Pentacrinus angulatus OPPEL	35
lichen	374	— cf. basaltiformis MILL.	34
Nothosauriden - Fragment,		— psilonoti QUENST.	35
Notiz über ein	303	Peridotit	396
Nothosaurus sp., isolirte		Perledo-Varennakalk	702
Zähne von	341	Perna Mulleti DESH.	267
— Rumpfskelet von	342	Pholadomya elongata MÜNST.	279
— Unterkiefer von	337	Phyllobrissus sp.	273
— Zähne des Unterkiefers		Planorbis muzzolonius	
von	339	n. sp.	134
— baruthicus n. sp.	333	— cf. pseudammonius	
Nucula sp.	486	SCHLOTH. var. Leymeriei	
— Ewaldi n. sp.	264	DESH.	135
— obtusa FITTON	264	— tressinensis OPPENH.	133
Oberhöfer Schichten	605	— vicentinus n. sp.	133
Offleben, Aufdeckung eines		Plessur-Gebirge, ein Aus-	
älteren Torflagers bei	220	flug in's	548
Optonella lettensis	202	Pleurotomaria Brongniartiana	
Opis sp.	487	D'ORB.	488
Ostrea sp.	463	— cf. espaillaciana D'ORB.	493
— n. sp.	725	— Ewaldi n. sp.	490
— (Alectryonia) carinata		— Fittoni A. Röm.	494
LAM.	462	— Gibsi Sow. sp.	493
— — cf. diluviana LINNÉ.	463	— Guerangeri D'ORB.	489
— (Exogyra) Couloni		— cf. Hörnesi STUR	729
(DEFR.) D'ORB.	270	— longimontana n. sp.	493
— (Gryphaea) hippopodium		— subhercynica n. sp.	252
NILS.	464	— tourtiaie n. sp.	489
— decemcostata MÜNST.	724	Plicatula inflata Sow.	477
— macroptera SOW.	271	Polnisches Mittelgebirge, Fa-	
— cf. multicostata MÜNST.	725	cieswechsel im Palaeozoi-	
Paffrath, über das Alter des		cum des	608
Kalkes von	368	Pomatias crassicosta SANDB.	127
Pandanus Simildae STIEH-		Porphyrite bei Finero	416
LER	283	Posidonomya obsolete-striata	
Panopaea sp.	487	TOMM.	727
— carinata n. sp.	281	Pragano zwischen Vestena	

Seite.	Seite.
Pseudoglaciale Erscheinungen in mitteldeutschen Gebirgen	576
Pteroceras bicarinatum DESH. sp.	501
Pterophyllum sp.	283
Ptychites evolvens E. v. M.	734
Pugnellia streptaxis n. sp.	129
Pupa (Paracratula) umbra OPPENH.	104
Quadersandstein-Gebirge, die untere Kreide des subhercynen	227
Quartäre Bildungen des Grignagebirges	711
— — der Val Vigizzo	417
Quenstedticeras, Beitrag zur Kenntniss der Gattung	307
Rauchwacken des Grignagebirges	685
Rhynchonella n. sp.	722
— cf. compressa LAM. sp.	459
— decurtata GIR. sp.	722
— Grasiana D'ORB.	459
— lariana n. sp.	723
— Mantelliana Sow. sp.	457
— — var. difformis	457
— Martini MANT. sp.	458
— multiformis (A. Röm.) DE LORIO	271
— sigma SCHLÖNB.	458
— subhercynica n. sp.	461
— trinodosi BITTN.	723
— — cf. toblachensis	723
Rinden, in die Substanz des bunten Mergels übergeführte aus dem Alluvium.	357
Roncà, Tuff, oberster von	66
Rostellaria cf. Mailleana D'ORB.	501
Rothliegendes des Thüringer Waldes	596
Rothschönberg bei Deutschenbora im Königreich Sachsen, der Glimmersyenit von	534
Saalfeld, Liasfunde bei	371
Saurier-Funde, über neue aus dem Muschelkalke von Bayreuth	331
Schloenbachia Coupei BRNGT. sp.	505
— varians Sow. sp.	504
Scyphia Sacki GF.	194
Sericitschiefer	393
Serpula lophioda GOLDF.	273
— Phillipsii A. Röm.	274
Sesia-Gneiss	390
S. Marcello, gelber Tuff von	65
Solarium bicarinatum n. sp.	496
— ornato-dentatum n. sp.	495
Spessart, genetische Beziehungen des krystallinen Grundgebirges	581
Spiriferina (Mentzelia) ampla BITTN.	720
— — köveskallyensis (Suess) BOECKH.	720
— — var. spitiensis STOLICZKA	720
— — Mentzeli DUNK. sp.	719
— — var. brevirostris BITTN.	719
— — var. illyrica BITTN.	719
— Benecke n. sp.	718
— Canavarica TöMM.	719
— fragilis SCHLOTH. sp.	717
— Possarti n. sp.	718
Spirigera trigonella SCHLOTH. sp.	721
Splügen, Kalkberge bei	20
Spondylus histrix GOLDF.	476
— striatus Sow. sp.	475
Spongien aus der Kreide Wesfalens	194
Stenogyra (Opeas) sp.	101
— — Orci n. sp.	100
Strona-Gneiss	395
Styx supraelegans DE GREG.	130
Tambacher Schichten	606
Taubach, Fund eines Menschenzahnes im Altdiluvium von	616
Tektonik des Grignagebirges	668
Tellina (Areopagia) subhercynica n. sp.	258
— Carteroni D'ORB.	257
? Terebratella Beaumonti D'ARCH. sp.	455
? — hercynica SCHLOENB.	455
Terebratella oblonga (Sow.) D'ORB.	273
Terebratula sp.	453

	Seite.		Seite.
<i>Terebratula arcuata</i> A. RÖM.	453	<i>Trochus albens</i> D'ORB.	253
— <i>biplicata</i> , Artbegriff von	225	— <i>Ewaldi</i> n. sp.	253
— — Sow.	444	— <i>tourtiae</i> n. sp.	499
— — var. <i>longimontana</i>		— <i>undulato-striatus</i> n. sp. .	253
TSN.	445	<i>Turbo Chassyanus</i> D'ORB.	496
— — var. <i>obtusirostris</i>		— <i>impar</i> n. sp.	497
TSN.	446	— <i>Leymerii</i> D'ARCH. sp. .	499
— <i>depressa</i> LAM.	452	— <i>Mulleti</i> D'ARCH.	498
— <i>praelonga</i> SOW.	272	— <i>pseudocarinatus</i> n. sp. .	498
— <i>punctata</i> SOW.	34	? — <i>reticularis</i> n. sp. . .	252
— <i>Robertoni</i> D'ARCH. . . .	451	— <i>subhercynicus</i> n. sp. .	498
— <i>sella</i> SOW.	272	— <i>tricinctus</i> n. sp. . . .	497
— cf. <i>sella</i> SOW.	272	<i>Turrilites cenomanensis</i>	
— <i>subhercynica</i> n. sp. . . .	449	SCHLÜT.	510
— cf. <i>sulcifera</i> MORRIS . .	450	— <i>costatus</i> LAM.	509
— <i>tornacensis</i> D'ARCH. var.		— <i>essenensis</i> GEIN.	509
<i>Schloenbachi</i> TSN.	447	— <i>Jaekeli</i> n. sp.	511
— — — var. <i>crassa</i>		— <i>Scheuchzerianus</i> Bosc. .	508
D'ARCH.	448	? <i>Turritella Gersdorfensis</i>	
— <i>tourtiae</i> n. sp.	449	n. sp.	254
<i>Terebratulina chrysalis</i>		— <i>striata</i> n. sp.	254
SCHLOTH. sp.	454	<i>Uncites Palinae</i> n. sp. . .	658
<i>Thierfährten</i> aus dem Roth-		<i>Venus</i> cf. <i>parva</i> Sow. . . .	484
liegenden von Friedrich-		— <i>seveccensis</i> n. sp. . . .	259
roda, Tambach u. Kabarz		<i>Vesuv</i> , über die Eruption des	
in Thüringen	570	am 3. Juli 1895	363
<i>Thracia</i> cf. <i>neocomiensis</i>		<i>Vulkane</i> , über die räumliche	
(D'ORB.) PICT. et CAMP. . .	280	Anordnung der mexikani-	
Thüringerwald, neue Ueber-		schen	359
sichtskarte des	596	<i>Waldheimia (Aulacothyris)</i>	
Tiefbohrungen auf Kalisalz		<i>angusta</i> SCHLOTH. sp. . .	724
im südlichen Nordthürin-		<i>Weichselia Ludowice</i> STIEH-	
gen	374	LER	274. 282
Torflager, Aufdeckung eines		<i>Wengener Schichten</i> des	
älteren bei Offleben. . . .	220	Gringnabirges	704
<i>Tourtia</i> , die <i>subhercyne</i> und		<i>Worthenia Tornquisti</i> n. sp.	729
ihre <i>Brachiopoden</i> und			
<i>Mollusken-Fauna</i>	423		
<i>Trigonia caudata</i> AG. . . .	264		
— <i>roelligiana</i> n. sp.	282		

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1895

Band/Volume: [47](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft

Artikel/Article: [Sachregister. 761-766](#)