II. Sachregister.

Seite.

Acanthoceras Mantelli Sow. sp. 506
— rhotomagense Brngt. sp. 507
Acme eocaena n. sp. . . . 120
Actaeon albensis d'Orb. . . 251
— marullensis d'Orb. . . 251
Adamaua, geologische Verhältnisse von 743
Algäuschiefer, Verhältniss der Bündnerischen zu den Glarner Alpen 39
Aliso Almae 200
Amphibol- und Pyroxengesteine, feldspathhaltige . 404
Ancyloceras Ewaldi Dames 276
— gigas Sow. sp. . . . 275
— variabile n. sp. . . . 276
Antigorio-Gneiss 389
Aphrocallistes gracilis . . 209
— variopora 207
Aperostoma bolcense n. sp. 125
— laevigatum Sandb. . . 124
— Mazzinorum Opp. . . 127
— obtusicosta Sandb. . . 126
Aporrhais acuta (d'Orb.) Pict et Camp. 255
Arca carinata Sow. . . . 482
— Galliennei d'Orb. . . 482
— nana Leym. sp. . . . 483
Arpadites sp. 734
Arsen, krystallisirtes, natürliches, aus Japan . . . 223
Astarte disparilis d'Orb. . 260
— cf. Eryx Orb. 35
— cf. Gueuxi Orb. . . . 35
— Heberti Terq. et Piette 36
— numismalis d'Orb. . . 259
— sinuata d'Orb. . . . 261
— substriata Leym. . . . 260

Seite.

Astarte cf. thalassina Dumort. 36
Autochtonie von Carbon-Kohlenflötzen u. des Senftenberger Braunkohlenflötzes 609
Avicula sp. 267. 728
— cf. cenomanensis d'Orb. 479
— Cornueliana d'Orb. . . 267
— gryphaeoides Sow. . . 478
— cf. subplicata d'Orb. . 479

Bayreuth, über neue Saurier-Funde aus dem Muschelkalke von 331
Becksia plicosa 204
Belemniten, Vertheilung der in der unteren Kreide des nordwestlichen Deutschlands 373
Belemnites brunsvicensis v. Stromb. 250
— paxillosus Schloth. . 34
Binnenconchylien des Vicentiner Roncà-Complexes . 160
Binnenschnecken, neue, aus dem Vicentiner Eocän . 57
Bohrmuscheln, über den versuchten Nachweis des Interglacial durch 740
Bolca, Colle Battaja bei . . 73
— Purga di 73
Brüx, Katastrophe von . . 610
Buchensteiner Schichten des Grignagebirges 700
Buliminus sp. 100
Bulimulus eocaenus Oppenh. 102
Bulla sp. 251
Bündner Schiefer, Alter der 1

Seite.

Bündner Schiefer, die liasischen oder Algäu-Schiefer 32
— Schiefer, die paläozoischen oder eigentlichen . 27
— Unterlage der, im Norden 17
— desgl., im Süden . . . 9
Buntsandstein des Grignagebirges 681

Caïqua-Schicht, über eine, das Hangende und Liegende d. Paffrather Stringocephalen-Kalkes . . . 645
Callodictyon intricatum . . 205
Cardinia Listeri Sow. . . . 35
Cardita cf. Cottaldina d'Orb. 485
— neocomiensis d'Orb. . 259
Cardium Cottaldinum d'Orb. 263
— Epaldi n. sp. 263
— exaltatum n. sp. . . . 483
— ventricosum d'Orb. . . 484
Cassianella sp. 728
Ceratites cf. Beyrichi E. v. M. 732
— brembanus E. v. M. . . 732
— subnodosus E. v. M.. . 731
— trinodosus E. v. M. . . 731
— cf. vindelicus E. v. M. . 732
Cerithium Clementinum d'Orb. 255
— cf. Derignyanum Pict. u. Roux 501
— neocomiense d'Orb. . . 254
— pseudophillipsii n. sp. . 255
Chondropoma styx Oppenh. 122
Cinulia ? avellana Brngt. sp. 500
Clausilia (Disjunctaria) indifferens Sandb. 107
— — lapillorum n. sp. . 109
— — Meneguzzoi n. sp. . 108
— — oligogyra Böttger . 105
— (Emarginaria) exsecreta Oppenh. 109
— (Euclausta) cinerum n. sp. 111
— — nerinea Oppenh. . 110
— (Oospira) pugnellensis Oppenh. 116
— (Phaedusa) inexpleta Oppenh. 115
— — Mazzinorum n. sp. . 114
— — Satyrus n. sp.. . . 112
— — silenus Oppenh. . . 112
Coelostele eocaena n. sp. . 119

Seite.

Coenothyris vulgaris Schloth. sp. 724
Coptochilus (Ischyrostoma) imbricatus Sandb. . . . 131
Curbula laevis n. sp. . . . 257
— striatula Sow.. . . . 257
— cf. truncata Sow. . . 485
Crassatella subhercynica n. sp. 261
Cucullaea sp. 486
— sp. indet. 266
— gersdorfensis n. sp. . . 265
— Raulini Leym. 265
Cyathopoma eocaenum Oppenh. 128
Cyclostoma (Colobostylus) Marcellanus Oppenh. . . 123
Cyclotopsis exarata Sandb. 121
Cypricardia cf. Escheri Gieb. 728
Cyprina spec. 262
— Deshayesiana de Loriol 262
— quadrata dOrb. . . . 486

Dentalium valangiense Pict. et Camp. 256
Dentellocaracolus Oppenh. . 89
Dictyoraphium haldemense . 202
— subtile 203
Dinarites sp. 734
Diplopora pauciforata Gümb. sp. 716
Discina cf. discoides Schloth. sp. 724
Disjunctaria Böttger . . 104

Elasmostoma acutimargo (A. Röm.) de Fromentel . . 274
Elephas antiquus 216
— trogontherii 218
Emarginula Guerangeri d'Orb. 502
Emscher, über eine Spongie aus dem 199
Entrochus dubius Beyr. . 717
— cf. Encrinus liliiformis Lam. 716
— silesiacus Beyr. . . . 717
Eocän, Vicentiner, Binnenschnecken aus dem . . . 57
Esinokalk des Grignagbirges 708
Euomphalus sp. 729
Eustylus cf. Zitteli Kittl . 730

Seite.

Exogyra cf. canaliculata Sow. sp. 465
— conica Sow. sp. . . . 466
— — var. recurvata . . . 466
— cf. haliotidea Sow. sp. . 465
— spiralis Goldf. . . . 270
— subplicata A. Röm. . . 270

Facieswechsel im Palaeozoicum des polnischen Mittelgebirges 608
Finero, geognostische Skizze der Umgegend von . . . 377
Frictionserscheinungen, neues Vorkommen von glacialen, auf Granit in der Lausitz 211
Friedrichroda, Tambach und Kabarz in Thüringen, Thierfährten bei 570

Gehrener Schichten . . . 600
Gervillia mytiloides Schloth. sp. 727
Glimmersyenit, der von Rothschönberg bei Deutschenbora i. Königreich Sachsen 534
Goldlauterer Schichten . . 604
Goniogyra? sp. 731
Grigna-Gebirge, Beitrag zur Kenntniss des Aufbaues und der Schichtenfolge im 665
Gryphaea cymbium Lam. . 34

Helix (Chlorea) Proserpina Oppenh. 96
— (Dentellocaracolus) Antigone Oppenh. 95
— — damnata Brongn. . 91
— (Helicella) planorbitanus de Greg. 99
— (Prothelidomus) acrochordon Oppenh. . . . 97
— — Oppenheimi de Greg. 96
— nummulitica v. Schaur. 97
— vicentina v. Schaur. . 98
Hessisches Mitteloligocän, Fauna des 595

Ichnium acrodactylum . . 575
— sphaerodactylum . . . 575
Ichthyosaurus im Tithon Argentiniens 558
Inoceramus orbicularis Mstr. 481
— striatus (Mant.) Goldf. 480

Seite.

Interglacial, über den versuchten Nachweis des, durch Bohrmuscheln . . 740

Janira aequicostata Lam. sp. 472
— atava (A. Röm.) d'Orb. 269
— Johannis Boehmi n. sp. 473
— quinquecostata Sow. sp. 471

Kalksteine bei Finero . . . 413
Keuper, Aufschlüsse im von Lüneburg 559
Kingena lima Defr. sp. . . 456
Kreide, die untere des subhercynen Quadersandsteingebirges 227

Lava, Schwefelgehalt der frischen als Ursache des metallischen Glanzes . . . 356
Lima sp. 268. 726
— Cottaldina d'Orb. . . 267
— globosa Sow. sp. . . 473
— silesiaca n. sp. . . . 725
— subcarinata Briart u. Corn. 474
— subhercynica Ewald . 268
— subpunctata d'Orb. . . 727
— — var. incrassata . . 727
— cf. tecta Goldf. . . . 474
Limnaeus sp.. 136
Loxonema (Polygirina) cf. gracilior Schaur. sp. . . 730
— tenuis Münst. sp. . . 730
Lucina subhercynica n. sp.. 262
Lüneburg, Aufschlüsse im Keuper von 569

Manebacher Schichten . . 602
Marmara-Meer, Reise an der Südküste des 567
Mazzinia lirata n. g. n. sp.. 132
Menschenzahn, Fund eines im Altdiluvium von Taubach 616
Melania Bittneri n. sp. . . 139
Melanopsis vicentina Oppenh. 137
Mitteloligocän, Fauna d. hessischen 595
Modiola sp. 487
Muschelkak, Auftreten am Golf von Ismid 567
— des Grignagebirges . . 688
Myophoria cf. elegans Dnkr. 728

Seite.
Mytilus sp. 487
— Cornuelianus D'ORB. . 266
— simplex (DESH.) D'ORB. 266

Nanina Eurydice OPPENH. . 99
Natica sp. 279
Naticopsis sp. 730
Nautilus sp. 734
— Deslongchampsianus D'ORB. 503
— — — über, aus der oberen Kreide 735
Neritina bericensis n. sp. . 141
— roncana n. sp. . . . 142
Nordthüringen, Tiefbohrungen auf Kalisalz im südlichen 374
Nothosauriden - Fragment, Notiz über ein 303
Nothosaurus sp., isolirte Zähne von 341
— Rumpfskelet von . . . 342
— Unterkiefer von . . . 337
— Zähne des Unterkiefers von 339
— baruthicus n. sp. . . . 333
Nucula sp. 486
— Ewaldi n. sp. . . . 264
— obtusa FITTON . . . 264

Oberhöfer Schichten . . . 605
Offleben, Aufdeckung eines älteren Torflagers bei . . 220
Opetionella lettensis . . . 202
Opis sp. 487
Ostrea sp. 463
— n. sp. 725
— (Alectryonia) carinata LAM. 462
— — cf. diluviana LINNÉ . 463
— (Exogyra) Couloni (DEFR.) D'ORB. 270
— (Gryphaea) hippopodium NILS. 464
— decemcostata MÜNST. . 724
— macroptera SOW. . . . 271
— cf. multicostata MÜNST. 725

Paffrath, über das Alter des Kalkes von 368
Pandanus Simildae STIEHLER 283
Panopaea sp. 487
— carinata n. sp. . . . 281

Seite.
Panopaea Ewaldi n. sp. . . 281
— neocomiensis D'ORB. . 256
— subhercynica n. sp. . . 280
— Zechi n. sp. 280
Partula vicentina OPPENH. . 104
Pecten (Chlamys) elongatus LAM. 468
— (Syncyclonema) orbicularis SOW. 469
— Cottaldinus D'ORB. . . 269
— discites SCHLOTH. sp. . 725
— Robinaldinus DORB. . . 269
Pegmatitische Gesteine bei Finero 412
Pentacrinus angulatus OPPEL 35
— cf. basaltiformis MILL. . 34
— psilonoti QUENST. . . 35
Peridotit 396
Perledo-Varennakalk . . . 702
Perna Mulleti DESH. . . . 267
Pholadomya elongata MÜNST. 279
Phyllobrissus sp. 273
Planorbis muzzolonicus n. sp. 134
— cf. pseudammonius SCHLOTH. var. Leymeriei DESH. 135
— tressinensis OPPENH. . 133
— vicentinus n. sp. . . . 133
Plessur-Gebirge, ein Ausflug in's 548
Pleurotomaria Brongniartiana D'ORB. 488
— cf. espaillaciana D'ORB. 493
— Ewaldi n. sp. 490
— Fittoni A. Röm. . . . 494
— Gibsi SOW. sp. . . . 493
— Guerangeri D'ORB. . . 489
— cf. Hörnesi STUR . . 729
— longimontana n. sp. . . 493
— subhercynica n. sp. . . 252
— tourtiae n. sp. . . . 489
Plicatula inflata SOW. . . 477
Polnisches Mittelgebirge, Facieswechsel im Palaeozoicum des 608
Pomatias crassicosta SANDB. 127
Porphyrite bei Finero . . 416
Posidonomya obsolete-striata TOMM. 727
Pragano zwischen Vestena nuova und Bolca . . . 74
Prothelidomus OPPENH. . . 96
Psammobia carinata n. sp. . 258

Seite.

Pseudoglaciale Erscheinungen in mitteldeutschen Gebirgen 576
Pteroceras bicarinatum Desh. sp. 501
Pterophyllum sp. 283
Ptychytes evolvens E. v. M. 734
Pugnellia streptaxis n. sp. . 129
Pupa (Paracraticula) umbra Oppenh. 104

Quadersandstein-Gebirge, die untere Kreide des subhercynen 227
Quartäre Bildungen des Grignagebirges 711
— — der Val Vigezzo . . 417
Quenstedticeras, Beitrag zur Kenntniss der Gattung . 307

Rauchwacken des Grignagebirges 685
Rhynchonella n. sp. . . . 722
— cf. compressa Lam. sp. 459
— decurtata Gir. sp. . . 722
— Grasiana d'Orb. . . . 459
— lariana n. sp. 723
— Mantelliana Sow. sp. . 457
— — var. difformis . . . 457
— Martini Mant. sp. . . 458
— multiformis (A. Röm.) de Loriol 271
— sigma Schlönb. . . . 458
— subhercynica n. sp. . . 461
— trinodosi Bittn. . . . 723
— — cf. toblachensis . . 723
Rinden, in die Substanz des bunten Mergels übergeführte aus dem Alluvium. 357
Roncà, Tuff, oberster von . 66
Rostellaria cf. Mailleana d'Orb. 501
Rothliegendes des Thüringer Waldes 596
Rothschönberg bei Deutschenbora im Königreich Sachsen, der Glimmersyenit von 534

Saalfeld, Liasfunde bei . . 371
Saurier-Funde, über neue aus dem Muschelkalke von Bayreuth 331

Seite.

Schloenbachia Coupei Brngt. sp. 505
— varians Sow. sp. . . . 504
Scyphia Sacki Gf. . . . 194
Sericitschiefer 393
Serpula lophioda Goldf. . 273
— Phillipsii A. Röm. . . 274
Sesia-Gneiss 390
S. Marcello, gelber Tuff von 65
Solarium bicariratum n. sp. . 496
— ornato-dentatum n. sp. . 495
Spessart, genetische Beziehungen des krystallinen Grundgebirges 581
Spiriferina (Mentzelia) ampla Bittn. 720
— — köveskallyensis (Suess) Boeckh 720
— — — var. spitiensis Stoliczka 720
— — Mentzeli Dunk. sp. . 719
— — — var. brevirostris Bittn. 719
— — — var. illyrica Bittn. 719
— Beneckei n. sp. . . . 718
— Canavarica Tomm. . . 719
— fragilis Schloth. sp. . 717
— Possarti n. sp. . . . 718
Spirigera trigonella Schloth. sp. 721
Splügen, Kalkberge bei . . 20
Spondylus histrix Goldf. . 476
— striatus Sow. sp. . . 475
Spongien aus der Kreide Wesfalens 194
Stenogyra (Opeas) sp. . . 101
— — Orci n. sp. 100
Strona-Gneiss 395
Styx supraelegans de Greg. 130

Tambacher Schichten . . . 606
Taubach, Fund eines Menschenzahnes im Altdiluvium von 616
Tektonik des Grignagebirges 668
Tellina (Areopagia) subhercynica n. sp. 258
— Carteroni d'Orb. . . . 257
? Terebratella Beaumonti d'Arch. sp. 455
? — hercynica Schloenb. . 455
Terebratella oblonga (Sow.) d'Orb. 273
Terebratula sp. 453

Seite.
Terebratula arcuata A. Röm. 453
— biplicata, Artbegriff von 225
— — Sow. 444
— — var. longimontana Tsn. 445
— — var. obtusirostris Tsn. 446
— depressa Lam. 452
— praelonga Sow. . . . 272
— punctata Sow. . . . 34
— Robertoni d'Arch. . . 451
— sella Sow. 272
— cf. sella Sow. 272
— subhercynica n. sp. . . 449
— cf. sulcifera Morris . 450
— tornacensis d'Arch. var. Schloenbachi Tsn. . . . 447
— — — var. crassa d'Arch. 448
— tourtiae n. sp. 449
Terebratulina chrysalis Schloth. sp. 454
Thierfährten aus dem Rothliegenden von Friedrichroda, Tambach u. Kabarz in Thüringen 570
Thracia cf. neocomiensis (d'Orb.) Pict. et Camp. . 280
Thüringerwald, neue Uebersichtskarte des 596
Tiefbohrungen auf Kalisalz im südlichen Nordthüringen 374
Torflager, Aufdeckung eines älteren bei Offleben. . . 220
Tourtia, die subhercyne und ihre Brachiopoden und Mollusken-Fauna . . . 423
Trigonia caudata Ag. . . . 264
— roelligiana n. sp. . . . 282

Seite.
Trochus albensis d'Orb. . 253
— Ewaldi n. sp. 253
— tourtiae n. sp. 499
— undulato-striatus n. sp. . 253
Turbo Chassyanus d'Orb. 496
— impar n. sp. 497
— Leymerii d'Arch. sp. . 499
— Mulleti d'Arch. . . . 498
— pseudocarinatusn. sp. . 498
? — reticularis n. sp. . . 252
— subhercynicus n. sp. . 498
— tricinctus n. sp. . . . 497
Turrilites cenomanensis Schlüt. 510
— costatus Lam. 509
— essenensis Gein. . . . 509
— Jaekeli n. sp. 511
— Scheuchzerianus Bosc. . 508
? Turritella Gersdorfensis n. sp. 254
— striata n. sp. 254

Uncites Palinae n. sp. . . 658

Venus cf. parva Sow. . . 484
— seveccensis n. sp. . . 259
Vesuv, über die Eruption des am 3. Juli 1895 363
Vulkane, über die räumliche Anordnung der mexikanischen 359

Waldheimia (Aulacothyris) angusta Schloth. sp. . . 724
Weichselia Ludowice Stiehler 274. 282
Wengener Schichten des Gringnagebirges 704
Worthenia Tornquisti n. sp. 729

Druck von J. F. Starcke in Berlin.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft

Jahr/Year: 1895

Band/Volume: 47

Autor(en)/Author(s): Redaktion Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft

Artikel/Article: Sachregister. 761-766