

# I. Namenregister.

Von den hinter den Titeln stehenden Buchstaben bedeutet A. Aufsatz,  
B. briefliche Mittheilung und P. Protokoll.

|                                                                               | Seite.   |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ABICH. Salzsee von Urmiah. P. . . . .                                         | 256      |
| BEHM. Tertiärschichten bei Stettin. B. . . . .                                | 270      |
| BEYRICH. Marines Tertiärlager bei Leipzig. P. . . . .                         | 5        |
| — Schnecken im Kalktuff bei Canth. P. . . . .                                 | 253      |
| — Conchylien des norddeutschen Tertiärgebirges. A. . . . .                    | 468. 726 |
| — Ammoniten von Rüdersdorf. P. . . . .                                        | 513      |
| — Graptolithen im schlesischen Gebirge. P. . . . .                            | 650      |
| BORNEMANN. Kreide bei Holungen. B. . . . .                                    | 273      |
| — Foraminiferen im Lias. B. . . . .                                           | 273      |
| — Lettenkohle bei Mühlhausen. P. . . . .                                      | 512      |
| — Semionotus. A. . . . .                                                      | 612      |
| — Ueber Grenzen des Keupers und die Lettenkohle in Thürin-<br>gen. P. . . . . | 652      |
| CARNALL, v. Uebersichtskarte von Oberschlesien. P. . . . .                    | 502      |
| — Zerquetschte Kiesel im Kohlengebirge von Waldenburg. P. . . . .             | 663      |
| CASEDAY. Batoerinus n. G. A. . . . .                                          | 237      |
| CREDNER. Geognostische Karte von Thüringen. P. . . . .                        | 638      |
| DEGENHARDT. Bohrlöcher bei Czuchow. B. . . . .                                | 19       |
| DICKERT. Reliefs. P. . . . .                                                  | 505      |
| EMMRICH. Molasse in Baiern. B. . . . .                                        | 668      |
| — Gervillienschichten bei Lienz. B. . . . .                                   | 670      |
| ERMAN. Gorgonia paradoxa ESCHER. P. . . . .                                   | 510      |
| — Kreide an der spanischen Nordküste. . . . . P. 510. A. 596                  |          |
| — Samländische Tertiärversteinerungen. P. . . . .                             | 620      |
| ESCHER VON DER LINTH. Keuper in den Alpen. B. . . . .                         | 519      |
| EWALD. Tutenkalk. P. . . . .                                                  | 9        |
| — Weisser Jura von Nattheim und La Rochelle. P. . . . .                       | 261      |
| — Relief der Rosstrappe. P. . . . .                                           | 502      |

|                                                                                    | Seite. |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| FRAAS. Squatina acanthoderma. A. . . . .                                           | 782    |
| GEINITZ. Steinfohlenformation in Sachsen. P. . . . .                               | 636    |
| HERTER. Geologie von Cartagena. B. . . . .                                         | 16     |
| HOFMANN. Geognosie von Wotkinsk. B. . . . .                                        | 516    |
| HUYSEN. Soolquellen im Münsterschen. P. . . . .                                    | 502    |
| — Schlagende Wetter aus Wälderschieferthon. P. . . . .                             | 505    |
| JENZSCH. Fundorte herzförmiger Quarzwillinge. A. . . . .                           | 245    |
| KADE. Devonischer Diluvialblock bei Birnbaum an der Warthe. P. . . . .             | 6      |
| — Braunkohlenlager bei Meseritz. B. . . . .                                        | 269    |
| KARSTEN, H. Plänerformation in Meklenburg. . . . . B. 269. A.                      | 527    |
| KLIPSTEIN, v. Karte von Wetzlar und Schalssteinbildungen. P. . . . .               | 656    |
| KOCH. Tertiärablagerungen in Lauenburg. A. . . . .                                 | 92     |
| LÜDERS. Tertiärschichten bei Brambach. P. . . . .                                  | 510    |
| MERIAN. Flora des Keupers und Lias. P. . . . .                                     | 639    |
| — Ueber die St. Cassianformation in Vorarlberg und im nördlichen Tirol. P. . . . . | 642    |
| MEYER. Neues Vorkommen von Stravit in Hamburg. P. . . . .                          | 641    |
| MEYN. Ausbrüche des Hekla. A. . . . .                                              | 291    |
| MÜLLER, H. Alaunerze der Tertiärformation. A. . . . .                              | 707    |
| NAUCK. Quarzwillinge. P. . . . .                                                   | 654    |
| NÖGGERATH. Die k. k. geologische Reichsanstalt in Wien. A. . . . .                 | 21     |
| — Gediegen Blei, natürliche Bleiglätte und Mennige. . P. 636. A.                   | 674    |
| OSCHATZ. Mikroskopische Präparate. P. . . . .                                      | 263    |
| PRESTEL. Krystallinische Struktur des Meteoreisens. P. . . . .                     | 663    |
| RICHTER. Thüringische Tentaculiten. A. . . . .                                     | 275    |
| ROEMER, F. Die Kreide Westphalens. A. . . . .                                      | 99     |
| — Devon in Belgien und in der Eifel. P. . . . .                                    | 648    |
| ROSE, G. Verwitterter Phonolith von Kostenblatt. A. . . . .                        | 300    |
| ROTH. Bohrungen bei Wendisch-Wehningen. A. . . . .                                 | 522    |
| SARTORIUS von WALTERSHAUSEN. Dolomit in den Centralalpen. P. . . . .               | 647    |
| SCHARENBERG. Geognostische Verhältnisse der Südküste von Andalusien. A. . . . .    | 578    |
| SCHAUROTH, v. Zur Paläontologie des deutschen Zechsteins. A. . . . .               | 539    |
| SCHLAGINTWEIT, A. Temperatur des Bodens und der Quellen in den Alpen. P. . . . .   | 11     |
| SCHLAGINTWEIT, H. Eiskrystalle. P. . . . .                                         | 260    |
| SEMENOW, v. Fauna des schlesischen Kohlenkalkes. A. . . . .                        | 317    |
| SONNENSCHNEIN. Goldamalgalam in Californien. A. . . . .                            | 243    |
| SPENGLER. Asphalt im Zechstein zu Kamsdorf. A. . . . .                             | 405    |
| STIEHLER. Kreidepflanzen von Quedlinburg. P. . . . .                               | 659    |
| STROMBECK, v. Untere Kreide in Braunschweig. B. . . . . 264.                       | 520    |
| — Schichtenbau des Hügellandes nördlich vom Harze. P. . . . .                      | 639    |
| — Flammenmergel jüngster Gault. B. . . . .                                         | 672    |
| TAMNAU. Glimmer von Zinnwald. P. . . . .                                           | 4      |
| — Zinkblüthe von Brilon. P. . . . .                                                | 8      |
| — Pseudomorphose nach Kalkspath. P. . . . .                                        | 9      |
| — Mineralien vom Lake superior. P. . . . .                                         | 11     |

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| TAMNAC. Zirkone und ihr Vorkommen. P. . . . .   | Seite. 251 |
| — Vesuvian von Sanford. P. . . . .              | 257        |
| — Uralit aus dem Val de Rif. P. . . . .         | 263        |
| WAPPÆUS. Goldvorkommen in Venezuela. P. . . . . | 665        |
| WESSEL. Jura in Pommern. A. . . . .             | 305        |

## II. Sachregister.

|                                    | Seite.   |                                     | Seite.   |
|------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| Abietinites . . . . .              | 607      | Blaueisenerde (Dziemierz) . . . . . | 15       |
| Ablagerungen, tert., Lauenburg 92  |          | Blätter, fossile . . . . .          | 667. 681 |
| — — Reinbek . . . . .              | 92       | Blei, gediegen, Alston-moor         | 681      |
| Alaunerze (Tertiärformation) 707   |          | — — Anglaize, Nordamer.             | 682      |
| Alaunthon . . . . .                | 92. 96   | — — Cartagena . . . . .             | 685      |
| Allerisma elegans . . . . .        | 556      | — — Coll. du Roi (Paris)            | 680      |
| Alloerisma elegans . . . . .       | 556      | — — Faenza . . . . .                | 689      |
| Alveolites Buchiana . . . . .      | 541      | — — Geroldseck . . . . .            | 682      |
| — Producti . . . . .               | 542      | — — Kenmar . . . . .                | 682      |
| — Grünewaldtii . . . . .           | 542      | — — Madera . . . . .                | 684      |
| Ammonites auritus . . . . .        | 125      | — — Monmouthshire . . . . .         | 687      |
| — Buchii . . . . .                 | 515      | — — Oláhpian . . . . .              | 684      |
| — dux . . . . .                    | 513      | — — Polen . . . . .                 | 689      |
| — interruptus . . . . .            | 128      | — — in Porphyry . . . . .           | 689      |
| — Ottonis . . . . .                | 514      | — — Saska (Banat) . . . . .         | 687      |
| — sp. . . . .                      | 139. 206 | — — Sibirien . . . . .              | 682      |
| Anomia subradiata . . . . .        | 553      | — — v. STEFFENS beschr.             | 681      |
| Aporrhais (Chenopus Phil.) 491     |          | — — Südslavonien . . . . .          | 683      |
| — alata . . . . .                  | 498      | — — Van Stauden, Fluss              |          |
| — speciosa . . . . .               | 492      | — — Südafrika . . . . .             | 682      |
| Arca striata . . . . .             | 567      | — — Zomelahnacan                    | 636. 676 |
| Asphalt im Zechstein (Kams-        |          | Bleiglätte, Austins mine (Vir-      |          |
| dorf) . . . . .                    | 405      | ginien) . . . . .                   | 691      |
| Asterodermus platypterus . . . . . | 783      | — Breinig . . . . .                 | 693      |
|                                    |          | — Iztacciuatl . . . . .             | 692      |
| Bakewellia Sedgwickiana . . . . .  | 550      | — Freiberg . . . . .                | 691      |
| Batocrinus . . . . .               | 237      | — Lerbach . . . . .                 | 693      |
| — icosadactylus . . . . .          | 238      | — Mexico . . . . .                  | 674. 691 |
| — irregularis . . . . .            | 240      | — Popocatepetl . . . . .            | 692      |
| Baumberge, unt. Senon . . . . .    | 196      | — Poulaouen . . . . .               | 691      |
| Beryx ornatus . . . . .            | 531      | Borken, ob. Senon . . . . .         | 224      |

|                                | Seite. |                                | Seite. |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| Borkenberge . . . . .          | 230    | Cerithium Matheroni . . . . .  | 600    |
| Brachiopoden, schl. Kohlenkalk | 317    | Chonetes concentrica . . . . . | 345    |
| Brauneisenstein, Cartagena .   | 16     | — Dalmaniana . . . . .         | 347    |
| Braunkohlenformation, Me-      |        | — hemisphaerica . . . . .      | 347    |
| seritz . . . . .               | 269    | — Koninckiana . . . . .        | 352    |
| Braunkohlenlager, Theresia     |        | — Kutorgana . . . . .          | 351    |
| Grube . . . . .                | 15     | — Laguessiana . . . . .        | 348    |
| Buccinum . . . . .             | 440    | — Mac Coyana . . . . .         | 350    |
| — Bocholtense . . . . .        | 458    | — Ottonis . . . . .            | 349    |
| — Bolli . . . . .              | 448    | — papilionacea . . . . .       | 346    |
| — Brückneri . . . . .          | 450    | — perlata . . . . .            | 348    |
| — bullatum . . . . .           | 446    | — tricornis . . . . .          | 349    |
| — convexum . . . . .           | 454    | — variolata . . . . .          | 349    |
| — desertum . . . . .           | 442    | Choniopora . . . . .           | 546    |
| — excavatum . . . . .          | 444    | — radiata . . . . .            | 546    |
| — Holsaticum . . . . .         | 459    | Coccoloba uvifera . . . . .    | 662    |
| — labiosum . . . . .           | 462    | Coesfeld . . . . .             | 224    |
| — Meyni . . . . .              | 463    | Columbella . . . . .           | 428    |
| — pygmaeum . . . . .           | 451    | — attenuata . . . . .          | 430    |
| — Schlottheimi . . . . .       | 456    | — nassoides . . . . .          | 432    |
| — Syltense . . . . .           | 461    | — scripta . . . . .            | 429    |
| — tenuistriatum . . . . .      | 455    | — subulata . . . . .           | 431    |
| Buntkupfererz . . . . .        | 17     | Congerienschichten . . . . .   | 669    |
|                                |        | Credneria . . . . .            | 660    |
| Cappenberg, ob. Senon . . .    | 233    | Cyrenenschichten . . . . .     | 669    |
| Caprina adversa . . . . .      | 600    |                                |        |
| Cardiomorpha pleurophori-      |        | Dachsteinkalk . . . . .        | 643    |
| formis . . . . .               | 554    | Dendriten, künstliche . . . .  | 510    |
| St. Cassian-Schichten . . . .  | 519    | Diadema Tejana . . . . .       | 601    |
| — — in Vorarlberg . . . . .    | 642    | Diluvialbildungen, Münster .   | 113    |
| — — obere . . . . .            | 646    | Diluvialblock (Birnbäum) . .   | 6      |
| — — untere . . . . .           | 646    | Dufrenoy'sit . . . . .         | 647    |
| Cassidaria . . . . .           | 482    | Dülmen, ob. Senon . . . . .    | 227    |
| — Buchii . . . . .             | 484    |                                |        |
| — depressa . . . . .           | 482    | Echinodermen, Nattheim . .     | 261    |
| — echinophora . . . . .        | 486    | Eiskrystalle . . . . .         | 260    |
| Cassis . . . . .               | 466    |                                |        |
| — affinis . . . . .            | 471    | Flammenmergel, Dörenschlucht,  |        |
| — bicoronata . . . . .         | 478    | Turon-Gruppe . . . . .         | 156    |
| — Germari . . . . .            | 468    | — Neu-Wallmoden . . . . .      | 672    |
| — megapolitana . . . . .       | 476    | Foraminiferen, Lias, Göttingen | 274    |
| — Quenstedti . . . . .         | 470    |                                |        |
| — Rondeletii . . . . .         | 473    | Galerites albogalerus . . . .  | 210    |
| — saburon . . . . .            | 480    | Gault, Westphalen . . . . .    | 123    |
| Ceratophyten . . . . .         | 510    | — Rothenberg . . . . .         | 129    |
| Cerithienschichten (Peissen-   |        | Gervillienschichten, Bündheim  | 649    |
| berg) . . . . .                | 669    | Gildehäuser Berg, Neoc. . .    | 120    |

|                                                               | Seite.        |                                        | Seite. |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------|
| Goldamalgam, Mariposa . . . . .                               | 9. 643        | Loxonema Roessleri . . . . .           | 558    |
| Gold, Venezuela . . . . .                                     | 665           | Lycopodites hexanlos . . . . .         | 607    |
| Grünsand, Essen (Turon-Gruppe) . . . . .                      | 130           | Macropoma Mantellii . . . . .          | 531    |
| Graptolithen, Herzogswalde . . . . .                          | 259           | Mark, die hohe, ob. Senon . . . . .    | 221    |
|                                                               | 261. 505. 650 | Mennige . . . . .                      | 693    |
| Haard, ob. Senon . . . . .                                    | 215           | — Anglesea, Nordamerika . . . . .      | 696    |
| Haldem, ob. Senon . . . . .                                   | 202           | — Austin mine . . . . .                | 696    |
| Hekla, Ausbrüche . . . . .                                    | 291           | — Bleialf . . . . .                    | 698    |
| Hemiasier Tejanus . . . . .                                   | 600           | — Bolaños . . . . .                    | 693    |
| Hemitrochiscus paradoxus . . . . .                            | 558           | — Brilon . . . . .                     | 699    |
| Hilsconglomerat, Nordharz . . . . .                           | 264. 520      | — Call . . . . .                       | 699    |
| Hilsthon, unterer . . . . .                                   | 265           | — Eschbach . . . . .                   | 695    |
| — mittlerer . . . . .                                         | 266           | — Grassington More . . . . .           | 697    |
| — oberer . . . . .                                            | 266           | — Hausbaden . . . . .                  | 694    |
| Insekten, fossile . . . . .                                   | 667           | — Langenloch . . . . .                 | 696    |
| Jura, Pommern . . . . .                                       | 305           | — Niederösterreich . . . . .           | 696    |
| Kalk von Paffrath . . . . .                                   | 699           | — Schlangenbergr . . . . .             | 697    |
| Karbonate, silberhaltige . . . . .                            | 17            | — Weilmünster . . . . .                | 695    |
| Karte, geognostische, von Thüringen . . . . .                 | 658           | — Zimapan . . . . .                    | 697    |
| — der Erzlager im oberschle-<br>sischen Muschelkalk . . . . . | 666           | Meteoreisen, kryst. Struktur . . . . . | 663    |
| Keuper, Thüringen . . . . .                                   | 652           | Mitra . . . . .                        | 408    |
| — Leinethal . . . . .                                         | 663           | — biplicata . . . . .                  | 427    |
| Kössener Schichten . . . . .                                  | 643           | — Borsoni . . . . .                    | 421    |
| Kreideformation, Nordküste<br>von Spanien . . . . .           | 596           | — circumcisa . . . . .                 | 417    |
| Kreide, obere, Westphalen . . . . .                           | 130           | — circumfossa . . . . .                | 413    |
| Kupfer und Silber, Lake su-<br>perior . . . . .               | 11            | — Ebenus . . . . .                     | 426    |
| Kupfererz, braunes . . . . .                                  | 677           | — graniformis . . . . .                | 416    |
| — Pyskorsk . . . . .                                          | 517           | — hastata . . . . .                    | 420    |
| Leiotoma . . . . .                                            | 779           | — inornata . . . . .                   | 413    |
| — bulbiformis . . . . .                                       | 771           | — laevigata . . . . .                  | 412    |
| — bulbus . . . . .                                            | 771           | — lutescens . . . . .                  | 426    |
| — laevigata . . . . .                                         | 771           | — Michelottii . . . . .                | 432    |
| — ovata . . . . .                                             | 772           | — Michaudi . . . . .                   | 427    |
| — pyrus . . . . .                                             | 771           | — Philippii . . . . .                  | 422    |
| — subcarinata . . . . .                                       | 771           | — plicatula . . . . .                  | 426    |
| Lemförde . . . . .                                            | 202           | — pumila . . . . .                     | 416    |
| Lettenkohle, Mühlhausen . . . . .                             | 512           | — pyramidella . . . . .                | 428    |
| — Thüringen . . . . .                                         | 652           | — rugosa . . . . .                     | 426    |
| Lima Permiana var. subradiata . . . . .                       | 549           | — scrobiculata . . . . .               | 427    |
|                                                               |               | — semimarginata . . . . .              | 418    |
|                                                               |               | — semisculpta . . . . .                | 419    |
|                                                               |               | — tenuis . . . . .                     | 416    |
|                                                               |               | Murex aquitanicus . . . . .            | 738    |
|                                                               |               | — asper . . . . .                      | 745    |
|                                                               |               | — brevicauda . . . . .                 | 748    |
|                                                               |               | — capito . . . . .                     | 749    |

|                                              | Seite. |                                                            | Seite.   |
|----------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|----------|
| <i>Murex crispus</i> . . . . .               | 760    | <i>Patella Hollebeni</i> . . . . .                         | 557      |
| — <i>Dannebergi</i> . . . . .                | 749    | <i>Pecten crassitesta</i> . . . . .                        | 600      |
| — <i>defossus</i> . . . . .                  | 759    | — <i>cretosus</i> . . . . .                                | 599      |
| — <i>Deshayesii</i> . . . . .                | 753    | — <i>longicollis</i> . . . . .                             | 138      |
| — <i>inornatus</i> . . . . .                 | 757    | — <i>Mackrothi</i> . . . . .                               | 549      |
| — <i>Kochi</i> . . . . .                     | 759    | — <i>membranaceus</i> . . . . .                            | 533      |
| — <i>oetonarius</i> . . . . .                | 754    | <i>Pentacrinus</i> n. sp. . . . .                          | 209      |
| — <i>Partschii</i> . . . . .                 | 758    | <i>Phonolith</i> von Kostenblatt . . . . .                 | 300      |
| — <i>Pauwelsii</i> . . . . .                 | 755    | <i>Phytolitharien</i> bei Wendisch-<br>Wehningen . . . . . | 525      |
| — <i>pereger</i> . . . . .                   | 759    | <i>Pläner</i> (Meklenburg) . . . . .                       | 527      |
| — <i>plicatocarinatus</i> . . . . .          | 747    | — <i>Westphalen</i> (Turon ob.<br>Abth.) . . . . .         | 159      |
| — <i>spiniocosta</i> . . . . .               | 756    | <i>Pleurotomaria nodulosa</i> . . . . .                    | 567      |
| — <i>spinulosus</i> . . . . .                | 750    | <i>Polygastrica</i> bei Wendisch-<br>Wehningen . . . . .   | 525      |
| — <i>Swainsoni</i> . . . . .                 | 748    | <i>Productus aculeatus</i> . . . . .                       | 359      |
| — <i>tricarinatus</i> . . . . .              | 748    | — <i>caperatus</i> . . . . .                               | 392      |
| — <i>tristriatus</i> . . . . .               | 746    | — <i>cora</i> . . . . .                                    | 354      |
| — <i>tubifer</i> . . . . .                   | 763    | — <i>expansus</i> . . . . .                                | 355      |
| <i>Myacitenthon</i> . . . . .                | 654    | — <i>fimbriatus</i> . . . . .                              | 359      |
| <i>Myophoria Schlottheimi</i> . . . . .      | 567    | — <i>Flemingii</i> . . . . .                               | 356      |
| <i>Necocom</i> , Westphalen . . . . .        | 116    | — <i>fragarius</i> . . . . .                               | 392      |
| <i>Nickelerz</i> (Mansfeld) . . . . .        | 620    | — <i>giganteus</i> . . . . .                               | 353      |
| <i>Nucula Beyrichii</i> . . . . .            | 551    | — <i>granulosus</i> . . . . .                              | 359      |
| <i>Orbicula concentrica</i> . . . . .        | 360    | — <i>Humboldtii</i> . . . . .                              | 358      |
| — <i>excentrica</i> . . . . .                | 361    | — <i>Keyserlingkianus</i> . . . . .                        | 392      |
| — <i>nitida</i> . . . . .                    | 361    | — <i>latissimus</i> . . . . .                              | 352      |
| — <i>quadrata</i> . . . . .                  | 361    | — <i>margaritaceus</i> . . . . .                           | 354      |
| — <i>Ryckholtiana</i> . . . . .              | 361    | — <i>mesolobus</i> . . . . .                               | 360      |
| <i>Orbiculiten</i> , Santander . . . . .     | 599    | — <i>Murchisonianus</i> . . . . .                          | 392      |
| <i>Orbiculites apertus</i> . . . . .         | 603    | — <i>Nystianus</i> . . . . .                               | 357      |
| <i>Orthis interlineata</i> . . . . .         | 341    | — <i>plicatilis</i> . . . . .                              | 355      |
| — <i>Keyserlingkiana</i> . . . . .           | 341    | — <i>punctatus</i> . . . . .                               | 358      |
| — <i>Lyelliana</i> . . . . .                 | 341    | — <i>pustulosus</i> . . . . .                              | 358. 392 |
| — <i>Michelini</i> . . . . .                 | 342    | — <i>scabriculus</i> . . . . .                             | 357      |
| — <i>resupinata</i> . . . . .                | 340    | — <i>semireticulatus</i> . . . . .                         | 356      |
| — <i>striatula</i> . . . . .                 | 340    | — <i>striatus</i> . . . . .                                | 354      |
| <i>Orthisina</i> . . . . .                   | 342    | — <i>subaculeatus</i> . . . . .                            | 392      |
| — <i>arachnoidea</i> . . . . .               | 343    | — <i>tesselatus</i> . . . . .                              | 357      |
| — <i>crenistrina</i> . . . . .               | 342    | <i>Purpura nodulosa</i> . . . . .                          | 466      |
| — <i>Portlockiana</i> . . . . .              | 343    | — <i>pusilla</i> . . . . .                                 | 465      |
| — <i>quadrata</i> . . . . .                  | 344    | <i>Pyrula canaliculata</i> var. . . . .                    | 778      |
| <i>Ostrea vesicularis</i> . . . . .          | 599    | — <i>concinna</i> . . . . .                                | 775      |
| <i>Palaeocrangon problematicus</i> . . . . . | 560    | — <i>condita</i> . . . . .                                 | 780      |
| <i>Palaeotheutis Daunensis</i> . . . . .     | 650    | — <i>clathrata</i> . . . . .                               | 781      |
| <i>Panopaea lunulata</i> . . . . .           | 557    | — <i>elegans</i> . . . . .                                 | 776      |

|                                          | Seite. |
|------------------------------------------|--------|
| <i>Pyrula nexilis</i> . . . . .          | 773    |
| — <i>plicatula</i> . . . . .             | 774    |
| — <i>reticulata</i> . . . . .            | 777    |
| — <i>simplex</i> . . . . .               | 777    |
| — <i>singularis</i> . . . . .            | 777    |
| — <i>subcanaliculata</i> . . . . .       | 779    |
| — <i>tricarinata</i> . . . . .           | 774    |
| <i>Quarzzwillinge</i> . . . . .          | 654    |
| — <i>von Munzig</i> . . . . .            | 245    |
| <i>Quecksilber von Sülbeck</i> . . . . . | 503    |
| <i>Rhynchonella acuminata</i> . . . . .  | 338    |
| — <i>pugnus</i> . . . . .                | 338    |
| — <i>pleurodon</i> . . . . .             | 339    |
| — <i>subdentata</i> . . . . .            | 338    |
| <i>Rostellaria plana</i> . . . . .       | 489    |
| <i>Semionotus Bergeri</i> . . . . .      | 612    |
| <i>Senon, Westphalen</i> . . . . .       | 174    |
| <i>Serpula amphisbaena</i> . . . . .     | 211    |
| — <i>Schubarthi</i> . . . . .            | 339    |
| <i>Skleroklas</i> . . . . .              | 647    |
| <i>Solenomya Phillipsiana</i> . . . . .  | 555    |
| <i>Spirifer bisulcatus</i> . . . . .     | 334    |
| — <i>Beyrichianus</i> . . . . .          | 331    |
| — <i>costato-concentricus</i> . . . . .  | 330    |
| — <i>crispus</i> . . . . .               | 330    |
| — <i>duplicicosta</i> . . . . .          | 335    |
| — <i>glaber</i> . . . . .                | 335    |
| — <i>insculptus</i> . . . . .            | 330    |
| — <i>lineatus</i> . . . . .              | 336    |
| — <i>mesogonius</i> . . . . .            | 331    |
| — <i>rotundatus</i> . . . . .            | 332    |
| — <i>rugulatus</i> . . . . .             | 332    |
| — <i>semicircularis</i> . . . . .        | 333    |
| — <i>striatus</i> . . . . .              | 334    |
| — <i>triangularis</i> . . . . .          | 329    |
| — <i>trigonalis</i> . . . . .            | 332    |
| — <i>trisulcosus</i> . . . . .           | 331    |
| <i>Spirigera planosulcata</i> . . . . .  | 337    |
| — <i>squamigera</i> . . . . .            | 337    |
| <i>Spirilla rusticula</i> . . . . .      | 769    |
| <i>Squatina acanthoderma</i> . . . . .   | 782    |
| <i>Stenopora Mackrothi</i> . . . . .     | 543    |
| — <i>polymorpha</i> . . . . .            | 541    |
| — <i>spinigera</i> . . . . .             | 543    |

|                                             | Seite.   |
|---------------------------------------------|----------|
| <i>Strophomena analoga</i> . . . . .        | 344      |
| <i>Struvit</i> . . . . .                    | 641      |
| <i>Stylina striata</i> . . . . .            | 601      |
| <i>Tentaculites acuarius</i> . . . . .      | 285      |
| — <i>cancellatus</i> . . . . .              | 285      |
| — <i>Geinitzianns</i> . . . . .             | 286      |
| — <i>infundibulum</i> . . . . .             | 286      |
| — <i>pupa</i> . . . . .                     | 285      |
| — <i>striatus</i> . . . . .                 | 288      |
| — <i>subconicus</i> . . . . .               | 287      |
| — <i>rugulosus</i> . . . . .                | 288      |
| — <i>tuba</i> . . . . .                     | 288      |
| — <i>typus</i> . . . . .                    | 288      |
| <i>Terebra acuminata</i> . . . . .          | 439      |
| — <i>Basterotii</i> . . . . .               | 441      |
| — <i>cincta</i> . . . . .                   | 436      |
| — <i>cinerea</i> . . . . .                  | 435      |
| — <i>flexuosa</i> . . . . .                 | 435      |
| — <i>Forchhammeri</i> . . . . .             | 441      |
| — <i>foveolata</i> . . . . .                | 440      |
| — <i>Hörnesi</i> . . . . .                  | 437      |
| — <i>inversa</i> . . . . .                  | 433      |
| — <i>Karsteni</i> . . . . .                 | 434      |
| — <i>major</i> . . . . .                    | 431      |
| — <i>plicatula</i> . . . . .                | 433, 434 |
| — <i>pusilla</i> . . . . .                  | 451      |
| — <i>striata</i> . . . . .                  | 435      |
| — <i>striatula</i> . . . . .                | 435      |
| <i>Terebratula Becksii</i> . . . . .        | 211      |
| — <i>Mantelliana</i> . . . . .              | 210      |
| — <i>elongata</i> . . . . .                 | 327      |
| — <i>hastaeformis</i> . . . . .             | 328      |
| — <i>pectoralis</i> . . . . .               | 137      |
| — <i>sulcisinuata</i> . . . . .             | 329      |
| <i>Tertiärbildungen, Brambach</i> . . . . . | 510      |
| — <i>Crefeld</i> . . . . .                  | 15       |
| — <i>Leipzig</i> . . . . .                  | 5        |
| — <i>Salzgitter</i> . . . . .               | 9        |
| — <i>Santander</i> . . . . .                | 580      |
| — <i>Sylt</i> . . . . .                     | 14, 15   |
| — <i>Tarnowitz</i> . . . . .                | 15       |
| — <i>Westphalen</i> . . . . .               | 109      |
| <i>Textularia acicularis</i> . . . . .      | 610      |
| <i>Thaumas Münsteri</i> . . . . .           | 782      |
| <i>Thecidium productiforme</i> . . . . .    | 547      |
| <i>Tiphys cuniculosus</i> . . . . .         | 767      |

|                           | Seite.   |                              | Seite.   |
|---------------------------|----------|------------------------------|----------|
| Tiphys fistulosus . . .   | 764. 766 | Turrilites polyplocus . . .  | 206      |
| — horridus . . . . .      | 763      | Turritella costata . . . .   | 599      |
| — pungens . . . . .       | 761. 765 |                              |          |
| — Schlotheimi . . . . .   | 765      | Uralit vom Val de Rif . . .  | 263      |
| Tritonium apenninicum . . | 738      |                              |          |
| — argutum . . . . .       | 732      | Vesuvian . . . . .           | 257      |
| — enode . . . . .         | 735      |                              |          |
| — flandricum . . . . .    | 729      | Wälderthon . . . . .         | 103. 434 |
| — Philippii . . . . .     | 733      |                              |          |
| — semilaeve . . . . .     | 734      | Zamites Bergeri . . . . .    | 654      |
| — solitarium . . . . .    | 728      | Zeuglodon, Zahn, Eibergen .  | 110      |
| — tarbellianum . . . . .  | 736      | Zinkblüthe, Brilon . . . . . | 8        |
| Turon, Westphalen . . . . | 130      | Zirkon . . . . .             | 250      |

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1853-1854

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft

Artikel/Article: [Namenregister. 801-811](#)