Färbung: Schwarz. Gelb sind: Scapus, Pedicellus, Wangen, Clypeus, Mundwerkzeuge außer den Mandibelspitzen, Tegulae, alle Beine und die Unterseite des Abdomens. Hinterschienenspitzen, Hintertarsen und Pulvillen aller Beine geschwärzt. Rötlichbraun sind: ein Fleck und zwei Streifen auf dem Mesonotum, Oberseite des Prothorax und ein verschwommener Fleck unter den Sternauli. Die Ränder der Abdominaltergite stellenweise aufgehellt. Flügel schwach getrübt bis fast hyalin. Flügelnervatur braun.

Absolute Körperlänge: 3,8 mm.

Relative Größenverhältnisse: Körperlänge = 115. Kopf. Breite = 26, Länge = 13, Höhe = 21, Augenlänge = 7, Augenhöhe = 13, Schläfenlänge = 6, Gesichtshöhe = 11, Gesichtsbreite = 14, Palpenlänge = 20, Fühlerlänge = 160. Thorax. Breite = 25, Länge = 42, Höhe = 30, Hinterschenkellänge = 22, Hinterschenkelbreite = 8. Flügel. Länge = 120, Breite = 55, Stigmalänge = 30, Stigmabreite = 6, r1 = 3, r2 = 20, r3 = 38, cuqu1 = 11, cuqu2 = 6, cu1 = 14, cu2 = 28, cu3 = 29, n.rec. = 10, d = 15. Abdomen. Länge = 60, Breite = 27; 1. Tergit Länge = 15, vordere Breite = 8, hintere Breite = 15; Bohrerlänge = 15.

♂. - Vom ♀ nicht verschieden. Fühler bei den vorliegenden Stücken 40-42gliedrig.

Untersuchtes Material: Mt. Meru, 1800 m, Tanganyika, June - July 1962, Gerd Heinrich, 1 ♀. 2 ♂♂.

Holotypus: Das ♀ in der Sammlung Townes im Museum of Zoology in Ann Arbor, Mich., USA.

Anmerkung: Die Art ist in die Sektion B des Subgenus *Opius* s. str. zu stellen und kommt dem *Opius circumscriptus* SZÉPL. am nächsten. Sie unterscheidet sich von dem letzteren durch folgende Merkmale: Hinterschenkel nur dreimal so lang wie breit und gleichmäßig geformt, Gesicht besonders an den Seiten fein chagriniert, Mandibeln an der Basis nicht erweitert, Thorax um zwei Fünftel länger als hoch, Prothorax dunkel, Bohrer nur so lang wie das erste Tergit vorstehend.

.....

Berichtigung zu Kaltenbach:

Zur Systematik und Verbreitung der Raubheuschrecken (Tettigoniidae-Saginae), insbesondere der europäischen Arten der Gattung *Saga* CHARPENTIER, diese Zeitschrift, 16. Jhg., S. 71:

Bedauerlicherweise wurde im zweiten Absatz ein Satz ausgelassen. Der betreffende Abschnitt muß richtig heißen:

Im gegenwärtigen Erdbild zeichnen sich drei, im großen und ganzen geschlossene Siedlungsräume ab (Abb. 1):

- (1) Das südliche Afrika von Kenya und Tanganyka bis zum Kap der guten Hoffnung mit den Gattungen *Clonia*, *Hemiclonia* und *Peringueyella*.
- (2) Der ostmediterran-pontische Raum mit der Gattung *Saga*.
- (3) Südostaustralien mit den Gattungen *Hemisaga*, *Miosaga* und *Terpandrus*.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen](#)

Jahr/Year: 1965

Band/Volume: [17](#)

Autor(en)/Author(s): Kaltenbach Alfred Peter

Artikel/Article: [Berichtigung zu " Zur Systematik und Verbreitung der Raubheuschrecken \(Tettigoniidae – Saginae\), insbesondere der europäischen Arten der Gattung Saga Charpentier". 4](#)