

Staphylinidae und Pselaphidae aus Sardinien

Von Volker PUTHZ, Berlin

Während einer Sardinienreise hat Herr MALICKY (Wien) vom 10.-15.IV.1963 in der Nähe von Alghero (NW-Küstengebiet) an verschiedenen Biotopen Fanggläser aufgestellt, die teilweise mit Äthylenglykol, teilweise mit Formol beschickt waren. Während dieser kurzen Zeit konnten folgende Arten erbeutet werden:

1) *Fertilia* (ca. 6 km westlich von Alghero): Straßengraben, festgetretener, feuchter Boden (1 Glas):

Stenus melanopus Mrsh. (1 Ex.), eine südpaläarktische Art, die besonders an den Küsten oder küstennahen, niedriggelegenen Gebieten des Mittelmeergebietes weit verbreitet ist. Manche Autoren halten die Art für halophil; sie lebt aber auch an Nicht-Salzstellen (vgl. HORION, Faunistik IX, p. 340).

Platystethus rufospinus Hochh. (8 Exx., det. G. BENICK), im mediterranen Bereich verbreitet und von Sardinien mehrfach gemeldet.

Atheta gregaria Er. (2 Exx., det. G. BENICK), in ganz Europa und Nordafrika weit verbreitet.

Atheta cyanea Muls. Rey (3 Exx., det. G. BENICK) (vgl. BENICK in Ent. Bl. 50, 1954, p. 163 f.), bisher bekannt aus Korsika, Sardinien, Elba, Giglio, Mittelitalien und Griechenland.

Brachygluta tibialis Aubé (7 Exx.), mediterran verbreitet.

2) Garrigue westl. *Fertilia*: Felsstrand, *Chamaerops-humilis*-Gestrüpp (2 Gläser): *Proteinus atomarius* Er. (1 Ex.), in ganz Europa und im Mittelmeergebiet. Bei HORION 1963 noch nicht von Sardinien erwähnt.

Oxytelus speculifrons Kr. (4 Exx.), im Mittelmeergebiet weit verbreitet.

Atheta amicula Steph. (2 Exx., det. G. BENICK) (vgl. BRUNDIN in Ent. Tidskr. 69, 1948, p. 34), in ganz Europa verbreitet.

3) *Fertilia*: Eukalyptusaufforstung (3 Gläser):

Oxytelus inustus Grav. (1 Ex.), häufige südpaläarktische Art.

Paederus meridionalis Fauv. (1 Ex.), im westlichen und mittleren Mittelmeerraum.

Atheta longiuscula Grav. (4 Exx., det. G. BENICK), in Mittel- und Südeuropa sowie Nordafrika weit verbreitet.

Atheta orbata Er. (1 Ex., det. G. BENICK) (vgl. BRUNDIN in Ent. Tidskr. 73, 1952), in ganz Europa und Nordafrika.

Brachygluta tibialis Aubé (3 Exx.) s.o.

Reichenbachia antennata Aubé (1 Ex.), verbreitet im südlichen Mitteleuropa und im Mittelmeergebiet.

4) *Fertilia*: Salzsumpf hinter der Düne (2 Gläser):

Leptolinus nothus Er. (1 Ex.) (vgl. COIFFAIT in Rev. d'Ent. Franc. 23, 1956, p. 52), in ganz Frankreich (außer dem Norden) und im ganzen Mittelmeerraum.

Zeitschr. der Arbeitsgemeinschaft österr. Entomologen, 17. Jhg. Nr. 1, 2 1965

5) *Fertilia*: auf der Düne (4 Gläser):

Oxytelus speculifrons Kr. (1 Ex.) s.o.

Conosoma pedicularium var. *lividus* Er. (1 Ex.), diese helle Form im westlichen Mittelmeerraum.

Phytosus balticus Kr. (3 Exx.) (nach Danmarks Fauna, Rovbiller 17, p. 70 f.), halobionter Küstenbewohner, im westlichen Mittelmeergebiet. Früher mit *spinifer* Curt. konfundiert.

Myrmecopora uvida Er. (1 Ex.), halobionter Litoralbewohner in West- und Südeuropa.

6) *Fertilia*, sonstige Fänge (keine Fanggläser):

Oxytelus inustus Grav. (12 Exx.) s.o.

Astenus curtulus Er. (1 Ex.) (vgl. COIFFAIT in Bull. Soc. Hist. Nat. Toul. 95, 1960, p. 57 und 79), aus Korsika und Sardinien bekannt. Die aus Italien gemeldeten Tiere bedürfen der Revision.

Astenus bimaculatus Er. (1 Ex.) (vgl. COIFFAIT (l.c.) p. 67 und 96), im westlichen Mittelmeerraum, Marokko und Algerien.

Scimbalium testaceum Er. (2 Exx.), im ganzen Mittelmeerraum.

Achenium basale Er. (1 Ex.), bekannt aus Sardinien, Korsika und den Seealpen.

Eine weitere neue Art des

Genus *Raphidia* L., *R. vartianorum* nov. spec., aus Kleinasien.

(Ins., Neuroptera, Raphidioidea)

Von Horst und Ulrike ASPÖCK

Die folgend beschriebene neue Art wurde von Herrn Dr. Josef KLIMESCH (Linz) entdeckt. Für die großzügige Überlassung des Materiales sei ihm auch an dieser Stelle ausdrücklich gedankt.

Raphidia vartianorum n.sp. *)

Vorliegendes Material:

1 ♂, Holotypus: Türkei, Denizli, Kazi Beli, Honaz Zag, 1200 m, 9.6.1964, leg. J. Klimesch (in coll. ASPÖCK)

1 ♀, Allotypus: Türkei, Denizli, Kazi Beli, Honaz Zag, 1200 m, 9.6.1964, leg. J. Klimesch (in coll. ASPÖCK)

*) Die Art ist dem Ehepaar A. u. E. VARTIAN (Wien) herzlich gewidmet. Herr und Frau VARTIAN haben im Verlaufe ihrer ausgedehnten Expeditionen in verschiedene Teile Asiens außerordentlich umfangreiches, wertvolles Neuropteren-Material aufgesammelt, das zur Zeit bearbeitet wird und die bislang nur bruchstückhaften Kenntnisse über die Neuropteren dieser Gebiete ganz erheblich vergrößern wird.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen](#)

Jahr/Year: 1965

Band/Volume: [17](#)

Autor(en)/Author(s): Puthz Volker

Artikel/Article: [Staphylinidae und Pselaphidae aus Sardinien. 63-64](#)