©Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen, Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österr. Entomologen, 33. Jg., 1/2, 1981

ZUR VERBREITUNG EINIGER PYTHIDEN-ARTEN IN OBERÖSTERREICH (COLEOPTERA, PYTHIDAE)

Von Heinz MITTER, Steyr

Einleitung

Die Pythiden sind vor allem unter der losen Rinde von verschiedenen Laubbäumen, besonders Buchen, zu finden. Ihre Lebensweise ist durchwegs karnivor. Wegen ihrer geringen Größe werden sie aber leicht übersehen, so daß wir selbst in verhältnismäßig großen Bundesländern wie Oberösterreich nur über dürftiges Datenmaterial und wenige Fundortangaben verfügen.

Der folgende Beitrag gibt eine Übersicht über das Vorkommen von vier Arten aus der Familie Pythidae, wobei neben eigenen Funden vor allem die Bestände des O.Ö. Landesmuseums in Linz durchgesehen und verwertet wurden. Weitere Fundortangaben verdanke ich Herrn Franz Böhme, Linz, und dem Werk von H. FRANZ „Die Nordostalpen im Spiegel ihrer Landtierwelt". Verbreitungskarten sollen helfen, das Bild des Vorkommens zu verdeutlichen.

Fam. Pythidae

Rabocerus gabrieli (GERHARDT, 1901)

11.2.1974 Auwald am Steyr-Fluß in Letten, ca. 10 km W der Stadt Steyr; 1 Ex. (leg. Mitter).

Im O.Ö. Landesmuseum findet sich kein Exemplar von dieser Art! FRANZ gibt als einzigen Fundort Enns an (t. Borchert, HORION), im „Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas" von HORION wird die Art für Oberösterreich angegeben, aber ebenfalls ohne Funddatum.

Vincenzellus ruficollis (PANZER, 1804) (= *viridipennis* LATREILLE)

19.5.1974 Innerbreitenau b. Molln; 1 Ex. unter der verpilzten Rinde von Buchenscheitern (leg. Mitter).
15.6.1974 Saaß b. Steyr; 1 Ex. (leg. Mitter).

Bei FRANZ findet sich keine Meldung für Oberösterreich; im Landesmuseum in Linz sind jedoch folgende Belegstücke: 1898 Umgeb. Linz, 9 Ex. (Munganast, det. M. Priesner); 31.5.1905 und 14.4.1907 Damberg b. Steyr, 28.7.1907 Gr. Dirn, 18.4.1909 Reichraming (alle leg. Petz, det. M. Priesner).

©Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen, Wien, download unter www.biologiezentrum.at



Rabocerus gabrieli (GERHARDT) Funde bis 1950 ○ 1951-80 ●
Vincenzellus ruficollis (PANZER) Funde bis 1950 □ 1951-80 ■

Rhinosimus planirostris (FABRICIUS, 1787)

30.4.1978 Damberg b. Steyr, 700 m; 1 Ex. (leg. Mitter).

FRANZ bringt keine Meldung aus Oberösterreich. Belegstücke aus dem O.Ö. Landesmuseum: 18.7.1926 Linz, Hornbachgraben (Kloiber); Zell b. Zellhof (Moser); Mai 1895 Lichtenberg b. Linz, 6 Ex. (Munganast); Juni 1904 Lichtenberg (M. Priesner); 9.9.1913 Sarleinsbach (Kloiber); Umgeb. Linz, 3 Ex. (Kloiber, H. Priesner); Umgeb. Steyr, 5 Ex. (Petz, Troyer); 2.6.1901 Damberg, 20.3.1910 Aschach a.d.St., 14.6.1908 Leonstein, 28.7.1907 Gr. Dirn, 5 Ex., 8.9.1909 Schieferstein, 1.6.1905 Reichraming, 11.6.1905 Feichtau b. Molln (alle leg. Petz); 2.5.1920 Ramsau b. Molln (Schauberger); 1894 u. 1895 Niederranna (Rupertsberger, coll. Moser).

Ergänzt wird das Datenmaterial noch durch die Meldungen von F. Böhme: 27.1.1948 Ebelsberg, Traun-Au b. Gottschalling, Moos/Rinden-Gesiebe (leg. Hamann); 23.9.1948 Linz, Gerlgraben, xerothermer Schlag (leg. Hamann).

Rhinosimus ruficollis (LINNÉ, 1761)

25.8.1974 und 23.11.1970 Damberg b. Steyr, 700 m; 1 bzw. 2 Ex. unter Buchenrinde (leg. Mitter).
16.11.1974 Damberg b. Steyr; 2 Ex. (leg. Deschka).
19.5.1979 Effertsbach b. Klaus, 600 m; 1 Ex. (leg. Mitter).

©Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen, Wien, download unter www.biologiezentrum.at



Rhinosimus planirostris (FABRICIUS) Funde bis 1950 ○ 1951-80 ●
Rhinosimus ruficollis (LINNÉ) Funde bis 1950 □ 1951-80 ■

FRANZ fing die Art am 8.7.1943 beim Aufstieg von Großraming durch den Lumplgraben zur Gschwendtalm a. Gamsstein. Im O.Ö. Landesmuseum finden sich folgende Exemplare: 27.7.1913 Linz, Hornbachgraben (M. Priesner); 24.9.1912 Lichtenberg b. Linz (Kloiber); 4.9.1913 Sarleinsbach (Kloiber); 1900 Steyregg (Munganast); Zell b. Zellhof (Moser); 26.3.1921 Arbing, Naarn-Au (Gschwendtner); 29.3.1908 Leonstein (Petz); Rindbach b. Ebensee (Schauberger).

Zusammenfassung

Die Verbreitung von vier Käferarten aus der Familie Pythidae wird für Oberösterreich umfassend dargestellt. Eine Art (*Rabocerus gabrieli* GERHARDT) wird erstmals mit genauem Funddatum und -ort für Oberösterreich nachgewiesen.

LITERATUR

FRANZ, H. (1974): Die Nordostalpen im Spiegel ihrer Landtierwelt, Bd. IV, Coleoptera. – Innsbruck.

HORION, A. (1951): Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas, Bd. II. – Stuttgart.

Anschrift des Verfassers: Heinz MITTER,
A-4400 Steyr, Holubstraße 7.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen

Jahr/Year: 1981

Band/Volume: 33

Autor(en)/Author(s): Mitter Heinz

Artikel/Article: Zur Verbreitung einiger Pythiden-Arten in Oberösterreich (Coleoptera, Pythidae). 59-61